

الطناوي

الصف 1
الثانوي

في

الكيمياء

جزء الشرح

إعداد د/ أحمد الطناوي

مؤلف كتاب المؤسس




محتويات الكتاب

الباب 1 الكيمياء مركز العلوم

الباب 2 الكيمياء الكمية

الباب 3 المحاليل - الأحماض و القواعد

إعداد : د/ أحمد الحناوي



الباب الأول الكيمياء مركز العلوم

إعداد : د/ أحمد الحناوي

الفصل الأول

الكيمياء والقياس

إعداد : د/ أحمد الحناوي

محتويات الفصل

علم الكيمياء أحد العلوم الطبيعية

1
الدرس

القياس في الكيمياء وأهميته وأدواته

2
الدرس

علم الكيمياء أحد العلوم الطبيعية

1 مقدمة عن العلم

يحاول الإنسان أن يفهم ويفسر تلك الظواهر الكونية الموجودة حوله ، فيؤدي ذلك إلى اكتشافه حقائق تجبره علي وضع مفاهيم ومبادئ وقوانين ونظريات علمية وإتباع طرق منظمة في البحث والتقصي مكوناً من ذلك بناء أو نسق يُعرف بـ العلم

العلم :

هو بناء من **المعرفة** ، يتضمن الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والنظريات العلمية وطريقة منظمة في البحث والتقصي .

لكي يصل إلي النظريات العلمية لابد من أن يضع القوانين أولاً ؛ ولكي يصل إلي القوانين لابد من أن يكون لديه مبادئ وهكذا ..

المعرفة :

ليست مرادفاً لمفهوم العلم بل هي شئ أوسع حدوداً ومدلولاً وأكثر شمولاً وامتداداً من العلم.

للعلم مجالات كثيرة منها :

١ العلوم الطبيعية « الكيمياء والفيزياء والأحياء » التي تدرس الطبيعة .

٢ العلوم الإجتماعية « الأقتصاد وعلم النفس وعلم الإجتماع » التي تدرس الأفراد والمجتمعات .

٣ العلوم الشكلية « المنطق والرياضيات وعلم الحاسوب » التي تدرس المفاهيم المجردة .

يختلف كل مجال عن الآخر :- من حيث اختلاف :

١ الظواهر (موضع الدراسة)

٢ اختلاف الأدوات المستخدمة

٣ اختلاف الطرق المتبعة في البحث



العلوم الطبيعية



العلوم الطبيعية مكونة من خمسة علوم تعرف عليها الإنسان منذ زمن بعيد وهي ؟

- ١ علم الكيمياء : علم يهتم بدراسة تركيب المادة والتغيرات التي تطرأ عليها وخواصها الكيميائية وبنيتها ...
- ٢ علم الفيزياء : علم يهتم بدراسة خواص المادة من طاقة وكتلة وسرعة وكثافة وحركة ...
- ٣ علم البيولوجيا (الأحياء) : علم يهتم بدراسة الحياة والكائنات الحية وهياكلها ونموها ووظائفها وتطورها ...
- ٤ علم الجيولوجيا (علوم الأرض) : علم يهتم بدراسة تركيب الأرض وتاريخها والعوامل التي تطرأ عليها من زلازل وبراكين وإعصار ...
- ٥ علم الفلك : علم يهتم بدراسة الأجرام السماوية من نجوم وكواكب ونيازك ومجرات ومذنبات والظواهر التي تحدث خارج نطاق الغلاف الجوي للأرض ...

مقدمة عن علم الكيمياء :

علم الكيمياء : هو العلم الذي يهتم بدراسة :

- ١ تركيب المادة « مثل : جزئ الماء (H₂O) يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة واحدة أكسجين » .
- ٢ خواص المادة « مثل : الخواص الفيزيائية لجزئ الماء ككثافته ودرجة انصهاره وغليانه ... ، والخواص الكيميائية كأثر جزئ الماء على قطعة صوديوم مثلاً » .
- ٣ التغيرات التي تطرأ على المادة « مثل : أثر انخفاض درجة الحرارة على جزئ الماء السائل ولذلك نلاحظ تحوله إلى ماء متجمد » .
- ٤ تفاعل المواد مع بعضها البعض « مثل : تفاعل جزئ الماء مع فلز السكانيديوم :-

$$2Sc_{(s)} + 6H_2O_{(l)} \xrightarrow{\Delta} 2Sc(OH)_3_{(aq)} + 3H_2_{(g)}$$
- ٥ الظروف الملائمة لإجراء هذا التفاعل « لابد وأن يكون الماء ساخن لكي يتفاعل مع السكانيديوم » .



أهمية علم الكيمياء قديماً :-

- ١ استخدمه المصريون القدماء في عمليات التحنيط .
- ٢ بعض الحضارات القديمة استخدمته في « المعادن والتعدين - الطب والدواء - بعض الصناعات الفنية كدبغ الجلود ، كصبغة الأقمشة ، كصناعة الزجاج ، كصناعة الألوان » .



أهمية علم الكيمياء حديثاً :-

« أصبح لعلم الكيمياء دوراً أساسياً في جميع مجالات الحياة ك الطب ، ك الزراعة ، ك الصناعة ... »

فروع علم الكيمياء :



1 علم الكيمياء الفيزيائية :

فرع من فروع علم الكيمياء ، يقوم علي دراسة خواص وبناء المواد والجسيمات التي تتكون منها هذه المواد وذلك تبعاً لتركيبها وبنائها الكيميائي وللظروف التي توجد فيها وعلي دراسة التفاعلات الكيميائية والظروف الفيزيائية التي تحدث فيها هذه التفاعلات مثل : الضغط ودرجة الحرارة والعوامل الحفازة .. (الباب الثاني فرع من فروع علم الكيمياء الفيزيائية) .



2 علم الكيمياء التحليلية :

فرع من فروع علم الكيمياء ، يهتم بالتقدير الكمي والنوعي للعناصر أو المركبات المكونة للمادة المراد تحليلها ومن طرق إجراء تحليل للمادة : التحليل الحجمي والتحليل النوعي والتحليل الطيفي والتحليل الآلي .. (ستدرسه في الصف الثالث الثانوي ب الباب الثاني بإذن الله) .



3 علم الكيمياء الكهربائية :

فرع من فروع علم الكيمياء ، يهتم بدراسة التحولات المتبادلة بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية وكيفية تحويل كلا منهما للآخر.. (ستدرسه في الصف الثالث الثانوي ب الباب الرابع بإذن الله)



4 علم الكيمياء الحرارية :

علم الكيمياء : فرع من فروع علم الكيمياء ، يهتم بدراسة الخصائص الحرارية للتفاعلات والتغيرات الفيزيائية من انصهار وجليان وذوبان وتخفيف ..



5 علم الكيمياء الحيوية :

فرع من فروع علم الكيمياء ، يهتم بدراسة التركيب الكيميائي لمكونات الخلية (دهون - كربوهيدرات - بروتينات - أحماض نووية) في مختلف الكائنات الحية سواء كانت كائنات بسيطة ك (البكتيريا - الفطريات - الطحالب) أو كائنات معقدة ك (الإنسان - الحيوان - النبات) .



6 علم الكيمياء البيئية :

فرع من فروع علم الكيمياء ، يهتم بدراسة الظواهر الكيميائية التي تحدث في الأماكن الطبيعية من تلوث مياه أو غذاء ونقص مياه أو طاقة ..




7 علم الكيمياء العضوية :

فرع من فروع علم الكيمياء ، يهتم بدراسة المركبات التي يدخل عنصر الكربون في تكوينها وخواصها وتركيبها وتفاعلات وتحضيرها كالحكولات والأدوية والمتفجرات والبويات واللدائن ..



8 علم الكيمياء النووية :

فرع من فروع علم الكيمياء ، يهتم بدراسة النشاط الإشعاعي والعمليات النووية والخواص النووية وبنية النواة الذرية ..



9 علم الكيمياء الضوئية :

فرع من فروع علم الكيمياء ، يشمل دراسة التفاعلات بين كلا من الذرة والجزيئات الصغيرة والضوء ..

مجالات علم الكيمياء :

(4 مجالات) :

- ١ التركيب الذري والجزيئي للمواد وكيفية ارتباط المواد ببعضها البعض .
- ٢ الخواص الكيميائية للمواد ووصفها كماً وكيفاً .
- ٣ التفاعلات الكيميائية وكيفية التحكم في ظروف حدوث هذه التفاعلات للوصول إلى نواتج جديدة ومفيدة ، تلبي تلك الاحتياجات المتزايدة في المجالات المختلفة ، مثل : (الطب - الهندسة - الصناعة - الزراعة - التجارة ... إلخ) .
- ٤ المشكلات البيئية ومحاولة إيجاد حلول لهذه المشكلات ومن أمثلة هذه المشكلات : (أزمة الطاقة - نقص المياه - تلوث الماء والهواء والتربة) .

الكيمياء مركز العلوم


يُعتبر علم الكيمياء مركزاً لمعظم العلوم الأخرى ، لأنه يعدّ أمراً أساسياً لفهم هذه العلوم ، ونستفيد منه مجالات العلوم المختلفة وتعتمد عليه بشكل كبير ، مثل :-

- ١ علم البيولوجي (الأحياء) .
- ٢ علم الفيزياء .
- ٣ علم الطب والصيدلة .
- ٤ علم الزراعة .

علم الكيمياء

علم البيولوجي	علم الفيزياء	علم الطب والصيدلة	علم الزراعة	علوم المستقبل
نتاج التكامل (علم الكيمياء الحيوية)	نتاج التكامل (علم الكيمياء الفيزيائية)	_____	_____	نتاج التكامل (علم كيمياء النانو)

١ التكامل بين علمي الكيمياء والبيولوجي



علم البيولوجي

هو العلم المختص بدراسة الكائنات الحية (إنسان - حيوان - نبات) من هياكلها ووظائفها ونموها وتطورها وتوزيعها وتصنيفها .

دور علم الكيمياء :

يساهم علم الكيمياء في فهم التفاعلات الكيميائية التي تتم داخل أجسام الكائنات الحية أثناء قيامها بالعمليات الحيوية من هضم وتنفس وبناء ضوئي .

نتاج التكامل بين العلمين :


نتاج التكامل بين علمي الكيمياء والبيولوجي هو « علم الكيمياء الحيوية » وهو العلم المختص بدراسة التركيب الكيميائي لمكونات الخلية (دهون - كربوهيدرات - بروتينات - أحماض نووية) في مختلف الكائنات الحية سواء كانت كائنات بسيطة ك (البكتيريا - الفطريات - الطحالب) أو كائنات معقدة ك (الإنسان - الحيوان - النبات)

علم الكيمياء الحيوية يجعلك تتعرف علي نسبة الأملاح والدهون والكربوهيدرات والبروتينات والماء الموجودة بجسمك .



علي سبيل المثال (١) : الإنسان الطبيعي يحتوي علي :-

مكونات الخلية		عناصر أساسية		
النسبة	المكون	النسبة	الرمز	العنصر
6 %	أملاح معدنية	0.2 %	Na	صوديوم
16 %	دهون	0.4 %	K	بوتاسيوم
1 %	كربوهيدرات	0.1 %	Mg	ماغنسيوم
16 %	بروتين	1.2 %	Ca	كالسيوم
62 %	ماء	1.5 %	P	فوسفور
		18 %	C	كربون
		0.2 %	S	كبريت
		65 %	O ₂	أكسجين
		9.5 %	H ₂	هيدروجين
		3.2 %	N ₂	نيتروجين
		1 %	F ₂ / Fe / Cl ₂	عناصر أخرى



علي سبيل المثال (٢) : أضرار تناول الشاي بعد الوجبات :-



المشاهدة :-

الخطوات :-

- أذب 3g من كبريتات الحديد III في 50mL من الماء المقطر ، ثم خذ الرائق من المحلول في أنبوبة اختبار وسجل اللون الظاهر !!
- صُب في أنبوبة اختبار كمية قليلة من الشاي ، ثم صُب عليها كمية من محلول كبريتات الحديد III ، وسجل اللون الظاهر !!
- اذب قطرات من عصير الليمون (فيتامين C) إلي الراسب المتكون ، وسجل اللون الظاهر !!



الاستنتاج :

- تناول الشاي بعد الوجبات مباشرة يعمل علي ترسيب الحديد الموجود في الدم .
- عصير الليمون (فيتامين C) يعمل علي إعادة الحديد المُرسب مرة أخرى في الدم .

2 التكامل بين علمي الكيمياء والفيزياء :

● أولاً : علم الفيزياء :- هو العلم المختص بـ

- 1 دراسة كل ما يتعلق بخواص المادة من كتلة وسرعة وطاقة .
- 2 ابتكار طرق جديدة للقياس تزيد من دقته .
- 3 محاولة فهم الظواهر الطبيعية والقوي المؤثرة عليها .

“

● ثانياً : دور علم الكيمياء

يساهم علم الكيمياء في التعرف علي تركيب المادة والجسيمات التي تتكون منها .

“

● ثالثاً : نتائج التكامل بين العلمين

- 1 نتائج التكامل بين علمي الكيمياء هو علم الكيمياء الفيزيائية وهو العلم المختص بدراسة خواص المادة وتركيبها والجسيمات التي تتكون منها هذه المواد .
- 2 علم الكيمياء الفيزيائية يُمكنك من التعرف علي الخواص المغناطيسية لبرادة حديد .

“

علل : يُسهل علم الكيمياء الفيزيائية علي علماء الفيزياء القيام بدراستهم ؟

ج : لأنه يختص بدراسة خواص المواد وتركيبها والجسيمات التي تتكون منها .

3 التكامل بين علوم الكيمياء والطب والصيدلة :-

● أولاً : الأدوية

هي مواد كيميائية لها خواص علاجية يتم استخلاصها من مصادر طبيعية أو تحضيرها في المعامل بواسطة الكيميائيون ويصفها الأطباء للمرضي .

“

● ثانياً : دور علم الكيمياء

يساهم علم الكيمياء في تفسير طبيعة عمل الهرمونات والإنزيمات في جسم الإنسان وكيفية استخدام الدواء لعلاج الخلل الحادث في عمل أي منهما .

“

- ١) نتاج التكامل بين علوم الكيمياء والطب والصيدلة يُعطي ما يسمى بـ الأدوية .
- ٢) ف العلم المسئول عن معرفة الخلل بالهرمون أو الإنزيم هو **علم الكيمياء** ، بينما **علم الصيدلة** يقوم بإنتاج الدواء المستخدم في علاج الخلل ، و**علم الطب** يقترحه علي المريض المصاب بهذا الخلل .

علي سبيل المثال: بعض أدوية الكحة مُستخلصة طبيعياً من أوراق الجوافة .. فلاحظ :-



- ١) مُكتشف الدواء هو الكيميائي (علم الكيمياء)
- ٢) صانع الدواء هو الصيدلي (علم الصيدلة)
- ٣) مُقترح الدواء هو الطبيب (علم الطب) .

علل يلعب علم الكيمياء دوراً هاماً في كل من علمي الطب والصيدلة ؟

لأنه يُفسر طبيعة عمل الهرمونات والإنزيمات في جسم الإنسان ، وكيفية استخدام الدواء في علاج الخلل الحادث في عمل أيّا منهما .

التكامل بين علمي الكيمياء والزراعة :

يساهم علم الكيمياء في

- ١) اختيار التربة المناسبة لزراعة محصول ما وذلك عن طريق التحليل الكيميائي لعينة من هذه التربة والذي يحدد :
- ٢) نسب مكونات هذه التربة وبالتالي مدي كفايتها لاحتياجات النباتات .
- ٣) السماد المناسب لتلك التربة لزيادة إنتاجيتها من المحاصيل .
- ٤) إنتاج المبيدات الحشرية الملائمة للقضاء علي الآفات الزراعية المختلفة .

علي سبيل المثال: الأسمدة والمبيدات الحشرية من مقومات التربة الزراعية الجيدة . فلاحظ :-



- ١) محلل التربة هو الكيميائي (علم الكيمياء) ،
- ٢) مُمد التربة بالسماد هو الزارع (علم الزراعة) .



التكامل بين علوم المستقبل و الكيمياء :

ساج التكامل بين علمي الكيمياء والنانوتكنولوجي (تكنولوجيا متناهية الصغر) هو علم كيمياء النانو



علم كيمياء النانو :

- هو العلم المختص باكتشاف وبناء مواد جديدة نانوية لها خصائص فائقة
- يمكن استخدامها في تطوير العديد من المجالات لتلبية الاحتياجات البشرية.
- أحد علوم المستقبل التي تلبي الاحتياجات البشرية في مختلف المجالات من هندسة وإتصالات وطب وبيئة و مواصلات وغيرها ..

تدريب



٣ الشكل المقابل : يمثل ظهور بقع صفراء على أوراق النبات لنقص المنجنيز لأنه ضروري لبناء الضوئي ولعلاج الخلل نستخدم سلفات النشادر ، يعد ذلك التكامل بين علم الكيمياء

و

- الفيزياء .
- البيئة .
- البيولوجي .
- الزراعة .

٤ عند تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز النيتروجين لتكوين غاز النشادر يصبح حجم النشادر الناتج أقل من حجم الغازات المتفاعلة (at STP) ، فإن العلم المهتم بدراسة هذه التفاعلات هو علم

- الكيمياء التحليلية .
- الكيمياء النووية .
- الكيمياء البيئية .
- الكيمياء الحيوية .

٥ يمكن زيادة كمية النشادر المحضرة صناعياً بزيادة الضغط ، فما العلم المهتم بدراسة هذا التفاعل ؟

- الكيمياء الحيوية .
- الكيمياء الفيزيائية .
- الكيمياء البيئية .
- الكيمياء التحليلية .

٦ هضم الطعام داخل الجسم نتيجة التكامل بين علمين مختلفين هما

- الكيمياء والفيزياء .
- الكيمياء والجيولوجيا .
- الكيمياء والبيولوجي .
- الكيمياء والزراعة .

٧ أي فرع من فروع علم الكيمياء يهتم بكيمياء الكائنات الحية ؟

- الكيمياء الحيوية .
- الكيمياء العضوية .
- الكيمياء الفيزيائية .

٨ أي فرع من فروع علم الكيمياء يستخدمه علماء الطب الشرعي ؟

- الكيمياء الغير عضوية .
- الكيمياء الفيزيائية .
- الكيمياء التحليلية .

القياس في الكيمياء وأهميته وأدواته

1 طبيعة القياس

نتيجة للتطبيق الصحيح والفريق لمبادئ القياس ؛ فنحن نساير التطور العلمي والصناعي والتكنولوجي والاقتصادي .

فالقياس هو عبارة عن مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى معلومة من نفس النوع ؛ لمعرفة عدد مرات احتواء (الاولى (المجهولة) علي الثانية (المعلومه) .

علي سبيل المثال:

« إذا علمت أن كتلة الكشكول الواحد = 10 g ، كتلة عدد مجهول من الكشاكيل = 100 g ، فإن عدد الكشاكيل = »

بمعلومية الكمية الثانية (المعلومه) ؛ نستطيع حساب

$$\text{عدد الكشاكيل} = \frac{100}{10} = 10 \text{ كشاكيل.}$$

تتضمن عملية القياس نقطتين أساسيتين هما:

① القيمة العددية ؛ وهي العدد الذي يصف الكمية أو الخاصية المقاسة .

② وحدة القياس ؛

أ وهي معيار قياس المقدار الفعلي لهذه الكمية في نظام وحدات القياس الدولية .

ب وتُعرف بأنها مقدار محدد من كمية فيزيائية معينة .

ج تُستخدم كمعيار لقياس مقدار فعلي لهذه الكمية .

تكتب نتيجة عملية القياس في صورة قيمة عددية متبوعة بوحدة قياس مناسبة كما بالجدول التالي :

الخاصية المقاسة	وحدة القياس	القيمة العددية
الكتلة	Kg	5
الطول	M	10
الزمن	sec	100

2 أهمية القياس في الكيمياء

نتيجة للدقة والتنوع ! أصبحت أساليب التحليل والقياس أكثر تطوراً .

ولكن للقياس أهمية كبرى في مختلف مجالات الحياة اليومية ... ؟

حيث أنه يوفر المعلومات والمعطيات الكمية اللازمة لإتخاذ الإجراءات والتدبير المناسبة عند اللزوم في

مختلف مجالات الحياة ، مثل

البيئة ١ التغذية ٢ الصحة ٣ الزراعة ٤ الصناعة ٥



تتضح أهمية القياس في الكيمياء فيما يلي

١ معرفة نوع وتركيز العناصر المكونة للمواد

٢ المراقبة والحماية الصحية

٣ التشخيص واقتراح العلاج المناسب للأمراض

أهمية القياس في الكيمياء

معرفة نوع وتركيز العناصر المكونة للمواد	المراقبة والحماية الصحية	التشخيص واقتراح العلاج المناسب للأمراض
---	--------------------------------	--

أولاً : معرفة نوع وتركيز العناصر المكونة للمواد

تُعد بطاقة البيانات المُلصقة علي عبوات المواد الغذائية والمياه المعدنية من الأمور الهامة

بالنسبة للمستهلك لأنها تمكنه من معرفة نوع وتركيز أيونات العناصر المكونة لها .

من خلال بطاقة البيانات المُلصقة علي زجاجتين مياه معدنية ، يمكنك التعرف علي نوع

وتركيز المواد في كلا منهما ، بل والمقارنة بينهما وأيهما تفضل ..

“

تطبيق : قياس تركيز الأيونات المكونة للأملاح في المياه المعدنية .

تركيز المكونات في الزجاجية	تركيز المكونات في الزجاجية	المكونات
120	25.5	أيونات الصوديوم (Na^+)
8	2.8	أيونات البوتاسيوم (K^+)
40	8.7	أيونات الماغنسيوم (Mg^{2+})
70	12	أيونات الكالسيوم (Ca^{2+})
220	14.2	أيونات الكلوريد (Cl^-)
335	103.7	أيونات البيكربونات (HCO_3^-)
20	41.7	أيونات الكبريتات (SO_4^{2-})

بناءً على النتائج التالية، ناقش تأثير تركيز الأيونات المكونة للأملاح في المياه المعدنية على الصحة.

١) الشخص الذي يتبع نظاماً غذائياً قليل الملح ، سوف يفضل استخدام مياه الزجاجية (أ) ؛ نظراً لإحتوائها علي كميات أقل من الأيونات المكونة للأملاح من مياه الزجاجية (ب) .

٢) الشخص الذي يتبع نظاماً غذائياً قليل الحموضة ، سوف يفضل استخدام مياه الزجاجية (أ) ؛ نظراً لإحتوائها علي كميات أقل من الأيونات المكونة للأحماض (Cl^- , HCO_3^- , SO_4^{2-}) من مياه الزجاجية (ب) .

٣) الشخص الذي يتبع نظاماً غذائياً قليل القاعدية ، سوف يفضل استخدام مياه الزجاجية (أ) ؛ نظراً لإحتوائها علي كميات أقل من الأيونات المكونة للقواعد (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}) من مياه الزجاجية (ب) .

٤) الشخص الذي يستهلك لتر ونصف من مياه الزجاجية (ب) خلال يوم واحد سوف يحصل منها علي كمية من أيونات الكالسيوم كتلتها تساوي $105mg = 70 \times 1.5$

٥) الشخص الذي يستهلك لترين من مياه الزجاجية (ب) خلال يوم ونصف سوف يحصل منها علي كمية من أيونات الكبريتات كتلتها تساوي $40mg = 20 \times 2$ خلال اليوم ونصف

٦ الشخص الذي يستهلك لتر من مياه الزجاجاة (أ) خلال يومين سوف يحصل منها علي كمية من أيونات الكلوريد كتلتها تساوي $14.2 \times 1 = 14.2 \text{ mg}$ خلال اليومين؛ خلال اليوم الواحد تساوي $14.2 \times 0.5 = 28.4 \text{ mg}$

٧ الشخص الذي يستهلك 3 لتر من مياه الزجاجاة (أ) خلال 3 أيام سوف يحصل منها علي كمية من أيونات البيكربونات كتلتها تساوي $103.7 \times 3 = 311.1 \text{ mg}$ خلال الـ 3 أيام ؛ خلال اليوم الواحد تساوي $311.1 \times 0.3 = 103.7 \text{ mg}$

٨ هل القياس ضروري في حياتنا ؟ ما أهمية بطاقة البيانات المُلصقة علي العبوات بالنسبة للمستهلك ؟
- نعم ضروري ؛ فالقياس ضروري من أجل معرفة نوع وتركيز العناصر المكونة للمواد .

٥ ثانياً مراقبة الحياة الصحية

تتطلب سلامة البيئة والحماية الصحية ' قياس كل من :



١ مدي صلاحية المياه للشرب

٢ مدي نقاء الهواء الذي نتنفسه

٣ مدي سلامة المواد الغذائية والزراعية التي نتناولها

لكي تحيا حياة صحية وجيدة ؛ عليك بمراقبة مدي صلاحية المياه للشرب ومدي نقاوة الهواء الذي تتنفسه ومدي صحة وسلامة الغذاء الذي تتناوله

تطبيق : مراقبة مدي مطابقة مياه الشرب للمعايير العالمية .


تركيز المكونات الزجاجية	المعايير العالمية للتركيز الأيونات المكونة للمياه (mg/L)
120	$\text{Na}^+ < 150$
8	$\text{K}^+ < 12$
40	$\text{Mg}^{2+} < 50$
70	$\text{Ca}^{2+} < 300$
220	$\text{Cl}^- (200 : 250)$
20	$\text{SO}_4^{2-} < 250$
25.5	
2.8	
8.7	
12	
214	
41.7	

من خلال الجدول المقابل نستطيع تحدد مدي صلاحية المياه للشرب طبقاً للمعايير العالمية ، ويتضح بأن الزجاجتين (أ) ، (ب) يصلحا للشرب ؛ لأن نسب الأيونات فيهما تخضع للمعايير العالمية (أي تقع في المدي الصحي الآمن) .

التشخيص واقتراح العلاج المناسب للأمراض

ثالثاً

ترشد قياسات التحاليل الطبية إلى تقدير الموقف الصحي للأشخاص موضع الاختبار ، وبالتالي اقتراح العلاج المناسب لهم ، وذلك بمقارنة قيم نتائج التحاليل الطبية لدى هؤلاء الأشخاص بالمعدل الطبيعي الآمن لهذه القيم عند الأشخاص الأصحاء أو ما يعرف به القيم المرجعية .



القيمة المرجعية : هي المعدل الطبيعي الآمن لتركيز المادة عند الأشخاص الأصحاء

تطبيق : نتائج تحاليل السكر وحمض البوليك في عينة دم أحد الأشخاص .

نتيجة التحليل (mg/dL) (ويلي جرام / ديسي لتر)	القيمة المرجعية (mg/dL) (ويلي جرام / ديسي لتر)
70	70 : 110
9.2	3.6 : 8.3
2.5	1.2 : 2

يتضح من الجدول المقابل أن :

- نسبة سكر الجلوكوز في دم هذا الشخص طبيعية
- نسبة حمض البوليك مرتفعة عن المعدل الطبيعي (القيمة المرجعية) ، وهذه يدل علي وجود خلل لابد من علاجه .
- نسبة الكوليسترول مرتفعة عن المعدل الطبيعي (القيمة المرجعية) ، وهذا يدل علي وجود خلل لابد من علاجه .

أدوات القياس في معمل الكيمياء

تجري التجارب الكيميائية في معمل الكيمياء (المختبر)

لابد من توافر في المعمل مواصفات وشروط ، وهي :

أ احتياطات الأمان المناسبة

ب مصدر للحرارة ، مثل موقد بنزن

ج مصدر للماء

د أماكن لحفظ المواد الكيميائية



الأدوات والأجهزة المختلفة ، ومنها :

- ١ أنبوبة اختبار ← (نقل المحاليل معلومة الحجم) .
- ٢ الميزان الحساس ← (قياس كتل المواد) .
- ٣ الكأس الزجاجية ← (خلط ونقل السوائل والمحاليل معلومة الحجم) .
- ٤ المخبر المدرج ← (قياس حجوم السوائل والأجسام الصلبة التي لا تذوب في الماء) .
- ٥ الدورق الزجاجي ← (عمليات المعايرة والتحضير والتقطير) .
- ٦ السحاحة ← (قياس حجوم السوائل في التجارب التي تتطلب نسبة عالية من الدقة كما في المعايرة) .
- ٧ الماصة ← (قياس ونقل حجم معين من المحلول) .
- ٨ أدوات قياس الأس الهيدروجيني ← (قياس تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول) .

أنبوبة اختبار

عبارة عن أداة مخبرية زجاجية ذات فتحة عليا يتم استخدامها لصب أو نقل أو خلط المحاليل والمواد الكيميائية والسوائل وغالباً ما تكون مصنوعة من البلاستيك وذات أحجام وقياسات مختلفة .



عند الإستخدام ، اتبع الآتي :-



- ١ عدم جعل فوهتها بإتجاه وجهك .
- ٢ عدم مسكها باليد عند التسخين بل باستخدام الماسك .
- ٣ يجب تسخين الأنبوبة من القاع وليس من الجانب ، والتسخين يكون بلهب هادئ مع التحريك المستمر لتجنب كسرها بالحرارة الشديدة .

وصفه :

الموازين من أهم الأجهزة المستخدمة في المعامل ؛ لأنه هو الخطوة الأولى لتحضير المحاليل القياسية

للمواد الصلبة .



موازين حساسة رقمية ذات كفة واحدة

الموازين تختلف في الشكل والتصميم .

أكثر الموازين الحساسة شيوعاً هي الموازين الرقمية .

أكثر الموازين الرقمية استخداماً هو الميزان ذو الكفة الفوقية (العلوية) .



استخدامه :

تستخدم الموازين في قياس كتل المواد بدقة عن طريق رقم يظهر على الشاشة الرقمية .

عند استخدامه :

توجد تعليمات خاصة باستخدام الميزان تثبت في أحد جوانبه ويجب قراءتها بعناية قبل الاستخدام .

لا بد من تأكدك بأن الميزان موصل بالكهرباء .

إزالة الغبار الموجود على الميزان ، لأن ذلك يؤثر على الوزن ، وحيث الدقة العالية عند قياس كتل المواد .

تجنب سكب المواد على الميزان .

عند الاستخدام ، اتبع الآتي :-

نظف كفة الميزان باستخدام الفرشاة الخاصة بذلك ؛ فبذلك لا تؤثر الأتربة المتساقطة على كتل المادة .

ضع المادة المراد وزنها في وسط كفة الميزان .

ضع على الميزان المواد الجافة فقط ، أما المواد السائلة فضعها في إناء (يجب أن تكون على

علم بكتلة الإناء) ، ثم اطرح كتلة الإناء من كتلة الإناء والسائل فتحصل على كتلة السائل فقط

(تسمى بطريقة الفرق) .

اغلق أبواب الميزان أثناء عملية الوزن ؛ لأن هذا يمنع الخطأ الناتج من تيارات الهواء .

الكاس الزجاجية

وصفها :



كاس زجاجية

١. أواني زجاجية شفافة

٢. تُصنع من زجاج البيركس المقاوم للحرارة

٣. ذات الشق الضيق .

تدريجها :

١. بعضها ذات سعة محددة وبعضها مدرج .

٢. إذا كان مدرج فـ التدريج من أسفل إلي أعلى .

استخدامها : تستخدم في :-

١. خلط السوائل والمحاليل وتسخينها وحفظها أثناء التفاعلات .

٢. نقل حجم معين من سائل من مكان لآخر .

٣. تذويب المواد الصلبة .

٤. معرفة القياس التقريبي لحجوم السوائل والمحاليل



كؤوس زجاجية مختلفة السعة

المخبار المدرج

وصفه :

١. وعاء زجاجي أسطواني الشكل .

٢. يُصنع من الزجاج أو البلاستيك .

تدريجها :

١. يوجد منه سعات مختلفة وغالباً ما يكون مدرج .


٢. إذا كان مدرج فـ التدريج من أسفل إلي أعلى بوحدة Lm أو cm^3

استخدامه : يستخدم في :-

١. قياس حجوم السوائل بدقة أكثر من الدورق ولكن أقل دقة من الماصة ،

فهو من أدوات قياس حجوم تقريبية.

٢. تقدير حجم جسم صلب لا يذوب في الماء .



مخبار مدرج



مخابير مدرجة مختلفة السعة

عند الإستخدام ، اتبع الآتي :-

٣ عند صب السائل في المخبر المدرج يجب أن تنتظر حتي يستقر سطحه .

٤ ضع العين في المستوي الأفقي لسطح السائل ، ثم اقرأ القيمة التي توافق الجزء المستوي من السطح


الهلامي للسائل (السطح المُقعر) .

٥ أكتب العدد متبوعاً بوحدة القياس المكتوبة على الإناء .

شكل يوضح القراءة الجيدة للتدريج



القراءة الصحيحة
97 ml



شكل يوضح القراءة الجيدة للتدريج

تطبيق : كيفية تعيين حجم جسم صلب لا يذوب في الماء (مثل : حجر) :-

١ تُوضع كمية مناسبة من الماء في المخبر ويُعين حجمها (V_1)


٢ يُوضع الجسم المراد تقدير حجمه بحرص في المخبر ويُعين حجم الماء والجسم (V_2)

٣ يُعين حجم الجسم V من خلال العلاقة :

$$V_{diff} = V_2 - V_1$$

٤ حجم الحجر (V) = حجم الماء والحجر (V_2) - حجم الماء فقط (V_1)

٥ حجم الحجر (V) = $30 - 40 = 10 \text{ cm}^3$



حجم الحجر

الدوارق الزجاجية

وصفها :

يُصنع من زجاج البيركس ؛ لأنه مقاوم للحرارة فلا ينكسر أثناء التسخين أو بفعل حرارة التفاعل

اختلاف الدوارق : يوجد منه أنواع كثيرة ، وتختلف هذه الأنواع باختلاف :

١ الغرض من استخدامها

٢ سعتها

إذا كانت مُدرجة ؛ ف التدريج من أسفل لأعلي .

تُستخدم في تحضير المواد وحفظ المحاليل وقياس حجمها إذا كان الدورق ذو سعة محددة .



دوارق زجاجية

أنواعها :



دورق مخروطي

١ الدورق المخروطي :

١ ذو قاعدة مسطحة .


٢ يأخذ الشكل المخروطي .

٣ تختلف أنواعه باختلاف السعة .

٤ فتحة الدورق ضيقة مما يساعد علي منع تناثر المحلول المستخدم خارج الدورق أثناء عملية الرج .

٥ ميل جدران الدورق ؛ يعمل علي منع التصاق قطرات المحلول عليها ف بالتالي سرعة في التفاعل .

٦ يستخدم في عمليات المعايرة .



دورق مستدير

ب الدورق المستدير :

١ ذو قاعدة مستديرة .

٢ يأخذ الشكل الدائري .

تختلف أنواعه باختلاف السعة :

١ انتفاخه بالوني الشكل .

٢ يستخدم في عمليات التحضير والتقطير .

د الدورق المعياري (الدورق القياسي) :

١ ذو قاعدة مستوية وشكل كمثري وينتهي برقبة طويلة ضيقة .

٢ يعلو انتفاخه عنق موضح عليه علامة تحدد السعة الحجمية .

٣ هذه العلامة عبارة عن خط محفور في العنق يدل علي حجم العنق .

٤ يتم تجهيز الدوارق العيارية عن طريق تغطيتها بغطاء من البلاستيك .




دورق عياري

يستخدم في تحضير المحاليل القياسية (معلومة التركيز) بدقة .

المحلول القياسي : هو محلول معلوم تركيزه وحجمه بالضبط (بالدقة) يستخدم في معايرة محلول آخر

مجهول تركيزه ، ويتم تحضيره باستخدام الدورق العياري .

عليا



سحاحة مُدرجة

سفلي

التركيبات

وصفها

عبارة عن انبوبة زجاجية اسطوانية طويلة مفتوحة الطرفين (ذات فتحتين) :

الفتحة العليا : لملء السحاحة بالمحلول المراد استخدامه .

الفتحة السفلي : للتحكم في كمية المحلول المستخدمة عن طريق صمام مثبت في نهايتها .

تدريجها

١ دائماً مُدرجة والتدريج يكون من أعلى إلى أسفل ، بحيث يقع صفر التدريج بالقرب من

الفتحة العليا وينتهي التدريج قبل الصمام

٢ التدريج بالجزء من 10mL لإعطاء دقة في قياس حجوم السوائل .

استخدامها

تستخدم في قياس حجوم السوائل في التجارب التي تتطلب نسبة عالية من الدقة كما في عمليات المعايرة .

عند استخدامها (في عمليات المعايرة) ، اتبع الآتي :

١ تُثبت السحاحة علي حامل ذو قاعدة معدنية للحفاظ علي وضعها العمودي أثناء إجراء التجارب ، للحصول علي نتائج سليمة ودقيقة .

٢ تُملأ السحاحة بعد غلق الصنبور جيداً إلى أعلى صفر التدريج الموجود قرب الطرف العلوي لها ، ثم يُفتح الصنبور لتفريغ الهواء الموجود أسفله حتي يصل السائل عند صفر التدريج ثم اغلق الصنبور .

٣ عند قراءة التدريجات في السحاحة يجب أن تكون العين في مستوي سطح السائل ، والقراءة الصحيحة تتم بأن يكون أسفل تقعر السائل مُلامساً أعلى خط التدريج الذي نريد قياسه « كما في المخبر المدرج » .


المعايرة

١ تعيين تركيز محلول مجهول التركيز بمعلومية المحلول القياسي (محلول معلوم تركيزه وحجمه بالضبط) .

٢ **عند المعايرة :** يُوضع المحلول القياسي بواسطة قمع في السحاحة ، ويُوضع المحلول المجهول بواسطة الماصة في الدورق المخروطي .



٣ تتم بين محلول حامضي (مثل : حمض الهيدروكلوريك HCl « مجهول التركيز » وآخر قلوي (مثل : هيدروكسيد الصوديوم NaOH « معلوم التركيز أو المحلول القياسي »)

خطوات
المعايرة

المصاصة

وصفها :

- ٤ عبارة عن أنبوبة زجاجية أسطوانية طويلة مفتوحة الطرفين
- ٥ بعضها ذو انتفاخ واحد والبعض الآخر ذو انتفاخين
- ٦ ذات الانتفاخين هي الأكثر استخداماً في المعامل



تدريجها :

- ١ بعض أنواعها مدرج والبعض الآخر محدد السعة
- ٢ يوجد بالقرب من طرفها العلوي علامة تحدد مقدار السعة الحجمية.
- ٣ مدون علي العلامة نسبة الخطأ في القياس

استخدامها :

- ١ تستخدم في قياس ونقل حجم معين من المحلول

الأنواع :-




٣ ماصة ذات أداة شطف

الأكثر استخداماً مع المواد الخطيرة



٢ ماصة ذات إنتفاخين

الأكثر استخداماً في المعامل



١ ماصة مدرجة

مناسبة لقياس حجم معين من محلول

عند استخدامها ، اتبع الآتي :-

- 1 عدم تسخين الماصة عن طريق مسكها باليد لفترة طويلة أو تقريبها من مصدر حراري .
- 2 في حالة المواد الخطرة ، ضع الماصة داخل الإناء في وضع رأسي وسوف يرتفع السائل داخل الماصة لنفس ارتفاع السائل داخل الإناء أو استخدم الماصة ذات أداة شفط .
- 3 استخدم السبابة لغلق الفتحة العلوية عند نقل السائل .
- 4 إعطاء الوقت الكافي للسائل للخروج من الماصة .
- 5 تجنب هز الماصة أو النفخ فيها لإجبار السائل علي الخروج .
- 6 تجنب فقدان جزء من السائل أثناء نقله بالماصة .

أدوات قياس الأس الهيدروجيني pH

وصفها :

- 1 الرقم الهيدروجيني pH هو أسلوب يستخدم للتعبير عن تركيز أيونات الهيدروجين الموجبة H^+ في المحلول ، لتحديد نوعه (حامضي - قاعدي - متعادل) .
- 2 يُعبر عن الرقم الهيدروجيني pH بأرقام تتراوح بين 0 : 14
- 3 قياس الأس الهيدروجيني له درجة كبيرة من الأهمية في التفاعلات الكيميائية و البيوكيميائية .. علل ؟ لأنه يحدد مدي حامضية أو قاعدية أو تعادل المحاليل المستخدمة في هذه التفاعلات .

يتم قياس قيمة pH للمحاليل المختلفة ، باستخدام :

أشرطة pH



- 1 شريط pH الورقي : عن طريق غمس طرف الشريط في المحلول فيتغير لونه ويتم تحديد مدي قيمة pH للمحلول من خلال تدريج يتراوح ما بين (0 : 14) تبعاً لدرجة اللون



- 2 جهاز pH الرقمي : عن طريق غمس القطب الموصل بالجهاز (الحساس) في المحلول فتظهر قيمة pH للمحلول مباشرة علي الشاشة الرقمية للجهاز .
- علل ؟ جهاز pH الرقمي أكثر دقة من شريط pH الورقي في تحديد قيمة pH للمحلول ؟
- ج لأنه يحدد قيمة pH للمحلول مباشرة بدلالة الرقم الذي يظهر علي شاشته الرقمية .



تدريب

- ١ ما هي الأداة التي تستخدم لتعيين 21.5mL من السائل بدقة من الأدوات الآتية ؟
 - أ كأس زجاجي .
 - ب ورق عياري .
 - ج سحاحة .
 - د مخبر مدرج .
- ٢ أيا من الأزواج التالية من أدوات القياس بالمعمل تستخدم لتعين كثافة سائل ؟
 - أ مخبر مدرج وماصة .
 - ب مخبر مدرج وميزان حساس .
 - ج ورق عياري وسحاحة .
 - د ورق مستدير وسحاحة .
- ٣ يمكن قياس ونقل حجم معين من حمض الكبريتك المركز باستخدام
 - أ المخبر المدرج .
 - ب السحاحة .
 - ج ماصة بأداة شفط .
 - د كأس زجاجي .

٤) أيا مما يأتي يعبر عن القياس الكمي ؟

- ١) قضيب الألومنيوم أطول من قضيب النحاس .
٢) المحلول الأول تركيزه أكبر من المحلول الثاني .
٣) درجة حرارة المحلول الثاني 60 °C .
٤) لون محلول كبريتات النحاس II أزرق .

٥) أربعة محاليل (A , B , C , D) الرقم الهيدروجيني pH لها على الترتيب (0 , 1 , 12 , 13)

الرقم	الرقم الهيدروجيني	الرقم الهيدروجيني	الرقم الهيدروجيني	الرقم الهيدروجيني
١	أقل حامضية	أكبر حامضية	أقل قاعدية	أكبر قاعدية
٢	أكبر حامضية	أقل حامضية	أقل قاعدية	أكبر قاعدية
٣	أكبر حامضية	أقل حامضية	أكبر قاعدية	أقل قاعدية
٤	أقل حامضية	أكبر حامضية	أكبر قاعدية	أقل قاعدية

٦) في الشكل المقابل جزء من أداة زجاجية فإن كتلة السائل المنقول = جم
(بفرض كثافته 0.066 g/ml)



٠.٠٣٣ ب

١٢.٦٧ أ

١٣.٣٣ ج

٣٠ د

٧) أكبر تركيز لأيون الهيدروجين H^+ يوجد في

١) الدم pH له 7.4

٢) الشاي pH له 5.5

٣) اللبن pH له 6

٤) القهوة pH لها 5

٨) أي الأدوات التالية أدق في قياس حجم سائل ؟

١) الكأس الزجاجي .

٢) الدورق المخروطي .

٣) السحاحة .

٤) الدورق المستدير .

٩) ينصح الأطباء بعدم شرب الشاي مباشرة بعد الواجبات الغذائية ؛ لأن الشاي يعمل على

١) وقف عمل حمض المعدة .

٢) سهولة امتصاص الحديد .

٣) ترسيب الحديد .

٤) ترسيب الصوديوم .

١٠) « إذا أراد طالب تعيين الحجم المستخدم من حمض HCl تركيزه 0.1M لمعايرة 30mL من محلول NaOH مجهول التركيز حتي نصل لنقطة التعادل » - ما الأداة الأدق التي يجب أن يستخدمها الطالب ؟

١) الماصة .

٢) الدورق المُستدير .

٣) السحاحة .

٤) الدورق العياري .

ثانياً - ما الأداة التي يجب أن يستخدمها الطالب في وضع الدليل في الدورق المخروطي ؟

أ الماصة .

ب الدورق المُستدير .

ج الدورق العياري .

د الكأس الزجاجي .

ثالثاً - ما الأدوات التي يمكن استخدامها لإتمام هذه العملية ؟

أ ماصة / مخبر مدرج / كأس زجاجي .

ب ماصة / كأس زجاجي / دورق مخروطي .

ج ميزان رقمي / سحاحة / كأس زجاجي .

د دورق مخروطي / سحاحة / ماصة .

ملاحظات على الفصل الأول

١ إذا أعطاك شكل من الأشكال أو قطاع من جسم كائن حي .. وطلب منك نوع التكامل بين

الكيمياء وبين العلم الآخر الذي يمثل الشكل أو القطاع ، فإذا كان :

أ الشكل يحتوي علي تركيب خللا !!

كان علم الكيمياء الحيوية (كيمياء + بيولوجي) .

ب الشكل يحتوي علي غازات داخل أنابيب !!

كان علم الكيمياء الفيزيائية (كيمياء + فيزياء) .

ج الشكل يحتوي علي أعضاء من جسم الإنسان !!

كان علم الكيمياء والطب .

د الشكل يحتوي علي أعضاء من جسم الإنسان وبه خلل ويريد علاج !!

كان علم الكيمياء والطب والصيدلة .

هـ الشكل يحتوي علي هرمونات أو إنزيمات داخل جسم الكائن الحي !!

كان علم الكيمياء والطب والصيدلة

٦ الشكل يحتوي علي أعضاء من جسم الإنسان وسريان الغازات داخل الجسم وموضح علي الشكل اتجاه

الجاذبية !! كان علم الكيمياء والطب والفيزياء .

٧ الشكل يحتوي علي معلومات خاصة بالأراضي الزراعية أو المبيدات الحشرية !!

كان علم الكيمياء والزراعة أو علم الكيمياء التحليلية .

٨ الشكل يحتوي علي أي تطبيق من تطبيقات النانو سواء في الهندسة أو الإتصالات أو البيئة !!

كان علم الكيمياء وعلوم المستقبل .

ب لاحظ الفرق بين العلوم :

١ إذا أعطاك جدول من جداول القياس مثل : تحاليل أحد الأشخاص ، مكونات بعض زجاجات المياه ، مكونات علب الحليب :-

قارن بين قيمة التحليل المُعطاة لذلك الشخص والقيمة المرجعية ، ثم استنتج من خلال ذلك هل الشخص طبيعي أم لا ..

٢ إذا أعطاك نظام غذائي مكون من عدد من الأطعمة ويريد عدد الوحدات السعرية الكلية للوجبة :-

عدد السعرات الكلية = (كمية الطعام الأول x عدد سعراته) + (كمية الطعام الثاني x عدد سعراته) + (كمية الطعام الثالث x عدد سعراته) + .. وهكذا .

٣ إذا أعطاك مخلوط مكون من عدة عناصر ، مثلاً : 20 جرام صوديوم + 50 جرام بوتاسيوم + 30 جرام ماغنسيوم وطلب كتلة الصوديوم في 400 جرام من هذا المخلوط :

كتلة الصوديوم ← كتلة المخلوط

$$\frac{20}{400} = \frac{X}{(30 + 50 + 20)g}$$

$$80g = \frac{20 \times 400}{100} = X$$

٤ ل قياس كثافة سائل ما :-

نستخدم الميزان الحساس لقياس كتلة السائل ، نستخدم المخبر المدرج لقياس حجم السائل .

$$\frac{\text{كتلة}}{\text{حجم}} = \text{الكثافة (g/cm}^3 \text{)}$$

٥ المخبر المدرج والحجم :-

لا بد من أن تكون العين في وضع أفقي مع أقل نقطة في سطح السائل (السطح المقعر) عند قراءة حجم السائل.

عند مقارنتك بين حجم سائل في أكثر من مخبر مدرج ؛ فإن حجم السائل = مساحة قاعدة الإناء الارتفاع .

المخبر المدرج يستخدم لتعيين حجم جسم صلب (غير منتظم) لا يذوب في الماء ، فعند إلقاء عدة كرات

في مخبر مدرج ؛ فإن حجم الكرات المُلقة = حجم الماء المُرتفع ($V_{\text{diff.}} = V_2 - V_1$) .

عند نقل كرة من مخبر مدرج صغير إلى مخبر مدرج كبير ؛ فإن حجم الماء يزداد بنفس المقدار ، ولكن الارتفاع يعتمد علي مساحة الإناء .

يمكن جمع الغازات الناتجة من التفاعلات الكيميائية بواسطة المخبر المدرج .

٦ السحاحة والمعايرة :-

لقياس حجم حمض أو قلوي في عملية المعايرة نستخدم السحاحة .

لا بد من أن يكون سطح السائل عند صفر التدريج .

عند إجراء تجربة المعايرة لابد من توافر: ماصة - سحاحة - ورق مخروطي - جهاز pH الرقمي .
٧ الماصة :-

المرودة بأداة شفط ؛ لنقل السوائل شديدة الخطورة .

ذات الإنتفاخين ؛ لتببط حركة السوائل المندفعة .

الماصة هي الأكثر دقة في قياس حجوم السوائل ثم المخبر المدرج ثم الدوارق والكؤوس .

٨ سرعة التفاعل :-

نستخدم مخبر مدرج لحساب حجوم السوائل ،

نستخدم ساعة إيقاف لحساب الوقت ،

نستخدم ترمومتر لقياس درجة الحرارة .

نستخدم ميزان حساس لقياس الكتلة ،

٩ إذا أعطاك مكعب كبير فمتلئ بسائل وطلب عدد المكعبات الصغيرة التي تكفي للإمتلاء بنفس حجم السائل :-

فإن عدد المكعبات الصغيرة = حجم المكعب الكبير ÷ حجم المكعب الصغير

١٠ الأس الهيدروجيني pH والهيدروكسلي pOH :-

pH يتناسب طردياً مع تركيز أيون الهيدروكسيد $[OH^-]$ ، وعكسياً مع pOH وتركيز أيون الهيدروجين $[H^+]$ ،

أي كلما زاد الأس الهيدروجيني ؛ زاد تركيز أيون الهيدروكسيد (زادت القاعدية) وقل الأس الهيدروكسيلي وقل تركيز أيون الهيدروجين (قلت الحموضة) ، والعكس صحيح .

pOH يتناسب طردياً مع تركيز أيون الهيدروجين $[H^+]$ ، وعكسياً مع pH وتركيز أيون الهيدروكسيد $[OH^-]$ ،

أي كلما زاد الأس الهيدروكسيلي ؛ زاد تركيز أيون الهيدروجين (زادت الحموضة) وقل الأس الهيدروجيني وقل تركيز أيون الهيدروكسيد (قلت القاعدية) ، والعكس صحيح .

١١ الفرق بين التلاصق والتماسك :-



التماسك: عبارة عن ترابط الجسيمات المتماثلة ببعضها البعض ، مثل: ارتباط جسيمات



السائل بجسيمات السائل الآخر المجاور به في نفس الإناء .

التلاصق: عبارة عن ترابط الجسيمات المختلفة ببعضها البعض ،

مثل ارتباط جسيمات السائل بجدار الإناء الموضوع فيه .

- تلاقق وتماسك سائلين مختلفين :



سائل الماء: قوي التلاصق بين سائل الماء وجدار الإناء الموضوع به أكبر

من قوي التماسك بين جزيئات السائل نفسه ؛ لذا فسطح الماء مقعر .

سائل الزئبق: قوي التماسك بين جزيئات السائل نفسه أكبر من

قوي التلاصق بين سائل الزئبق وجدار الإناء الموضوع به ؛ لذا

فسطح الزئبق محدب .

الفصل الثاني

النانوتكنولوجي والكيمياء

محتويات الفصل

النانو والكيمياء

الاصول

التطبيقات النانوتكنولوجية

الاصول




النانو والكيمياء

1. البادئات

- عبارة عن مقاطع تسبق وحدات القياس قد تكون مضاعفات أو أجزاء من وحدة القياس .
- مضاعفات : بادئات تسبق وحدة القياس ويُعبر عنها بالأس العشري 10^n ($10^6 = 1000\ 000\ 000$) .

10^9	1000 000 000	مليار وحدة	Gega
10^6	1000 000	مليون وحدة	Mega
10^3	1000	ألف وحدة	Kilo
10^{-1}	0.1	جزء من عشر أجزاء من الوحدة	deci
10^{-2}	0.01	جزء من مائة جزء من الوحدة	centi
10^{-3}	0.001	جزء من ألف جزء من الوحدة	milli
10^{-6}	0.000 001	جزء من مليون جزء من الوحدة	micro
10^{-9}	0.000 000 001	جزء من مليار جزء من الوحدة	nano
10^{-12}	0.000 000 000 001	جزء من بليون جزء من الوحدة	pico
10^{-15}	0.000 000 000 000 001	جزء من بليون جزء من الوحدة	femto

- أجزاء : بادئات تسبق وحدة القياس ويُعبر عنها بالأس العشري 10^{-n} ($10^{-6} = 0.000\ 001$) .
- الترتيب التصاعدي للبادئات : (من الأقل تأثيراً وتركيزاً إلى الأكبر عند ثبوت الحجم) :-
- (الأقل) فيمتو > بيكو > نانو > ميكرو > ملي > سنتي > ديسي > كيلو > ميغا > جيجا (الأكبر) .



تحويلات العلاقة بين الوحدات والبادئات

- المليار (10^9) أكبر من المليون (10^6) ، ولكن الجزء من مليون (10^{-6}) أكبر من الجزء من مليار (10^{-9}) .
- التلوث البيئي يُقدر بوحدة جزء من مليون جزء من الوحدة .

« **أيهما أكثر ضرراً** : أن يكون تركيز مادة الرصاص السامة في مياه الشرب جزء من مليون من الوحدة أم جزء من مليار من الوحدة ؟!! »

الأكثر ضرراً أن يكون تركيز مادة الرصاص في المياه جزء من مليون (10^{-6}) لأن هذا المقدار أكبر من جزء من مليار جزء من الوحدة (10^{-9}) .

التحويلات : « للتحويل من الأكبر للأصغر نضرب في 10^n ، بينما للتحويل من الأصغر للأكبر نضرب في 10^{-n} . »
« باعتبار أن الوحدة هي المتر » .

• ميكرو متر = 10^{-6} m ، المتر = $10^6 \mu\text{m}$

10^{-3} mm ، المللي متر = $10^3 \mu\text{m}$

10^{-2} cm ، السنطي متر = $10^2 \mu\text{m}$

10^3 nm ، النانومتر = $10^{-3} \mu\text{m}$

• مللي متر = 10^{-3} m ، المتر = 10^3 mm

10^{-1} cm ، السنطي متر = 10 mm

$10^3 \mu\text{m}$ ، الميكرومتر = 10^{-3} mm

10^6 nm ، النانومتر = 10^{-6} mm

• نانومتر = 10^{-9} m ، المتر = 10^9 nm

10^{-7} cm ، السنطي متر = 10^7 nm

10^6 mm ، المللي متر = 10^6 nm

$10^{-3} \mu\text{m}$ ، الميكرومتر = 10^3 nm



أمثلة

« احسب مقدار كل من :

1. 0.03 s = ns

3. 2.41 cm = m

5. 294.5 nm = cm

7. 10 mm = nm

9. 8.43 cm = m

11. 5 mm = m

13. 6 nm = μm

2. 1.445 m = mm

4. 497.3 mg = μg

6. 2.41 cm = m

8. 903.3 nm = μm

10. 9 mol = nmol

12. 3 g = μg

2 مقياس النانو

١ مقياس : عبارة عن معيار أو مقدار لتحديد مدي الشيء .

٢ النانو : عبارة عن بادئة تسبق وحدات القياس وهي تساوي جزء من مليار جزء من الوحدة

مثل : النانومتر (nm) ، النانوجرام (ng) ، النانوثانية (ns) ، النانومول (nmol) ، النانوجول

(nJ) ، النانولتر (nL) .

٣ مقياس النانو : هو مقياس الجسيمات متناهية الصغر (الأصغر من الخلية

والأكبر من الذرة) ($10^{-9} \text{ m} : 10^{-7} \text{ m}$) ، تُظهر هذه الجسيمات (المواد) خواصاً

فريدة وفائقة عليه ، هذه الخواص تختلف عن خواصها علي مقياس الماكرو

أو مقياس الميكرو ، مثل : « الفيروسات ، الميتوكوندريا ، عرض DNA ، أنابيب

الكربون ، كرات البوكي ، الأسلاك النانوية ، الألياف النانوية ... » ولذا يُعتبر

النانو وحدة قياس فريدة .

٤ مقياس الماكرو : مقياس الأجسام التي تُرى بالعين المجردة ($10^{-3} \text{ m} : 1 \text{ m}$)

، مثل : « الإنسان ، كتاب المؤسس في الكيمياء ، دبوس ، حشرة ... » .

٥ مقياس الميكرو : مقياس الأجسام التي تُرى بالميكروسكوب ($10^{-6} \text{ m} : 10^{-4} \text{ m}$) ، مثل : شعرة رأس ، خلية دم ، بكتيريا

٦ النانومتر : وحدة قياس أبعاد (أقطار) الجسيمات متناهية الصغر والتي تتراوح أقطارها ما بين 1 : 100 nm



أمثلة علي وحدة النانومتر

قطر الذرة الواحدة

يتراوح ما بين 0.1 : 0.3 nm



قطر جزيء ماء

حوالي 0.3 nm تقريباً $= 0.3 \times 10^{-6} \text{ mm}$



قطر حبة رمل

حوالي $10^6 \text{ nm} = 1 \text{ mm}$



١ الحجم النانوي الحرج : هو الحجم الذي تظهر فيه الخواص الفريدة والفائقة للمادة ، والذي تكون أبعاد

دقائقه أقل من 100 nm

- ٢) **الخواص المعتمدة علي الحجم** : عبارة عن خواص المادة التي تتغير باختلاف الحجم النانوي لها ، مثل :
- ٣) **الخواص الكيميائية** :- مثل : سرعة التفاعل الكيميائي « حيث يصبح عدد ذرات سطح المادة المعرض للتفاعل كبير جداً عن حجمها وهي في حجم الماكرو أو الميكرو » .
- « سرعة احتراق نشارة خشب سرعة احتراق قطع متوسطة من الخشب سرعة احتراق قطع كبيرة من الخشب »
- « سرعة ذوبان مكعب من السكر في الماء سرعة ذوبان مسحوق هذا المكعب في نفس كمية الماء ودرجة الحرارة » « أي زادت مساحة السطح زادت سرعة التفاعل » .
- ٤) **الخواص الفيزيائية** :- مثل : اللون والشفافية ودرجة الانصهار و درجة الغليان والتوصيل الحراري والكهربائي « التوصيل الكهربائي لأنابيب الكربون < التوصيل الكهربائي لسلك نحاس » .
- ٥) **الخواص الميكانيكية** :- مثل الصلابة والمرونة . « صلابة النحاس النانوي < صلابة سلك نحاسي » .



تطبيقات علي الخواص المعتمدة علي الحجم





تغير لون الذهب بتغير حجمه

- ١) **تغير لون الذهب تبعاً لتغير الحجم النانوي له (خاصية فيزيائية)** :
- من المعروف بأن لون الذهب أصفر اللون ذو بريق معدني ؛ ولكن عند تقلص حجم دقائقه من مقياس الماكرو إلي مقياس النانو ، يتغير لونه وياخذ ألوان مختلفة (أحمر / برتقالي / أخضر / أزرق) حسب الحجم النانوي ... علل؟ وذلك لأن تفاعل الضوء المرئي مع دقائق الذهب النانوية يختلف عن تفاعله معها وهي علي مقياس الماكرو .
- ٢) **تغير صلابة النحاس تبعاً لتغير الحجم النانوي لدقائقه (خاصية ميكانيكية)** :
- عندما يتقلص حجم دقائق النحاس لتصبح في الحجم النانوي ؛ فإن صلابته تزداد ، حيث أن صلابة النحاس تختلف باختلاف الحجم النانوي لدقائقه .



نانو النحاس



- العلاقة بين صلابة النحاس و قطر الدقائق علاقة عكسية ، بينما العلاقة بين صلابة النحاس والحجم النانوي علاقة طردية .

تفسير الخواص الفريدة (الفائقة) للمواد النانوية :-

ترجع تلك الخواص الفريدة التي تظهرها المواد النانوية ؛ إلى النسبة (العلاقة) بين مساحة سطح المواد وحجمها.



تطبيق: العلاقة بين مساحة سطح مكعب وحجمه

عند تقسيم مكعب طول ضلعه 1cm إلى عدة مكعبات ؛ فإن مساحة سطحه تزداد مع ثبوت حجمه الكلي ، كما

هو موضح بالجدول :

مكعب واحد	تقسيم المكعب الي 8	تقسيم المكعب الي 27
		
1	8	27
1 cm	$\frac{1}{2}$ cm	$\frac{1}{3}$ cm
$1 \times 6 \times (1)^2$	$8 \times 6 \times (\frac{1}{2})^2$	$27 \times 6 \times (\frac{1}{3})^2$
$6 \text{ cm}^2 =$	$12 \text{ cm}^2 =$	$18 \text{ cm}^2 =$
$1 \text{ cm}^3 = 1 \times (1)^3$	$1 \text{ cm}^3 = 8 \times (\frac{1}{2})^3$	$1 \text{ cm}^3 = 27 \times (\frac{1}{3})^3$
$6 = (\frac{6}{1})$	$12 = (\frac{12}{1})$	$18 = (\frac{18}{1})$

عدد المكعبات

طول ضلع المكعب = 1 cm
مساحة الأسطح الكلية للمكعبات
التي تصنع من المكعبات
المكسرة = 6 cm²
الحجم الكلي = (طول الضلع)³
× عدد المكعبات




استنتاجات

نستنتج أنه كلما زاد تقسيم المادة (تقلص حجمها) تزداد النسبة بين مساحتها الكلية إلى حجمها الكلي ، وعندما تصبح المادة في الحجم النانوي ، تكون النسبة بين مساحة سطحها إلى حجمها كبيرة جداً للغاية ، مما يكسبها خواصاً فريدة وجديدة .

عال سرعة ذوبان مكعب من السكر في الماء أقل من سرعة ذوبان مسحوق هذا المكعب في نفس كمية الماء ودرجة الحرارة ... ؟

ف لان النسبة الكبيرة بين مساحة سطح المسحوق إلى حجمه تزيد من سرعة ذوبانه حيث يكون عدد الجزيئات المعرضة للذوبان كبير جداً علي عكس المكعب .

أثر زيادة مساحة السطح على معدل تفاعل الماغنسيوم



عال استخدام المواد النانوية في تطبيقات جديدة وفريدة ... ؟

لأن المواد النانوية تتميز بأن نسبة مساحة سطحها إلى حجمها كبير جداً بالمقارنة بالبعدين الماكرو والميكرو ؛ فيصبح عدد ذرات المادة المعرضة للتفاعل كثيرة جداً فتزداد سرعة تفاعلها مما يكسبها خواص كيميائية وفيزيائية وميكانيكية جديدة وفريدة لا تظهر في الحجمين الماكرو macro والميكرو micro .


عال سرعة احتراق قطعة صلبة من الخشب أقل من سرعة احتراق نشارة هذه القطعة من الخشب بنفس كمية الحرارة ... ؟
ج لان النسبة الكبيرة بين مساحة سطح النشارة إلى حجمها تزيد من سرعة احتراقها حيث يكون عدد الجزيئات المعرضة للاحتراق كبير جداً علي عكس القطعة الصلبة .

عال سرعة صدأ قطعة حديد أقل من سرعة برادة نفس القطعة في نفس درجة الحرارة ... ؟

ج لان النسبة الكبيرة بين مساحة سطح البرادة إلى حجمها تزيد من سرعة صدأها حيث يكون عدد الجزيئات المعرضة للصدأ والتآكل كبير جداً علي عكس القطعة



مفهوم النانوتكنولوجي -



ف النانوتكنولوجي : عبارة عن تكنولوجيا المواد متناهية الصغر ويختص بمعالجة المادة علي مقياس النانو ؛ لإنتاج مواد جديدة مفيدة وفريدة في خواصها .


2 كيمياء النانو

أحد فروع علم النانو ، التي :

- ١ تتعامل مع التطبيقات الكيميائية للمواد النانوية .
- ٢ تتضمن دراسة ووصف وتخليق المواد النانوية .
- ٣ تتعلق بالخواص الفريدة المرتبطة بتجميع الذرات والجزيئات ذات الأبعاد النانوية .

المواد النانوية لها أشكالاً عديدة ، منها ،

- ١ الحبيبات (النقاط الكمية)
- ٢ الأنابيب النانوية
- ٣ الأعمدة النانوية
- ٤ الألياف النانوية
- ٥ الأسلاك النانوية
- ٦ الأغشية الرقيقة
- ٧ الكرات
- ٨ الشرائح الدقيقة



أشكال نانوية



تُصنف المواد النانوية وفقاً لعدد أبعادها النانوية الثلاثة ، إلى ،

- ١ مواد أحادية البعد النانوي
- ٢ مواد ثنائية الأبعاد النانوية
- ٣ مواد ثلاثية الأبعاد النانوية

لاحظ أن: أي مادة مهما صغر حجم دقائقها فإنها تمتلك ثلاثة أبعاد (طول ، عرض ، ارتفاع) .



المواد أحادية البعد النانوي

◀ مواد يقدر أحد أبعادها الثلاثة علي مقياس النانو

الأمثلة :

الألياف النانوية



تستخدم في :

• صناعة مرشحات الماء .

الأسلاك النانوية



تستخدم في :

• صناعة مكونات الدوائر الإلكترونية .

الأغشية الرقيقة



تستخدم في :





• تغليف المنتجات الغذائية ، لحمايتها من التلوث والتلف .
• طلاء الأسطح لحمايتها من الصدأ والتآكل .

المواد ثنائية البعد النانوي

◀ مواد يقدر إثنين من أبعادها الثلاثة بمقياس النانو

الأمثلة :

أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار ، أنابيب الكربون النانوية عديدة الجدار



◀ الخواص المميزة لأنابيب الكربون النانوية :

① قدرتها الفائقة علي التوصيل :

◀ الكهربى (حيث توصيلها يفوق توصيل النحاس) .

◀ الحرارى (حيث توصيلها يفوق توصيل الماس) .

② الصلابة مع خفة الوزن ، فـ حبل من أنابيب الكربون النانوية بقطر شعرة الرأس

يمكنه أن يجبر (يحمل) قاطرة ، وهذه القوة ألهمت العلماء للتفكير في عمل أحبال

ذات متانة يمكن استخدامها في المستقبل في عمل مصاعد الفضاء .

③ ترتبط بسهولة بالبروتين ، لذا يمكن استخدامها في صناعة أجهزة الاستشعار البيولوجية .


④ قوى الترابط بين جزيئاتها ، لذا فإن أنابيب الكربون النانوية أقوى من الصلب .



يتم إعداد أنابيب الكربون بلف أغشية الكربون (الجرافيت) الرقيقة ، لاحظ :



لف



١) أنابيب الكربون النانوية أقوى من الصلب ؟

☑ بسبب قوي الترابط بين جزيئاتها .

٢) يعكف العلماء في استخدام لأنابيب الكربون في المستقبل في عمل مضاعف الفضاء ؟

☑ لأنها أقوى من الصلب وأخف منه حيث يمكن لسلك بحجم شعرة إنسان أن يحمل قاطرة بسهولة .


٣) استخدام أنابيب الكربون كأجهزة استشعار بيولوجية ؟

☑ لارتباطها بسهولة بالبروتين وحساسيتها تجله جزيئات معينة

المواد ثلاثية البعد النانوي

مواد تُقدر أبعادها الثلاثة بمقياس النانو

الأمثلة :




1 كرة البوكي

تتكون من 60 ذرة كربون . يُرمز لها بالرمز C60

تتميز بمجموعة من الخصائص التي تعتمد على تركيبها الجزيئي .

النموذج الجزيئي لها يبدو ككرة قدم مجوفة ، لذا يختبر العلماء مدى فاعليتها كحامل للأدوية داخل جسم الإنسان .. علل ؟ وذلك لأن شكلها الكروي المجوف يمكنها من حمل جزيئات من دواء معين بداخلها ، في حين يقاوم سطحها الخارجي التفاعل مع جزيئات أخرى داخل الجسم .

تُعرف باسم الفوليرين .



كرات البوكي أثناء حملها لدواء معين

2 صدفة النانو : عبارة عن جسيمات نانوية تتكون من جزيئين وهما :

1 اللب الذي يُصنع من مواد غير موصلة ك السيليكا .

2 الصدف التي تُصنع من غلاف معدني رقيق جداً وغالباً ما يكون من الذهب .

تستخدم في علاج السرطان .



الصدفة


صدفة النانو

علل يختبر العلماء الآن فاعلية كرات البوكي كحامل للأدوية ؟ حيث أن شكلها الكروي المجوف يمكنها من حمل جزيئات من دواء معين بداخلها ، بينما الجزء الداخلي لكرات البوكي مقاوم للتفاعل مع جزيئات أخرى داخل الجسم .

معلومات متضمنة :

التآصل : مفهوم كيميائي يُقصد به تواجد المادة الواحدة في عدة صور بللورية مختلفة وإن كانت تتفق في تركيبها الكيميائي

الكربون (الجرافيت) أو الماس يمتلك ثمانية صور تأصلية كما هو موضح بالشكل :



2 جرافيت (الفحم الحجري)

1 الماس

4 كرة بوكي

3 لونسيداليت

6 كرة بوكي

5 كرة بوكي

8 أنبوب كربون نانوي

7 الكربون الغير متبلور

تدريب

١ عند وجود الرصاص في ماء نهر النيل فإن شربه يسبب تدمير خلايا المخ ، فأبي العينات الآتية تسبب الضرر الأكبر ؟

- أ عينة بها 10^{-15} وحدة .
 ب عينة بها 10^{-6} وحدة .
 ج عينة بها 10^{-8} وحدة .
 د عينة بها 10^{-10} وحدة .

٢ الترتيب الصحيح للبيانات الآتية من الأصغر إلى الأكبر هو

- أ نانو ميلي سنتي كيلو .
 ب ميلي نانو سنتي كيلو .
 ج سنتي ميلي نانو كيلو .
 د كيلو ميلي سنتي نانو .

٣ سائل حجمه 15.7 mL ، ما مقدار هذا الحجم بوحدة النانولتر (nL) ؟

- أ 1.57×10^{-5} ب 9.62 ج 1.57×10^{-7} د 9.62×10^5

٤ أي زوج من الكميات الآتية متساوي الكتلة ؟

- أ 0.1mg / 0.001 g ب 107ng / 0.1 mg
 ج 107μg / 102 mg د $10^{-4}\mu\text{g}$ / 0.1 ng

٥ أي من عمليات القياس التالية غير صحيحة ؟

- أ 1μL / 1000 nL ب 1L / 1000 mL
 ج 1cg / 100 g د 1000 m / 1 km

٦ 270.3 cm^3 تساوي

- أ 3.703 L ب 37.03 L ج 0.3703 L د 370.3 L

٧ الذرة التي قطرها 0.6nm تعادل

- أ $6\text{m} \times 10^{-9}$ ب $6\text{m} \times 10^{-6}$
 ج $6\text{m} \times 10^{-8}$ د $6\text{m} \times 10^{-10}$

٨ نصف قطر ذرة الهيدروجين $0.3 \times 10^{-10} \text{ m}$ ، ما مقدار نصف قطر الذرة بوحدة النانومتر ؟

- أ 0.3×10^{-9} ب 0.1×10^{-10} ج 0.3×10^{-1} د 0.3×10^{-19}

٩ 42.66g تساوي

- أ 42.66mg ب $4.266 \text{ mg} \times 10^6$
 ج 4266mg د $0.04266\text{mg} \times 10^6$


١٠ 1mm يساوي نانومتر .

- أ 1×10^{-8} ب 10×10^{-7} ج 1×10^9 د 10×10^{-5}

تطبيقات النانوتكنولوجية

1 تطبيقات النانوتكنولوجية

يعتقد العلماء أن علوم النانوتكنولوجي قادرة على تقديم حلول عملية كثيرة لكثير من المشكلات التي تواجهنا في العديد من المجالات :- كـ (الطب - الزراعة - الطاقة - الاتصالات - الصناعة - البيئة - وغيرها من المجالات ...) .



كرات نانوية محملة بالأدوية

التشخيص المبكر للأمراض وتصوير الأعضاء والأنسجة .
توصيل الدواء بدقة إلى الخلايا والأنسجة المصابة فقط دون الإضرار بالخلايا السليمة ، مما يزيد من فرص الشفاء .



التصاق الروبوت بالخلايا المصابة




روبوتات نانوية

يقلل من الأضرار الجانبية التي يقع فيها العلاج التقليدي والذي لا يفرق في تأثيره بين الخلايا المصابة والخلايا السليمة .

إنتاج روبوت نانوي وإطلاقه في تيار الدم لإزالة الجلطات الدموية من جدر الشرايين دون تدخل جراحي .

إنتاج أجهزة متناهية الصغر للغسيل الكلوي
تُزرع بأجسام المصابين بالفشل الكلوي.



حفظ المواد الغذائية .

التعرف علي البكتريا الموجودة في الغذاء .

إنتاج وتطوير مواد غذائية ومبيدات حشرية وأدوية للنباتات والحيوانات بمواصفات خاصة .

إنتاج خلايا شمسية باستخدام نانو السيليكون ، تتميز بقدرة عالية علي تحويل الطاقة الشمسية إلي طاقة كهربية ، دون منع تسرب (فقد) الطاقة الحرارية « أي تحول الطاقة الشمسية إلي طاقتين كهربية وحرارية علي عكس الخلايا الشمسية العادية » إنتاج وقود هيدروجيني عالية الكفاءة ومنخفضة الطاقة .

لاحظ :- الفرق بين الخلايا الشمسية العادية وخلايا نانو السيليكون : أن الخلايا الشمسية العادية تحول الطاقة الشمسية إلي كهربية مع تسرب الطاقة الحرارية ، بينما خلايا نانو السيليكون تحول الطاقة الشمسية إلي كهربية مع منع تسرب الطاقة الحرارية التي يُستفاد منها أيضاً بالإضافة إلي قدرتها العالية علي التحويل.

إنتاج أجهزة النانو الأسلكية والهواتف المحمولة والاقمار الصناعية .

تصنيع شرائح إلكترونية تتميز بقدرة عالية علي التخزين .

تقليص حجم الترانزستورات .

مجال الزراعة

تكنولوجيا الطاقة

مجال الاتصالات



إنتاج جزيئات نانوية غير مرئية تُكسب الزجاج والخزف خاصية التنظيف الذاتي (التلقائي).

إنتاج مواد نانوية تدخل في صناعة مستحضرات التجميل والكريمات المضاء لأشعة الشمس (مثل : ثاني أكسيد التيتانيوم) علل؟ حيث تقوم بتفنية أشعة الشمس من الأشعة فوق البنفسجية الضارة المصاحبة لها.



إنتاج طلاءات نانوية تكوّن طبقات تغلف شاشات الأجهزة الإلكترونية لحمايتها من الخدش .

تصنيع أنسجة طاردة للبقع وتتميز بالتنظيف الذاتي .
• إنتاج مرشحات نانوية يستفاد منها في :



تنقية وتطهير المياه

تنقية الماء والهواء .

تطهير المياه .


حل مشكلة النفايات النووية .

إزالة العناصر الخطرة من النفايات الصناعية .

علي الرغم مما قدمته تكنولوجيا النانو للبشرية بالإضافة إلى ما سوف تقدمه ؛ إلا أن الخبراء يعتقدون أن تعميم استخدامها في كافة جوانب الحياة ، قد تكون له عواقب وخيمة علي البشرية ، لما لها من التأثيرات التالية :

اختراق جزيئات النانو الدقيقة جداً جداً لأغشية خلايا الجلد والرئة ، واستقرارها داخل الجسم ذلك قد يؤدي إلى حدوث كوارث صحية .

نفايات التلوث النانوي تكون علي درجة عالية من الخطورة ... علل ؟
بسبب دقة حجمها ، حيث يمكنها اختراق الخلايا النباتية والحيوانية بسهولة جداً .



تأثيرها الفعال علي كل من :

الماء .

الهواء .

المناخ .

التربة .

التلوث النانوي : هو التلوث بالنفايات الناجمة عن عمليات تصنيع المواد النانوية .
• سوف تزيد تكنولوجيا النانو من حدة المشكلات الناتجة عن

عدم المساواة الإجتماعية والاقتصادية حيث أنها ستكون في متناول الدول الغنية والأفراد الغنية فقط .

التوزيع غير العادل للتكنولوجيا والثروات .

التأثيرات الاجتماعية

تدريب 2

١) تستخدم جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم في صناعة مُستحضرات التجميل لتحسين خواصها مثل

أ) الوقاية من أشعة الشمس .

ب) اللون .

ج) الملمس .

٢) للتغلب علي مُشكلة الطاقة بسبب نقص الاحتياطي العالمي للوقود الحفري يُفضل استخدام

أ) خلايا شمسية عادية .

ب) خلايا شمسية نانوية وخلايا وقود هيدروجيني .

ج) المُرشحات النانوية .

د) بطاريات الرصاص .

٣) من أفضل المواد النانوية التي تُستخدم للفضاء علي البكتريا في مجال الزراعة

أ) كرة البوكي .

ب) صدف النانو .

ج) الأسلاك النانوية .

د) الألياف النانوية .

ملاحظات

١) الأجسام التي تقع في هذا المدي (10^{-3} , 10^{-7} , 10^{-1}) تُرى بالعين المجردة (حجم الملي) ، الأجسام التي

تقع في هذا المدي (10^{-6} , 10^{-5} , 10^{-4}) تُرى بالميكروسكوب (حجم الميكرو) ، الجسيمات التي تقع في

هذا المدي (10^{-9} , 10^{-8} , 10^{-7}) تُرى بمقياس النانو (حجم النانو) .

٢) الملي يُكافي السنتي متر مكعب ($1\text{L} = 1000\text{ mL} = 1000\text{ cm}^3$) .

٣) للحكم علي أن المادة نانوية أم لا ؛ لا بُد من أن يكون بُعد واحد علي الأقل من أبعادها الثلاثة يقع في مدي

الحجم النانوي الحرج ($1:10\text{nm}$) ؛ ف تُظهر المادة خصائصها الفريدة والفائقة .

٤) الجسيمات المُغطاة بالذهب النانوي تُستخدم في علاج السرطان (صدفة النانو) وهي عبارة عن دقائق

من السليكا

٥) المادة أحادية البُعد : بُعد واحد فقط يتراوح ما بين ($1:100\text{nm}$) ، المادة ثنائية البُعد : بُعدين فقط يتراوحا

ما بين ($1:100\text{nm}$) ، المادة ثلاثية البُعد : الثلاث أبعاد يتراوحوا ما بين ($1:100\text{nm}$) .

٦) المواد تبدأ في ظهور خواصها الفريدة بدايةً من الحجم النانوي الحرج 1nm وتزداد هذه الخواص بزيادة

الحجم النانوي الحرج و تثبت هذه الخواص إذا زاد الحجم عن 100nm (أي تخطي الحجم النانوي الحرج) .

٧) كلما قل حجم الدقيقة الواحدة (قطر الدقيقة) كلما زادت الخواص الفريدة (كصلابة النحاس مثلاً) .

٨) إذا كانت لديك قطعة طلبة من مادة ما و قُمت بتجزئتها فزيادة التجزئة يحدث الآتي :-

أ) يزداد عدد الدقائق .

ب) تزداد الخواص الفريدة والفائقة للمادة .

٢١ يزداد الحجم النانوي الحرج من 1 nm إلى 100nm

٢٢ تزداد صلابة الدقيقة الواحدة مقارنة بالقطعة الصلبة .

٢٣ تزداد النسبة بين المساحة الكلية والحجم الكلي .

٢٤ الحجم الكلي يظل ثابتاً .

٢٥ يزداد التوصيل الكهربائي والحراري .

٢٦ علاقات هامة :

٢٧ العلاقة بين مساحة السطح والحجم الكلي : علاقة ثابتة .

٢٨ العلاقة بين مساحة السطح وحجم الدقائق : علاقة عكسية .

٢٩ العلاقة بين مساحة السطح وعدد الدقائق : علاقة طردية .

٣٠ العلاقة بين مساحة السطح وصلابة النحاس : علاقة طردية .

٣١ العلاقة بين مساحة السطح وعدد ألوان الذهب : علاقة طردية .

٣٢ العلاقة بين عدد ذرات السطح الخارجي وحجم الدقائق : علاقة عكسية .

٣٣ العلاقة بين عدد ذرات داخل المادة وحجم الدقائق : علاقة طردية .

٣٤ الكربون يكون مواد أحادية البعد ، مثل : الغشاء الكربوني (الليفة الكربونية) ، ويكون مواد ثنائية البعد ،

مثل : أنابيب الكربون أحادية وعديدة الجدر ، ويكون مواد ثلاثية البعد ، مثل : كرة البوكي .

٣٥ طول الخط بالمتر لعدد من ذرات مادة ما = قطر الذرة الواحدة بالمتر \times عدد الذرات .

٣٦ تقنية النانو لها تطبيقات متعددة مثل المجال الطبي حيث تُستخدم تقنية النانو في صورة طب النانو .

٣٧ من أمثلة المواد أحادية البعد : الأغشية الرقيقة ، المرشحات النانوية ، الألياف النانوية ، الأسلاك النانوية

، الشرائح الدقيقة ، الشاشات الإلكترونية ، الزجاج والخزف النانوي .

٣٨ من أمثلة المواد ثنائية البعد : الأنابيب النانوية ، الأعمدة النانوية ، الأسطوانات النانوية .

٣٩ من أمثلة المواد ثلاثية البعد : الكرات النانوية ، الصفات النانوية ، الحبيبات (النقاط الكمية) .

٤٠ أنابيب الكربون عبارة عن أغشية رقيقة وأسلاك كربون مترابطة معاً .

٤١ النانو يدخل في صناعة الكريمات والعدسات والمغناطيسيات والكابلات الكهربائية والأجهزة البصرية

والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الحرارية والخلايا المُعالجة للسرطان وإصلاح العظام والعضلات التالفة

و الأواني الفخارية والأغشية الجدرانية والمصاعد والمغذيات والأسمدة والمبيدات ومخزنات الأغذية

والمراقبة البشرية والشاشات الإلكترونية والأقمشة والأنسجة والسفن والمراكب المضادة للتآكل

والصدأ والردايات الطاردة للبقع وأجهزة المسح الجيولوجي والخلايا الحمراء النانوية

٤٢ علاج السرطان يعتمد علي علم الكيمياء والنانو والطب والصيدلة والبيولوجي .





حنّاوي

الباب الثاني

الكيمياء الكمية

إعداد : د/ أحمد الحناوي

الفصل الأول

المول والمعادلة الكيميائية

محتويات الفصل

التمهيد

1

المعادلة الكيميائية

2

المول

3

مراجعة سريعة علي رموز بعض العناصر والمجموعات الذرية

أولاً:

لقد تعرفنا علي أنه يوجد ثلاثة أنواع من العنصر بناءً علي عدد ذراته ، وهم :-

1- عنصر أحادي الذرة

وقد يكون : < مادة صلبة : مثل « الصوديوم (Na) ، والبوتاسيوم (K) ، والكالسيوم (Ca) ، والحديد (Fe) ، والكبريت (S) والكربون (C) ، والفوسفور (P) ... إلخ » .
< غاز خامل (نبيل) : وهي مجموعة في كلمة « هناك زر » الهيليوم (He) والنيون (Ne) والارجون (Ar) والكريبتون (Kr) ، والزينون (Xe) والرادون (Rn) .

2- عنصر ثنائي الذرة

< وهم 7 عناصر فقط ، وقد يكون :
< غاز في الظروف العادية : وهم « غاز النيتروجين (N_2) وغاز الهيدروجين (H_2) وغاز الأكسجين (O_2) » .
< الهالوجينات : وهم « الفلور (F_2) والكلور (Cl_2) والبروم (Br_2) واليود (I_2) » .

3- عنصر عديد الذرات

< وهم « غاز الأوزون (O_3) وأبخرة الفوسفور (P_4) وأبخرة الكبريت (S_8) » .

لاحظ الجدول التالي جيداً

ذرة صوديوم = جزئ الصوديوم = عنصر الصوديوم .
ذري صوديوم غير متحدتين .
أيون صوديوم موجب = كاتيون صوديوم .
ذرة كلور .
ذري كلور غير متحدتين .
أيون كلوريد سالب = أنيون كلوريد .
جزئ الكلور مكون من اتحاد ذرتين كلور .
جزئ كلوريد الصوديوم مكون من اتحاد ذرة صوديوم مع ذرة كلور .
جزيئين من كلوريد الصوديوم .

Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn

1 خلية كتابة المركبات الأيونية

تتكون الرابطة الأيونية نتيجة

أولاً

ب- لافلز يكتسب يتحول لآنيون .

أ- فلز يفقد يتحول لكاتيون .

الكاتيون قد يكون ذرة عنصر فلزي أو مجموعة ذرية موجبة (NH_4^+) «مجموعة الأمونيوم» .

الآنيون قد يكون ذرة عنصر لافلزي أو مجموعة ذرية سالبة .

كاتيون + أنيون = جزئ مركب أيوني

66

رموز وتكافؤات بعض الكاتيونات والآنيونات :-

الفلز	الرمز	التكافؤ	الكاتيون أو الأنيون	ما يحدث للفلز
الهيدروجين	H	أحادي	كاتيون الهيدروجين H^+ مع اللافلزات آنيون الهيدريد H^- مع الفلزات النشطة	$\text{H}^0 \rightarrow \text{H}^+ + \text{e}^-$ $\text{H}^0 + \text{e}^- \rightarrow \text{H}^-$
ليثيوم	Li	أحادي	كاتيون الليثيوم Li^+	$\text{Li}^0 \rightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$
صوديوم	Na	أحادي	كاتيون الصوديوم Na^+	$\text{Na}^0 \rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$
بوتاسيوم	K	أحادي	كاتيون البوتاسيوم K^+	$\text{K}^0 \rightarrow \text{K}^+ + \text{e}^-$
فضة	Ag	أحادي	كاتيون الفضة Ag^+	$\text{Ag}^0 \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{e}^-$
فلور	F	أحادي	آنيون الفلوريد F^-	$\text{F}^0 + \text{e}^- \rightarrow \text{F}^-$
كلور	Cl	أحادي	آنيون الكلوريد Cl^-	$\text{Cl}^0 + \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-$
بروم	Br	أحادي	آنيون البروميد Br^-	$\text{Br}^0 + \text{e}^- \rightarrow \text{Br}^-$
يود	I	أحادي	آنيون اليوديد I^-	$\text{I}^0 + \text{e}^- \rightarrow \text{I}^-$
بيريليوم	Be	ثنائي	كاتيون البيريليوم Be^{2+}	$\text{Be}^0 \rightarrow \text{Be}^{2+} + 2\text{e}^-$
ماغنسيوم	Mg	ثنائي	كاتيون الماغنسيوم Mg^{2+}	$\text{Mg}^0 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^-$
كالسيوم	Ca	ثنائي	كاتيون الكالسيوم Ca^{2+}	$\text{Ca}^0 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^-$
إستراتشيوم	Sr	ثنائي	كاتيون الإستراتشيوم Sr^{2+}	$\text{Sr}^0 \rightarrow \text{Sr}^{2+} + 2\text{e}^-$
باريوم	Ba	ثنائي	كاتيون الباريوم Ba^{2+}	$\text{Ba}^0 \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^-$
زنك	Zn	ثنائي	كاتيون الزنك Zn^{2+}	$\text{Zn}^0 \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$
كاديوم	Cd	ثنائي	كاتيون الكاديوم Cd^{2+}	$\text{Cd}^0 \rightarrow \text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^-$

المنصر	الرمز	التكافؤ	الكاتيون أو الأنيون	ما يحدث للمنصر
أكسجين	O	ثنائي	آنيون الأكسيد O^{2-}	$O^0 + 2e^- \rightarrow O^{2-}$
كبريت	S	ثنائي	آنيون الكبريتيد S^{2-}	$S^0 + 2e^- \rightarrow S^{2-}$
بورون	B	ثلاثي	كاتيون البورون B^{3+}	$B^0 \rightarrow B^{3+} + 3e^-$
ألومنيوم	Al	ثلاثي	كاتيون الألومنيوم Al^{3+}	$Al^0 \rightarrow Al^{3+} + 3e^-$
سكانديوم	Sc	ثلاثي	كاتيون السكانديوم Sc^{3+}	$Sc^0 \rightarrow Sc^{3+} + 3e^-$
نيتروجين	N	ثلاثي	آنيون النيتريد N^{3-}	$N^0 + 3e^- \rightarrow N^{3-}$
فوسفور	P	ثلاثي	آنيون الفوسفيد P^{3-}	$P^0 + 3e^- \rightarrow P^{3-}$
نحاس	Cu	أحادي وثلاثي	كاتيون النحاس Cu^{2+} , Cu^+ (نحاسوزا)، (نحاسيك II)	$Cu^0 \rightarrow Cu^+ + e^-$ $Cu^0 \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$
زئبق	Hg	أحادي وثلاثي	كاتيون الزئبق Hg^{2+} , Hg^+ (زئبقوزا)، (زئبقيك II)	$Hg^0 \rightarrow Hg^+ + e^-$ $Hg^0 \rightarrow Hg^{2+} + 2e^-$
حديد	Fe	ثنائي وثلاثي	كاتيون الحديد Fe^{3+} , Fe^{2+} (حديدوزا II)، (حديديك III)	$Fe^0 \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ $Fe^0 \rightarrow Fe^{3+} + 3e^-$
ذهب	Au	أحادي وثلاثي	كاتيون الذهب Au^{3+} , Au^+	$Au^0 \rightarrow Au^+ + e^-$ $Au^0 \rightarrow Au^{3+} + 3e^-$
رصاص	Pb	ثنائي ورباعي وسداسي	كاتيون الرصاص Pb^{2+} , Pb^{4+} , Pb^{6+}	$Pb^0 \rightarrow Pb^{2+} + 2e^-$ $Pb^0 \rightarrow Pb^{4+} + 4e^-$ $Pb^0 \rightarrow Pb^{6+} + 6e^-$

الرموز الرومانية

I ← تُعني 1	II ← تُعني 2
III ← تُعني 3	IV ← تُعني 4
V ← تُعني 5	VI ← تُعني 6
VII ← تُعني 7	VIII ← تُعني 8

المجموعات الأيونية لبعض المجموعات الذرية


المجموعه الذرية	الرمز وعدد الأكسجين	التكافؤ
أمونيوم	NH_4^+	أحادية
هيدروكسيد	OH^-	أحادية
نترات	NO_2^-	أحادية
نترات	NO_3^-	أحادية
بيكربونات	HCO_3^-	أحادية
بيكربونات	HSO_4^-	أحادية
فوسفات ثنائي الهيدروجين	H_2PO_4^-	أحادية
هيبوكلوريت	ClO^-	أحادية
كلوريت	ClO_2^-	أحادية
كلوريت	ClO_3^-	أحادية
موقع كلورات = بيروكلورات	ClO_4^-	أحادية
سيانيد	CN^-	أحادية
سيانات	CNO^-	أحادية
ثيوسينات	SCN^-	أحادية
برمنجانات	MnO_4^-	أحادية
ألومينات	AlO_2^-	أحادية
فورمات	HCOO^-	أحادية ومجموعة عضوية
أسيتات = خلالات	CH_3COO^-	أحادية ومجموعة عضوية
كبريتيت	SO_3^{2-}	ثنائية
كبريتات	SO_4^{2-}	ثنائية
بيوكبريتات	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	ثنائية
رباعي ثيونات	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$	ثنائية
كربونات	CO_3^{2-}	ثنائية
كرومات	CrO_4^{2-}	ثنائية
بيكرومات = ثاني كرومات	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	ثنائية
فوسفات أحادية الهيدروجين	HPO_4^{2-}	ثنائية
منجانات	MnO_4^{2-}	ثنائية
سيليكات	SiO_3^{2-}	ثنائية
فانديكات = زنكات	ZnO_2^{2-}	ثنائية
سيتاميد	CN_2^{2-}	ثنائية
أوكسالات	$(\text{COO})_2^{2-}$	ثنائية ومجموعة عضوية
فوسفات	PO_4^{3-}	ثلاثية
بورات	BO_3^{3-}	ثلاثية

« يتكون المركب الأيوني من مقطعين (كاتيون + أنيون) وعند الكتابة يُكتب الكاتيون جهة اليسار والانيون جهة اليمين؛ إلا إذا كان الانيون شق عضوي (مجموعة ذرية عضوية) نكتب الشق العضوي جهة اليسار والكاتيون جهة اليمين ، ثم نبدل التكافؤات ونكتب الصيغة » .


66

علي سبيل المثال (١) :


١ هيدروكسيد الصوديوم .




٢ نترات البوتاسيوم .




٣ كبريتات الباريوم .




٤ كربونات الكالسيوم .




٥ برمنجانات البوتاسيوم .




٦ فوسفات الأمونيوم .




٧ كلوريد الحديدك .




٨ كرومات الذهب III .




٩ سيانيد الماغنسيوم .




١٠ نيتريت الألومنيوم .



أسيتات الصوديوم



١٢ فورمات النحاسوز.



1 **تدوین**

موسسات هیدروگمید کربنید کبریات کروانات یشرف شراب

رمضان

تکامل

الحائز

991

الوطن

الاعتماد

مؤدیر

كالتسليم

09090

penitig

ليبيوم

2 المراتب التساهمية :

< أمثلة لهذه المركبات :

- ١ أول أكسيد الكربون (CO)
٣ أكسيد النيتروز (N₂O)
٤ أول أكسيد النيتروجين = أكسيد النيتريك (NO)
٥ ثاني أكسيد النيتروجين (NO₂)
٧ رابع أكسيد النيتروجين (N₂O₄)
٩ ثالث فلوريد البورون (BF₃)
١١ خامس بروميد الفوسفور (PBr₅)
١٣ رابع كلوريد الكبريت (SCl₄)
١٥ كلوريد الهيدروجين (HCl)
١٧ فلوريد الهيدروجين (HF)
١٩ الماء (H₂O)
٢١ الفوسفين (PH₃)
٢٣ الإيثان (C₂H₆)
٢٥ الإيثاين (C₂H₂)
٢ ثاني أكسيد الكربون (CO₂)
٦ ثالث أكسيد النيتروجين (N₂O₃)
٨ خامس أكسيد النيتروجين (N₂O₅)
١٠ رابع كلوريد الكربون (CCl₄)
١٢ سادس فلوريد الكبريت (SF₆)
١٤ يوديد الهيدروجين (HI)
١٦ بروميد الهيدروجين (HBr)
١٨ سابع فلوريد اليود (IF₇)
٢٠ النشادر (الأمونيا) (NH₃)
٢٢ الميثان (CH₄)
٢٤ الإيثين (C₂H₄)

3 الأحماض :

أ الأحماض الأكسجينية :

- ١ حمض النيتروز (HNO₂)
٣ حمض الكبريتوز (H₂SO₃)
٥ حمض الثيوكبريتيك (H₂S₂O₃)
٧ حمض الفوسفوروز (H₃PO₃)
٨ حمض الفوسفوريك = الآرثوفوسفوريك (H₃PO₄)
٩ حمض الكربونيك (H₂CO₃)
١١ حمض البوريك (H₃BO₃)
٢ حمض النيتريك (HNO₃)
٤ حمض الكبريتيك (H₂SO₄)
٦ حمض الهيوفوسفوروز (H₃PO₂)
١٠ حمض البيروكلوريك (HClO₄)

ب الأحماض الهالوجينية :

- ١ حمض الهيدروفلوريك (HF)
٣ حمض الهيدروبروميك (HBr)
٤ حمض الهيدروكلوريك (HCl)
٥ حمض الهيدرويوديك (HI)

ج الأحماض العضوية :

- ١ حمض الخليك = الأستيك (CH₃COOH)
٣ حمض الأوكساليك ((COO)₂H₂)
٥ حمض اللاكتيك (C₃H₆O₃)
٢ حمض الفورميك (HCOOH)
٤ حمض الستريك (C₆H₈O₇)

٢٤ أيا من الأحماض الآتية تسميته غير صحيحة؟

أ حمض الهيدروكلوريك HCl

ب حمض الكبريتيك H_2SO_3

ج حمض النيتريك HNO_3

د حمض الكربونيك H_2CO_3

٢٥ أيا من الأزواج الآتية غير صحيحة؟

أ بروميد الألومنيوم $AlBr_3$

ب نترات الكالسيوم $Ca(NO_2)_2$

ج كبريتات الرصاص $Pb(SO_4)_2$ IV

د بيكرومات الزئبق $HgCr_2O_7$

٢٦ إذا كان (X) ذرة فلز تحتوي في غلاف تكافؤها علي إلكترونين فقط ، (Y) ذرة لافلز تحتوي في غلاف

تكافؤها علي خمسة إلكترونات ؛ فإن الصيغة الافتراضية لمركب يتكون منهما

أ X_2Y_3

ب XY_2

ج X_2Y

د X_3Y_2

٢٧ يتفاعل الفلز X مع لافلز النيتروجين لتكوين المركب X_3N_2 .. ما اسم الفلز X ؟

أ الصوديوم .

ب الألومنيوم .

ج البريليوم .

د البورون .

٢٨ أيا من الأزواج الآتية غير صحيح ؟

أ كلوريد التيتانيوم $TiCl_4$ IV

ب أكسيد الألومنيوم Al_2O_3

ج منجانات البوتاسيوم $KMnO_4$

د أسيتات الرصاص $(CH_3COO)_2Pb$ II

٢٩ مركب ما ؛ خارج قسمة مجموعاته الذرية علي كاتيونه $= \frac{2}{3}$ ؛ فإن تكافؤ الكاتيون

أ أحادي .

ب ثنائي .

ج ثلاثي .

د رباعي .

٣٠ الصيغة الكيميائية لمركب أوكسالات الحديدوز

أ C_2O_4Fe

ب $Fe_2(C_2O_4)_3$

ج $(C_2O_4)_2Fe$

د $C_2O_4Fe_2$

٣١ إذا كانت عدد مجموعات الهيدروكسيد الموجودة في الماء الناتج من تفاعل تعادل = 6 مجموعات ؛ فإن

القاعدة المتفاعلة مع حمض الكبريتيك قد تكون

أ NH_4OH

ب $Al(OH)_3$

ج $NaOH$

د $Ca(OH)_2$

٣٢ أيا من الأحماض الآتية حمض أكسجيني ؟

أ حمض الهيدروسيانيك .

ب حمض الهيدروفلوريك .

ج حمض البيروكلوريك .

د حمض الهيدروكبريتيك .

١٠ أيا من أسماء المركبات الآتية غير صحيح ؟.....

أ فوسفات الأمونيوم .

ب كبريتات الإسترانسيوم II

ج خامس أكسيد الفوسفور .

د نترات النحاس II

١١ اكتب صيغ المركبات الآتية :-

أ هيدروكسيد الحديد III

ب كربونات الكالسيوم

ج نيتريت الأمونيوم

د ثيوسيانات الفضة

هـ كبريتات الباريوم

و فوسفات الرصاص II

ز بخار الكبريت

ح فورمات الحديد II

ط رابع بروميد الكربون

ي كبريتيد الليثيوم

ك نيتريد البورون

ل بورات الماغنسيوم

م أسيتات الكوبلت II

ن زنكات الألومنيوم

الحناوي

المعادلة الكيميائية

المعادلة الكيميائية

هي مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية للمواد المتفاعلة والنواتج من التفاعل ويربط بين المتفاعلات (التي تقع في يسار المعادلة) والنواتج (التي تقع في يمين المعادلة) بسهم يُحدد اتجاه سير التفاعل (من اليسار إلى اليمين) وتكتب شروط التفاعل فوق السهم .

أحد المعادلات الكيميائية يتضمن أساسيات وهم:

١ متفاعلات . ٢ نواتج .

٣ سهم يربط بينهما وعليه شروط التفاعل .

لكل تتعرف جيداً علي المعادلة الكيميائية وكيفية وزنها لأبداً من التعرف علي :-

التفاعل الكيميائي

« عبارة عن كسر الروابط الأصلية بين جزيئات المتفاعلات وتكوين روابط جديدة بين جزيئات النواتج ، ولكن كسر الروابط وتكوينها يحتاج إلي شروط وليكن التسخين مثلاً فهو من شروط التفاعل »

علي سبيل المثال (١) :

« خلط برادة من الحديد مع مسحوق كبريت لا يحدث تفاعل كيميائي !!! نظراً لعدم حدوث كسر في روابط المتفاعلات لتتكون نواتج ، اما عند تسخين هذا الخليط يتكون مركب كيميائي يُسمى بـ كبريتيد الحديد II (كبريتيد الحديدوز) ، لاحظ المعادلة »



المتفاعلات :

« مواد كيميائية (ذرات أو جزيئات أو أيونات) تتحد معاً لتكون مواد جديدة وتكتب علي يسار السهم ، فالحديد والكبريت في المعادلة السابقة متفاعلات »

النواتج

« مواد كيميائية (ذرات أو جزيئات أو أيونات) تنتج من التفاعل الكيميائي وتكتب علي يسار السهم ، فكبريتيد الحديدوز ناتج »

شروط التفاعل

« تُكتب علي السهم الذي يُحدد اتجاه سير التفاعل وبدونها لن يحدث التفاعل ، وهي قد تكون :-

١ حرارة ويُرمز لها بالرمز دلتا (Δ) أو ($^{\circ}\text{C}$)

٢ ضغط ويُرمز لها بالرمز (P) اختصار كلمة (Pressur) .

٣ عوامل حفازة « وهي عبارة عن عناصر فلزية مثل (الحديد Fe - النيكل Ni - البلاتينوم Pd

- الكوبلت Co - البلاتين Pt ...) وهذه العناصر تعمل علي زيادة سرعة التفاعل الكيميائي

ويُفضل أن تكون مُجزأة لزيادة مساحة السطح المُعرضة للتفاعل فتزداد سرعة التفاعل

الكيميائي ، حيثُ أن التفاعل يحدثُ علي سطح العامل الحفاز « وقد تُكتب مُختصرة علي

سهم التفاعل بـ (Cat) اختصاراً لكلمة (Catalysts) .

أمثلة علي تفاعل محفز :



الحالات الفيزيائية

« وهي عبارة عن رموز تُكتب أسفل يمين الرمز الكيميائي للعنصر أو اللصيغة الكيميائية للمركب

في كل من المتفاعلات والنواتج ، وهي قد تكون :

الحفاز

67

المعاملات

« وهي عبارة عن أرقام تسبق المتفاعلات والنواتج وتُعبّر عن وزن المعادلة »

تفصل بين كل من المتفاعلات وبعضها البعض والنواتج وبعضها البعض

سهم يفصل بين المتفاعلات والنواتج

في التفاعلات التي تسير في اتجاه واحد

سهم يفصل بين المتفاعلات والنواتج

في التفاعلات التي تسير

في الاتجاه العكسي والعكسي

التفاعلات الإنعكاسية

عندما يكون الناتج راسب (لا يذوب في حيز التفاعل)

عندما يكون الناتج غاز او بخار او متطاير

تدل علي أن المادة مخففة

تدل علي ان المادة مركزة


« **المعادلة الموزونة:** هي المعادلة التي يتساوي فيها عدد ذرات (أيونات) العناصر الداخلة والناجمة من التفاعل

حسب قانون فعل الكتلة ويتم وزنها بمساواة عدد الذرات في المتفاعلات مع عدد ذرات النواتج لكل عنصر .

« لماذا يتم وزن المعادلة الكيميائية ؟ وذلك تحقيقاً لقانون بقاء الكتلة

معادلة احتراق قطعة من الالومنيوم في الهواء الجوي :

المعاملات



الحالات الفيزيائية

ملاحظات مهمة

① عدد العناصر الغازية = 11 عنصر لافلزي ، وهي قد تكون عناصر :

أ نشطة : وهم (الأكسجين والفلور والكلور) .

ب أقل نشاط : وهم (الهيدروجين والنيوتروجين) .

ج خاملة : وهم (الهيليوم والنيون والآرجون والكريبتون والزينون والرادون) .

د عدد العناصر السائلة = 2 عنصر ، وهما عنصران (البروم « لافلزي » والزرنيق « فلزي »)

ه باقي عناصر الجدول الدوري عناصر صلبة .

② عند حرق المركبات العضوية بالأكسجين ، يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء أو

ماء حسب ظروف التفاعل ، من أمثلة المركبات العضوية [الميثان CH_4 - الإيثان C_2H_6 -

البروبان C_3H_8 - البيوتان C_4H_{10} / الإيثين C_2H_4 - البروبين C_3H_6 - البيوتين C_4H_8 /

الإيثاين (الأسثيلين) C_2H_2 - البروباين C_3H_4 - البيوتاين C_4H_6 / الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$ -

السكروز $C_{12}H_{22}O_{11}$ - الميثانول CH_3OH - الإيثانول C_2H_5OH - حمض الفورميك

$HCOOH$ - حمض الخليك (حمض الأسيتيك) CH_3COOH] .

حرق الجلوكوز في الهواء الجوي :



③ عند وزن المعادلة الكيميائية من الممكن استخدام كسور ك $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{2})$ وليس بالضرورة أعداد


صحيحة ؟ وذلك لأن المعاملات تمثل عد المولات وليس عدد الجزيئات .

لاحظ القراءة الصحيحة للمعادلة التالية :




« احتراق 2 مول من شريط الماغنسيوم الصلب مع 1 مول من غاز الأكسجين لتكوين 2 مول من

أكسيد الماغنسيوم الصلب »



« احتراق 1 مول من شريط الماغنسيوم الصلب مع نصف مول من غاز الأكسجين لتكوين 1 مول

من أكسيد الماغنسيوم الصلب »





لاحظ الفرق بين رموز وأيونات وجزيئات بعض العناصر والمركبات

ذرة بوتاسيوم أو جزئ بوتاسيوم أو عنصر البوتاسيوم

ذرة أكسجين

ذرتي أكسجين غير متحدتين

جزئ أكسجين " مكون من ذرتين متحدتين " أو عنصر أكسجين

أيون أكسجين سالب أو أكسيد أو أيون أكسيد

أيوني أكسجين سالب غير مُتحدين

جزئ أكسيد البوتاسيوم " مكون من اتحاد ذرتي بوتاسيوم مع ذرة أكسجين "

جزيئين أكسيد بوتاسيوم

جزئ فوق أكسيد البوتاسيوم " مكون من اتحاد ذرتي بوتاسيوم مع ذرتي أكسجين "

جزئ سوبر أكسيد البوتاسيوم " مكون من اتحاد ذرة بوتاسيوم مع ذرتي أكسجين "

حول المعادلة اللفظية إلي رمزية والعكس ثم زن كل معادلة :



١ الوينيوم + أكسجين أكسيد الألومنيوم



٢ غاز كبريتيد الهيدروجين + غاز ثاني أكسيد الكبريت ← كبريت + بخار الماء



٣ صوديوم + ماء



٤ نترات النحاس II الصلب $\xrightarrow{\Delta}$ أكسيد النحاس II + غاز ثاني أكسيد النيتروجين + غاز الأكسجين



٥ سوبر أكسيد البوتاسيوم + غاز ثاني أكسيد الكربون ← كربونات البوتاسيوم + غاز الأكسجين



٦ حمض الكبريتيك المخفف + محلول هيدروكسيد البوتاسيوم ← كبريتات البوتاسيوم + ماء



٧ محلول كلوريد الباريوم + محلول فوسفات الصوديوم ← كلوريد الصوديوم + فوسفات الباريوم




١٥

١٦ احتراق شريط من الماغنسيوم في جو من الأكسجين



١٧

١٨ ملح كربونات الماغنسيوم $\xrightarrow{\Delta}$ أكسيد الماغنسيوم + غاز ثاني أكسيد الكربون



١٩

٢٠ حديد + غاز الكلور $\xrightarrow{\Delta}$ ملح كلوريد الحديد



٢١

٢٢ حديد + حمض الهيدروبروميك




٢٣

٢٤ رصاص + حمض النيتريك لتكوين نترات الرصاص II وماء وأكسيد النيتريك



٢٥

٢٦ كبريتات ألومنيوم + هيدروكسيد صوديوم



٢٧

٢٨ ماغنسيوم + نيتروجين




٢٩

٣٠ أكسيد البوتاسيوم + ماء لتكوين هيدروكسيد البوتاسيوم



٣١

٣٢ بوتاسيوم + بروم



٣٣

٣٤ زنك + حمض الهيدروكلوريك



٣٥

٣٦ ألومنيوم + ماء



٣٧

٣٨ كبريتات الكالسيوم + كربون لتكوين كبريتيد الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون



٣٩

٤٠ ثاني أكسيد الكبريت + برمنجانات بوتاسيوم + ماء لتكوين كبريتات منجنيز وكبريتات بوتاسيوم وحمض كبريتيك



٤١

٤٢ ثاني أكسيد الكبريت + غاز الأكسجين




فضة + سيانيد الصوديوم + أكسجين + ماء لتكوين سيانيد الفضة وهيدروكسيد الصوديوم



كبريتيد النحاسيك + حمض النيتريك لتكوين نترات النحاسيك وثاني أكسيد النيتروجين والكبريت وماء



انحلال كلورات البوتاسيوم إلى كلوريد البوتاسيوم وفوق كلورات البوتاسيوم وأكسجين



محلول كلوريد الألومنيوم + محلول هيدروكسيد الصوديوم لتكوين محلول كلوريد الصوديوم مع راسب

من هيدروكسيد الألومنيوم

المعادلة الأيونية

هي المعادلة التي يكتب فيها كل أو جزء من المواد في صورة أيونية.


نظم أساليب المعادلات الأيونية في التعبير عن

العمليات الفيزيائية

عمليات تحدث للمركبات وخاصة الأيونية عن طريق تفكك جزيئاتها إلى أيونات وبالتالي يحدث تغير في الحالات الفيزيائية فقط ، ومن الأمثلة على ذلك :

1 ذوبان المركبات الأيونية في الماء : عبارة عن تفكك المركب الأيوني في الماء إلى أيونات موجبة وسالبة ؛ وهذا يطلق عليه تغير فيزيائي للمركب الأيوني ؛ حيث أنه تتغير حالته الفيزيائية فقط .

المعادلة الأيونية لذوبان ملح كلوريد الصوديوم في الماء :



2 انصهار المركبات الأيونية حرارياً : عبارة عن تفكك

المركب الأيوني بالحرارة إلى أيونات موجبة وسالبة ؛ وهذا يطلق عليه تغير فيزيائي للمركب الأيوني ؛ حيث أنه تتغير حالته الفيزيائية فقط .

المعادلة الأيونية : لإنصهار ملح كلوريد الصوديوم بالحرارة :



ذوبان ملح كلوريد الصوديوم

2 التفاعلات الكيميائية :

عبارة عن كسر الروابط بين ذرات جزيئات المتفاعلات وتكوين روابط جديدة بين جزيئات النواتج .

ب تفاعلات الترسيب :

ا تفاعلات التعادل :

مثال :-

طسوات ككتابة المعادلة الأيونية المعبرة عن تفاعلات التعادل : [ماء + ملح → قاعدة + حمض]

١ إذا كانت المعادلة لفظية يتم تحويلها إلى معادلة رمزية وبها حالاتها الفيزيائية .

٢ يتم وزن المعادلة الرمزية


٣ يتم تحويل كل الجزيئات الداخلة في التفاعل والناجمة منه على هيئة أيونات موجبة (كاتيونات) وأيونات سالبة (أيونات) ؛ عدا جزيئ الماء « حيث أن أيونات الماء هي التي أحدثت تغير في التفاعل واشتركت في تكوين ناتج الماء » .

٤ تحذف الأيونات التي لم تشارك في التفاعل من طرفي المعادلة وتُسمى بالأيونات المتفرجة وهي عبارة عن « الأنيون من الحمض مع أنيون الملح الناتج و الكاتيون من القاعدة مع كاتيون الملح الناتج »

٥ إذا كانت المعاملات أكبر من الواحد الصحيح يتم اختصارها لأبسط صورة .






٦ يتم كتابة الأيونات المتبقية « وهي كاتيون الهيدروجين من الحمض لتكوين جزيئ الماء »

« المعادلة النهائية لتفاعلات التعادل الذي يتم بين حمض قوي وقاعدة قوية »



على سبيل المثال (١) : عبر عن تفاعل التعادل التالي بالمعادلة أيونية موزونة :-

محلول حمض الكبريتيك + محلول هيدروكسيد الصوديوم محلول كبريتات الصوديوم + ماء



على سبيل المثال (٢) :

محلول حمض الهيدروكلوريك + محلول هيدروكسيد البوتاسيوم محلول كلوريد البوتاسيوم + ماء



٢ المعادلة موزونة




٥ المعاملات مختصرة




● علي سبيل المثال (٣) :

◀ محلول حمض النيتريك + محلول هيدروكسيد البوتاسيوم محلول نترات البوتاسيوم + ماء



٢ المُعادلة موزونة







٥ المُعاملات مُختصرة






● علي سبيل المثال (٤) :

◀ محلول حمض الهيدروبروميك + محلول هيدروكسيد الباريوم محلول بروميد الباريوم + ماء



● علي سبيل المثال (٥) :

◀ محلول حمض النيتريك + محلول هيدروكسيد الكالسيوم محلول نترات الكالسيوم + ماء



ب- خطوات كتابة المعادلة الأيونية المُعبرة عن تفاعلات الترسيب

[راسب + محلول ملح \rightarrow محلول ملح آخر + محلول ملح]

١ إذا كانت المعادلة لفظية يتم تحويلها إلى معادلة رمزية وبها حالاتها الفيزيائية .

٢ يتم وزن المعادلة الرمزية .

٣ يتم تحويل كل الجزيئات الداخلة في التفاعل والنتيجة منه على هيئة أيونات موجبة (كاتيونات)

وأيونات سالبة (أنيونات) ؛ على جزئ الراسب « حيث أن أيونات الراسب هي التي أحدثت تغير في التفاعل واشتركت في تكوين ناتج الراسب (مركب لا يذوب في الماء) .

٤ تُحذف الأيونات التي لم تشارك في التفاعل من طرفي المعادلة وتُسمى بالأيونات المُتفرجة .

٥ إذا كانت المُعاملات أكبر من الواحد الصحيح يتم اختصارها لأبسط صورة .

٦ يتم كتابة الأيونات المُتبقية « وهي كاتيون الفلز من الراسب مع أنيون اللافلز من الراسب لتكوين جزئ الراسب »

« المُعادلة النهائية لتفاعلات الترسيب تختلف من تفاعل لآخر نظراً لإختلاف الرواسب »



توضيح : عبر عن تفاعل التعادل التالي بالمعادلة أيونية موزونة:-

على سبيل المثال (١) :


محلول نترات الفضة + محلول كلوريد الصوديوم محلول نترات الصوديوم + راسب أبيض من كلوريد الفضة



٢ المُعادلة موزونة





٥ المُعاملات مُختصرة



على سبيل المثال (٢) :

محلول نترات الفضة + محلول كرومات البوتاسيوم محلول نترات البوتاسيوم + راسب أحمر من كرومات الفضة





٥ المُعاملات مُختصرة



● علي سبيل المثال (٣) :

محلل نترات الزئبق II + محلل كبريتيد الصوديوم محلل نترات الصوديوم + راسب أسود من كبريتيد الزئبق II





٥ المفاعلات مُختصرة



● علي سبيل المثال (٤) :

محلل كلوريد الألومنيوم + محلل هيدروكسيد الصوديوم محلل كلوريد الصوديوم + راسب أبيض جيلاتيني

من هيدروكسيد الألومنيوم





٥ المفاعلات مُختصرة



● علي سبيل المثال (٥) :

محلل كلوريد الباريوم + محلل فوسفات الصوديوم محلل كلوريد الصوديوم + راسب أبيض من فوسفات الباريوم



٥ المفاعلات مُختصرة



المعادلة الأيونية الموزنة تكون متزنة تلقائياً ؟ (علل) ؟

لأن مجموع الشحنات الموجبة تساوي مجموع الشحنات السالبة في كل من طرفي المعادلة (تحقيقاً

لقانون بقاء الشحنة) بالإضافة الي تساوي عدد ذرات العناصر الداخلة والناجمة من التفاعل (تحقيقاً

لقانون فعل الكتلة).

- ١ تفاعل محلول حمض النيتريك مع محلول هيدروكسيد الباريوم مكوناً محلول نترات الباريوم وماء .
- ٢ تفاعل محلول حمض الهيدروبروميك مع محلول هيدروكسيد البوتاسيوم مكوناً محلول يوديد البوتاسيوم وماء .
- ٣ تفاعل محلول نترات الفضة مع محلول كبريتيد الصوديوم مكوناً محلول نترات الصوديوم وراسب أسود من كبريتيد الفضة .
- ٤ تفاعل محلول كلوريد الحديدك مع محلول هيدروكسيد الصوديوم مكوناً محلول كلوريد الصوديوم وراسب بني محمر من هيدروكسيد الحديدك .




الأحماض والقواعد القوية التي تتأين في الماء

حمض الهيدروكلوريك	HCl	$\text{HCl}_{(g)} \xrightarrow{\text{water}} \text{H}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$
حمض الهيدروبروميك	HBr	$\text{HBr}_{(g)} \xrightarrow{\text{water}} \text{H}^+_{(aq)} + \text{Br}^-_{(aq)}$
حمض الهيدروبيديك	HI	$\text{HI}_{(g)} \xrightarrow{\text{water}} \text{H}^+_{(aq)} + \text{I}^-_{(aq)}$
حمض النيتريك	HNO_3	$\text{HNO}_{3(l)} \xrightarrow{\text{water}} \text{H}^+_{(aq)} + \text{NO}_3^-_{(aq)}$
حمض البيروكلوريك	HClO_4	$\text{HClO}_{4(l)} \xrightarrow{\text{water}} \text{H}^+_{(aq)} + \text{ClO}_4^-_{(aq)}$
حمض الكبريتيك	H_2SO_4	$\text{H}_2\text{SO}_{4(l)} \xrightarrow{\text{water}} 2\text{H}^+_{(aq)} + \text{SO}_4^{2-}_{(aq)}$
هيدروكسيد البوتاسيوم	KOH	$\text{KOH}_{(s)} \xrightarrow{\text{water}} \text{K}^+_{(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$
هيدروكسيد الصوديوم	NaOH	$\text{NaOH}_{(s)} \xrightarrow{\text{water}} \text{Na}^+_{(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$
هيدروكسيد الباريوم	$\text{Ba}(\text{OH})_2$	$\text{Ba}(\text{OH})_{(s)} \xrightarrow{\text{water}} \text{Ba}^{2+}_{(aq)} + 2\text{OH}^-_{(aq)}$





الأملاح التي تذوب



كل أملاح الكبريتات تذوب في

الماء عدا : كبريتات الكالسيوم

(CaSO_4) - كبريتات الفضة


(Ag_2SO_4) - كبريتات

الرصاص (PbSO_4) - كبريتات

الباريوم (BaSO_4) - كبريتات

الإسترانشيوم (SrSO_4) -

كبريتات الزئبق II (HgSO_4)



كل أملاح الكلوريد تذوب في الماء

عدا : كلوريد الرصاص II (PbCl_2)

- كلوريد الفضة (AgCl) - كلوريد

النحاس II (CuCl_2) - كلوريد

الزئبق I (Hg_2Cl_2)





الأملاح التي لا تذوب في الماء وأمثلة

كل أملاح الفوسفات لا تذوب

في الماء عدا : فوسفات

الصوديوم (Na_3PO_4) - فوسفات

البوتاسيوم (K_3PO_4) - فوسفات

الأمونيوم ($[\text{NH}_4]_3\text{PO}_4$)



كل أملاح الكربونات لا تذوب في

الماء عدا : كربونات الصوديوم

(Na_2CO_3) - كربونات

البوتاسيوم (K_2CO_3) - كربونات

الأمونيوم ($[\text{NH}_4]_2\text{CO}_3$)




كل أملاح الكبريتات لا تذوب في

الماء عدا : كبريتات الصوديوم

(Na_2SO_3) - كبريتات

البوتاسيوم (K_2SO_3) - كبريتات

الأمونيوم ($[\text{NH}_4]_2\text{SO}_3$)



تدريب 3

١ ما المعادلة الرمزية الموزونة بطريقة صحيحة والمُعبرة عن احتراق غاز الميثان في جو من الأكسجين ؟

- أ $\text{CH}_4 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 ب $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
 ج $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
 د $\text{CH}_4 + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

٢ أيا من المعادلات الآتية غير موزونة ؟

- أ $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$
 ب $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$
 ج $2\text{KClO}_3 \longrightarrow 2\text{KCl} + \text{O}_2$
 د $4\text{P}_4 + 5\text{O}_8 \longrightarrow 4\text{P}_4\text{S}_{10}$

٣ المعادلة الكيميائية المقابلة غير موزونة : $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 ما قيمة مُعامل الأكسجين بعد موازنة المعادلة ؟

- أ 7
 ب 3

- أ 12
 ب 6

٤ أيا مما يأتي يُعبر عن المعادلة الموزونة لتفاعل الألومنيوم مع الأكسجين ؟

- أ $2\text{Al}_{(s)} + 3\text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_{3(s)}$
 ب $\text{Al}_{(s)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_{3(s)}$
 ج $3\text{Al}_{(s)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{Al}_3\text{O}_{2(s)}$
 د $4\text{Al}_{(s)} + 3\text{O}_{2(g)} \longrightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_{3(s)}$

٥ أيا من المعادلات الأيونية الآتية تعبر عن التفاعل محلول ثرات الكالسيوم مع محلول كربونات الصوديوم ؟

- أ $\text{Ca}^{2+}_{(aq)} + \text{CO}_3^{2-}_{(aq)} \longrightarrow \text{CaCO}_{3(s)}$
 ب $\text{Na}^{+}_{(aq)} + \text{NO}_3^{-}_{(aq)} \longrightarrow \text{NaNO}_{3(s)}$
 ج $\text{Ca}(\text{NO}_3)_{2(aq)} + \text{Na}_2\text{CO}_{3(aq)} \longrightarrow 2\text{NaNO}_{3(s)} + \text{CaCO}_{3(s)}$
 د $\text{Ca}(\text{NO}_3)_{2(aq)} + \text{Na}_2\text{CO}_{3(aq)} \longrightarrow \text{NaNO}_{3(aq)} + \text{CaCO}_{3(s)}$

٦ أيا من الاختبارات الآتية تُمثل المعادلة الأيونية

النهائية المُعبرة عن التفاعل الحادث بين محلول حمض النيتريك وهيدروكسيد الصوديوم ؟

- أ $3\text{H}^{+}_{(aq)} + \text{Al}(\text{OH})_{3(s)} \longrightarrow \text{Al}^{3+}_{(aq)} + 3\text{H}_2\text{O}_{(l)}$
 ب $3\text{HNO}_{3(aq)} + \text{Al}(\text{OH})_{3(s)} \longrightarrow \text{Al}(\text{NO}_3)_{3(aq)} + 3\text{H}_2\text{O}_{(l)}$
 ج $\text{HNO}_{3(aq)} + 3\text{OH}^{-}_{(aq)} \longrightarrow \text{NO}_3^{-}_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$
 د $\text{H}^{+}_{(aq)} + \text{OH}^{-}_{(aq)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(l)}$

كمية المادة التي تحتوي على نفس عدد الوحدات (ذرات - جزيئات - وحدات صيغة) الموجودة بالمادة ؛ هذه الوحدة اتفق عليها النظام الدولي للقياس (SI = System International)

المادة نوعان → أيونية « تحتوي على روابط أيونية »
← تساهمية « تحتوي على روابط تساهمية »

أولاً : المول والكتلة

لاحظ جيداً

المادة التساهمية: تتكون من جزيئات ، الجزيئات تتكون من ذرات ، مثل مادة CO_2 التي تتكون

من جزيئات CO_2 والجزيء الواحد يتكون من ذرات C, O, O

الذرة: هي أصغر وحدة بنائية للمادة تشترك في التفاعلات الكيميائية

، مثل ذرة الكربون (C) .

الجزيء: هو أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد على حالة إنفراد

وتتضح فيه خواص المادة ، مثل جزيء ثاني أكسيد الكربون (CO_2) .

الذرة أو الجزيء: عبارة عن جسيمات متناهية الصغر لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وبالتالي

يُصعب التعامل معها .

لاحظ أن

يُصعب التعامل عملياً مع الذرة أو الجزيء أو وحدة الصيغة في الحساب الكيميائي . علل ؟ وذلك

لأنها جسيمات متناهية في الصغر تقدر أبعادها بوحدة النانومتر (nm) .

الكتلة الذرية والوزن الجزيئي

كتلة الذرة الواحدة من المادة مُقدرة بوحدة الكتل الذرية amu أو u

مثال: كتلة ذرة الهيدروجين (H) = 1 amu أو 1 u / كتلة ذرة الكربون (C) = 12 amu أو 12 u

/ كتلة ذرة الأكسجين (O) = 16 amu أو 16 u

الكتلة الجزيئية

مجموع الكتل الذرية للذرات المكونة للجزيء مُقدرة بوحدة الكتل الذرية amu أو u

مثال: كتلة جزيء الماء (H₂O) = [2×1 + 16] = 18 amu أو 18 u / كتلة جزيء ثاني أكسيد الكربون

(CO₂) = [12 + 2×16] = 44 amu أو 44 u

المادة الأيونية: تتكون من وحدات صيغة ، وحدات الصيغة تتكون من أيونات ، مثل مادة NaCl التي تتكون من

وحدات صيغة NaCl التي تتكون من أيونات Na⁺ و أيونات Cl⁻

وحدة الصيغة تتواجد في المركبات الأيونية فقط لتوضح النسب بين الأيونات .

تتواجد المركبات الأيونية علي هيئة بناء هندسي مُنتظم يعرف بالشبكة البلورية حيث يُحاط كل أيون بعدد من الأيونات المُخالفة له في الشحنة من جميع الجهات « أيون الكلوريد المُسالِب يُحاط من

الإتجاهات الأربعة بأيونات الصوديوم الموجبة في الوحدة الواحدة من الشبكة »

كتلة الأيون


كتلة الذرة المشحونة من وحدة الصيغة مُقدرة بوحدة الكتل الذرية amu أو u

مثال: كتلة أيون الصوديوم الموجب (Na⁺) = 23 amu أو 23 u / كتلة أيون الكلوريد السالب

(Cl⁻) = 35.5 amu أو 35.5 u

كتلة وحدة الصيغة : كتلة المركب الأيوني كله مُقدرة بوحدة الكتل الذرية amu أو u

مثال: كتلة مركب كلوريد الصوديوم (NaCl) = [23 + 35.5] = 58.5 amu أو 58.5 u



الشبكة البلورية لكلوريد الصوديوم

التعامل مع الكميات الكبيرة في القياس

المول : الكتلة الذرية أو الكتلة الجزيئية أو كتلة الأيون أو كتلة وحدة الصيغة

عند تقدير الكتلة الذرية للعنصر بوحدة الجرام g يُطلق عليها مُصطلح « الكتلة المولية الذرية » وهي تُقدر

بوحدة g/mol

الهيدروجين	الكربون	الأكسجين	النيتروجين	الصوديوم	الكبريت	الكلور	الكالسيوم
1 u	12 u	16 u	14 u	23 u	32 u	35.5 u	40 u
1 g/mol	12 g/mol	16 g/mol	14 g/mol	23 g/mol	32 g/mol	35.5 g/mol	40 g/mol

عند تقدير الكتلة الجزيئية للجزي أو للمركب الأيوني بوحدة الجرام g يُطلق عليها مُصطلح « الكتلة المولية الجزيئية » وهي تُقدر بوحدة g/mol

H ₂ O	O ₂	CO ₂	NaCl	Ca ₃ (PO ₄) ₂	CuSO ₄ ·5H ₂ O
جزيء الماء	جزيء الأكسجين	جزيء ثاني أكسيد الكربون	مركب كلوريد الصوديوم	مركب فوسفات الكالسيوم	مركب كبريتات النحاس المائية
[2×1 + 16]	[2×16]	[12 + 2×16]	[23 + 35.5]	[3×40 + (2×31 + 8×16)]	[63.5 + 32 + (4×16) + (5×18)]
= 18 u	= 32 u	= 44 u	= 58.5 u	= 310 u	= 249.5 u
18 g/mol	32 g/mol	44 g/mol	58.5 g/mol	310 g/mol	249.5 g/mol

تختلف الكتلة المولية باختلاف الحالة الفيزيائية ؛ لإختلاف التركيب الجزيئي .

الرمز	الكتلة المولية	الرمز	الكتلة المولية
$S_{(s)}$	32 g	$P_{(s)}$	31 g
$S_{8(v)}$	8 مول ذرة من الكبريت $256 \text{ g/mol} = 32 \times 8 =$	$P_{4(v)}$	4 مول ذرة من الفوسفور $124 \text{ g/mol} = 31 \times 4 =$
			

يختلف مول جزئ العنصر (X_2) عن مول ذرة العنصر (X) في الجزيئات ثنائية الذرة « حيث أن الكتلة المولية من جزئ ثنائي الذرة ضعف كتلته المولية للذرة الواحدة .

العنصر	الهيدروجين	النيتروجين	الأكسجين	الكلور	البروم	اليود	الكتلة المولية للذرة (X)
H	N	O	F	Cl	Br	I	
1 g/mol	14 g/mol	16 g/mol	19 g/mol	35.5 g/mol	80 g/mol	127 g/mol	
H_2	N_2	O_2	F_2	Cl_2	Br_2	I_2	
$2 \times 1 = 2$ g/mol	$2 \times 14 = 28$ g/mol	$2 \times 16 = 32$ g/mol	$2 \times 19 = 38$ g/mol	$2 \times 35.5 = 71$ g/mol	$2 \times 80 = 160$ g/mol	$2 \times 127 = 254$ g/mol	
الكتلة المولية للجزئ (X_2)							

ملاحظات مهمة

١) اختلاف الكتلة المولية للفوسفور الصلب عن الكتلة المولية له في الحالة البخارية ؟

وذلك لاختلاف التركيب الجزيئي للفوسفور الصلب P الذي يتكون من ذرة فوسفور واحدة عن التركيب الجزيئي لبخار الفوسفور P_4 الذي يتكون من أربع ذرات مترابطة معاً ونظراً لاختلاف التركيب الجزيئي ؛ تختلف الكتل المولية .

٢) اختلاف الكتلة المولية للكبريت الصلب عن الكتلة المولية له في الحالة البخارية ؟

وذلك لاختلاف التركيب الجزيئي للكبريت الصلب S الذي يتكون من ذرة كبريت واحدة عن التركيب الجزيئي لبخار الكبريت S_8 الذي يتكون من ثمان ذرات مترابطة معاً ونظراً لاختلاف التركيب الجزيئي ؛ تختلف الكتل المولية .

وذلك لأن جزيء الأكسجين O_2 يتكون من ذرتين والكتلة المولية له $16 \times 2 = 32 \text{ g/mol}$ ، بينما الكتلة المولية للذرة الواحدة 16 g/mol ؛ وبالتالي فإن الكتلة المولية للجزيء ضعف الكتلة المولية للذرة الواحدة .

وذلك بسبب اختلاف التركيب الجزيئي للأكسجين O_2 عن التركيب الجزيئي لجزيء الأوزون O_3 ، وإذا اختلف التركيب الجزيئي اختلفت الكتل المولية .

لحساب عدد وحدات أي صيغة يتم تحويل المركب الأيوني إلى أيونات ومن ثم حساب عدد أيونات الصيغة ؛ مثل : مركب فوسفات الكالسيوم $Ca_3(PO_4)_2 = [3Ca^{2+} + 2PO_4^{3-}]$ وبالتالي فإن مجموع الوحدات = 3 مول أيون من الكالسيوم + 2 مول أيون فوسفات والمجموع الكلي = 5 مول أيون من المركب .

احسب الكتلة المولية لكلاً من :

١) الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$ (C=12 , O=16 , H=1)


٢) كبريتات الصوديوم المائية $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ (Na=23 , S=32 , H=1 , O=16)

٣) السكروز $C_{12}H_{22}O_{11}$ (C=12 , O=16 , H=1)

٤) فوسفات الباريوم $Ba_3(PO_4)_2$ (Ba=137 , P=31 , O=16)

٥) الليمونيت $2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$ (Fe=55.8 , O=16 , H=1)

لحساب عدد مولات المادة



$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = (\text{mol}) = \frac{(g)}{(g/mol)}$$

العلاقة بين عدد المولات وكتلة المادة (علاقة طردية) : - العلاقة بين عدد المولات والكتلة المولية (علاقة ثابتة) :



أمثلة :

١) احسب عدد مولات ذرات الكربون في عينة منه كتلتها 144g [C=12]

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{144}{12} = 12 \text{ mol}$$

٢) احسب عدد مولات الماء الموجودة في عينة منه كتلتها 36 g [H=1, O=16]

صيغة الماء H_2O

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{36}{1 + 16 \times 2} = 2 \text{ mol}$$

٣) احسب كتلة 0.5mol من الماء [H=1, O=16]

كتلة المادة = عدد المولات × الكتلة المولية

$$\text{الكتلة المولية للماء } H_2O = (1 \times 2) + (16 \times 1) = 18 \text{ g/mol}$$

$$\text{كتلة الماء} = 18 \times 0.5 = 8 \text{ g}$$

٤) كم مولاً من الرصاص توجد في 41.4g منه [Pb=207]

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{41.4}{207} = 0.2 \text{ mol}$$

[C=12 , O=16]


٥ احسب عدد مولات 22g من غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂

الحل الكتلة المولية لثاني أكسيد الكربون CO₂ = (112) + (216) = 44g/mol

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{22}{44} = 0.5 \text{ mol}$$



٦ احسب كتلة الأكسجين في عينة كتلتها 32.2g من بلورات كبريتات الصوديوم المائية Na₂SO₄·10H₂O

[Na=23 , S=32 , O=16 , H=1]



$$X \text{ (كتلة الأكسجين في عينة البلورات)} = \frac{224 \times 32.2}{322} = 22.4 \text{ g}$$

٧ احسب عدد مولات بخار الماء الناتجة من احتراق 0.6mol من الفوسفين



$$X \text{ (عدد مولات بخار الماء)} = \frac{0.6 \times 3}{2} = 0.9 \text{ mol}$$

٨ احسب كتلة أكسيد الكالسيوم الناتجة من إنحلال 10g من كربونات الكالسيوم حرارياً من التفاعل الآتي :

[Ca=40 , C=12 , O=16]



$$[40 + 12 + (3 \times 16)] = 100 \text{ g/mol}$$


$$10 \text{ g}$$

$$40 + 16 = 56 \text{ g/mol}$$

$$X \text{ g}$$

$$X \text{ (كتلة أكسيد الكالسيوم)} = \frac{10 \times 56}{100} = 5.6 \text{ g}$$

٩ احسب كتلة النيتروجين الناتجة من احتراق 20g من الهيدرازين [N=14 , H=1]




$$\text{X} (\text{كتلة النيتروجين}) = \frac{20 \times 28}{32} = 5.6 \text{ g}$$

١٠ احسب كتلة الأكسجين اللازمة للتفاعل تماماً مع 27g من الألومنيوم [Al=27 , O=16]



$$\text{X} (\text{كتلة الأكسجين}) = \frac{27 \times 96}{108} = 24 \text{ g}$$

١١ احسب عدد مولات أكسيد الحديد III الناتج من تسخين 456g من كبريتات الحديد II تبعاً للتفاعل التالي:



(1.5 mol)

١٢ احسب عدد مولات النشادر الناتج من تفاعل 2.8g من النيتروجين مع وفرة من الهيدروجين [N=14 , H=1]

(0.2 mol)

١٣ احسب عدد مولات الماغنسيوم اللازمة لإنتاج 0.35 mol من نيتريد الماغنسيوم .

(1.05 mol)

١٤ احسب كتلة بخار الماء الناتج من احتراق 4g من غاز الميثان [H=1 , C=12]

(9 g)

١٥ احسب كتلة كلوريد الصوديوم الناتجة من تفاعل 2 mol من هيدروكسيد الصوديوم مع وفرة من حمض



الهيدروكلوريك .

(117 g)

ثانياً ، المول وعدد أفوجادرو

تمهيد

توصل العالم الإيطالي أميدو أفوجادرو إلي أن عدد الجسيمات (الجزيئات أو الذرات أو الأيونات أو وحدات الصيغة) الموجودة في مول واحد من المادة يساوي عدد ثابت ، أطلق عليه فيما بعد عدد أفوجادرو (N_A) تكريماً له وقد اقترح هذه التسمية العالم الفرنسي جين بيرين »
وبالتالي : يُمكن تعريف عدد أفوجادرو علي أنه : عدد الجسيمات (الجزيئات أو الذرات أو الأيونات أو وحدات الصيغة) الموجودة في مول واحد من المادة وهو يساوي مقدار ثابت قيمته 6.02×10^{23}
المول : هو كمية المادة التي تحتوي علي عدد أفوجادرو من الجسيمات (الجزيئات أو الذرات أو الأيونات أو وحدات الصيغة) .

المول الواحد من أي مادة

6.02×10^{23} carbon atoms = 12 grams



المول الواحد هو:

602,214,179,000,000,000,000,000

من الذرات أو الجزيئات أو شيء ما في الكيمياء




الماء




الحديد




الأكسجين



ملح الطعام




الذهب



الهيليوم

يمكن حساب عدد المولات بمعلومية عدد الجسيمات من خلال القانون التالي :

عدد المولات = عدد الجزيئات أو عدد الذرات أو عدد الأيونات أو عدد وحدات الصيغة أو عدد الإلكترونات أو عدد الروابط
عدد أفوجادرو



استنتاج العلاقة البينائية بين

1 عدد المولات وعدد الجسيمات .

2 عدد المولات وعدد أفوجادرو .

لاحظ أن

1 المول الواحد من ذرة الأكسجين (O) = 16g = $10^{23} \times 6.02$ ذرة .

2 المول الواحد من جزيء الأكسجين (O_2) = 32g = $10^{23} \times 6.02 \times 2$ جزيء = $10^{23} \times 6.02 \times 2$ ذرة .

3 المول الواحد من جزيء الماء (H_2O) = 18g = $10^{23} \times 6.02 \times 3$ جزيء = $10^{23} \times 6.02 \times 3$ ذرة .

4 المول الواحد من أيون الصوديوم Na^+ = 23g = $10^{23} \times 6.02$ أيون .

5 المول الواحد من وحدة صيغة كلوريد الصوديوم NaCl = 58.5g = $10^{23} \times 6.02$ وحدة

= $10^{23} \times 6.02 \times 2$ أيون .

القانون العام :

عدد المولات = $\frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}}$

عدد الجزيئات أو عدد الذرات أو عدد الأيونات أو عدد وحدات الصيغة أو عدد الإلكترونات أو عدد الروابط
عدد أفوجادرو

● أمثلة :

1 احسب عدد أيونات الصوديوم الموجودة في 0.1mol منه

الحل

عدد الأيونات = عدد المولات × عدد أفوجادرو = $10^{23} \times 6.02 \times 0.1 = 10^{23} \times 6.02$ أيون .

2 احسب عدد ذرات الكربون الموجودة في نصف مول منه

الحل

عدد الذرات = عدد المولات × عدد أفوجادرو = $10^{23} \times 6.02 \times 0.5 = 3.01 \times 10^{23}$ مول أيون .

[H=1 , O=16]

٣ احسب عدد جزيئات و 36 من الماء

الحل

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{\text{عدد أفوجادرو} \times \text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}}$$

$$\text{عدد جزيئات الماء} = \frac{\text{عدد أفوجادرو} \times \text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{6.02 \times 10^{23} \times 36}{[(2 \times 1) + 16]} = 1.204 \times 10^{24} \text{ جزيء}$$

٤ احسب عدد ذرات الكربون في و 50 من كربونات الكالسيوم [Ca=40 , C=12 , O=16]

الحل



$$\therefore X (\text{عدد ذرات الكربون}) = \frac{50 \times 6.02 \times 10^{23}}{100} = 3.01 \times 10^{23} \text{ ذرة}$$

٥ احسب عدد أيونات الصوديوم الموجودة في 0.2 mol من كبريتات الصوديوم

الحل




$$\therefore X (\text{عدد أيونات الصوديوم}) = \frac{0.2 \times 2 \times 6.02 \times 10^{23}}{1} = 2.408 \times 10^{23} \text{ أيون}$$

٦ احسب عدد أيونات الصوديوم الناتجة من ذوبان و 10.6 من كربونات الصوديوم في الماء

[Na=23 , C=12 , O=16]

الحل



$$\therefore X (\text{عدد أيونات الصوديوم}) = \frac{10.6 \times 2 \times 6.02 \times 10^{23}}{106} = 1.204 \times 10^{23} \text{ أيون}$$

٧) يتفاعل مسحوق الخارصين Zn مع بخار الكبريت S₈ مكوناً كبريتيد الخارصين ، اكتب المعادلة موزونة ثم احسب كتلة كبريتيد الخارصين الناتجة من تفاعل 32g من البخار مع وفرة من المسحوق . [S=32 , Zn=65]

(97 g)

٨) احسب كتلة الجزيء الواحد من غاز الكلور مُقدرة بوحدات : [Cl=35.5]

g

٩) احسب كتلة أكسيد الألومنيوم الناتجة من تفاعل 1.42 × 10²⁴ ذرة من الألومنيوم مع وفرة أكسيد الحديد III ، تبعاً للتفاعل التالي : [Fe=56 , Al=27 , O=16]



ثم احسب عدد وحدات الصيغة في Fe₂O₃ اللازمة للتفاعل مع 0.134g من الألومنيوم .

[(وحدة صيغة 10²¹ × 1.5) / (120.3 g)]

١٠) احسب عدد جزيئات الأكسجين اللازمة لتكوين 72g من بخار الماء عند التفاعل مع وفرة من غاز الهيدروجين [H=1 , O=16]

(1.204 × 10²⁴ molecule)

١١) احسب عدد مولات الأكسجين الناتجة من انحلال 1mol من كلورات البوتاسيوم ثم احسب كتلة كلورات البوتاسيوم التي تنتج عدد أفوجادرو من ذرات الأكسجين ، تبعاً للتفاعل التالي :



[(1.5 mol) / (81.667 g)]

١٢) احسب عدد جزيئات أكسيد الليثيوم الناتجة من التحلل الحراري لـ 37g من كربونات الليثيوم

[Li=7 , C=12 , O=16]


(3.01 × 10²³ molecule)

١٣) احسب عدد المولات الكلية من الأيونات الناتجة من ذوبان 52.2g من كبريتات البوتاسيوم في الماء

(0.9mol)

٩٤ احسب عدد جزيئات الماء الناتجة من تفاعل 26.5g من كربونات الصوديوم مع وفرة من حمض

الهيدروكلوريك تبعاً للتفاعل التالي : [Na=23 , C=12 , O=16]



(1.505 molecule)

٩٥ احسب طول الخط الناتج (بوحدة المتر) من رص ذرات الكربون الموجودة في 0.12g منه « إذا علمت أن

قطر ذرة الكربون على مقياس النانويساوي 0.7nm » [C=12]

(4.214 × 10¹² m)



ثالثاً : المول وحجم الغاز

١) المواد الصلبة أو السائلة ذات حجم ثابت ومحدد ، ويمكن قياسه بطرق متعددة ..

ولكن حجم الغاز كيف يمكن قياسه ؟! « حيث أنه يساوي حجم الحيز أو حجم الإناء الذي يشغله »

لذلك قام العالم الإيطالي أفوجادرو بوضع فرضاً يوضح (العلاقة بين حجومات الغازات وعدد جزيئات الغازات) في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة (at STP).

فرض أفوجادرو : « الحجومات المتساوية من الغازات المختلفة كـ (N_2, O_2, H_2, Cl_2) في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة تحتوي على أعداد متساوية من الجزيئات »



الظروف القياسية (Standard Temperature Pressure) : وهي الضغط الجوي المعتاد = 1atm = 760mmHg / درجة الحرارة = 273K = 0°C


تحت نفس الظروف القياسية (at STP) : يشغل المول الواحد من أي غاز حجماً قدره 22.4L ، وبالتالي فإن هذا الحجم الثابت لكل الغازات يحتوي على 6.02×10^{23} جزيء.




للتعبير عن عدد مولات الغاز بمعلومية حجمه :

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{حجم الغاز}}{22.4}$$


أثر عدد المولات على حجم الغاز والعكس، مع ثبوت الضغط (1atm) :



◀ وقد توصل العالم أميدو أفوجادرو إلى العلاقة بين حجم الغاز وعدد مولاته ، فيما يُعرف بإسم قانون أفوجادرو والذي ينص علي أن حجم الغاز يتناسب طرديا مع عدد مولاته عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة .



◀ وبالتالي فإن العلاقة بين حجم الغاز وعدد مولاته (علاقة طردية) :



◀ الجدول التالي يوضح العلاقة بين عدد مولات الغاز وحجمه وعدد جزيئاته وذراته وكتلته والضغط الثابت ودرجة الحرارة القياسية ، لعدة غازات مختلفة :

الغاز	كتلة المادة	الكتلة المولية	عدد المولات (n)	حجم الغاز	عدد الجزيئات
He	4 g	4 g/mol	1 mol	22.4 L/mol	6.02×10^{23} molecule
H ₂	16 g	16 g/mol	1 mol	22.4 L/mol	6.02×10^{23} molecule
O ₂	32 g	32 g/mol	1 mol	22.4 L/mol	6.02×10^{23} molecule
CH ₄	17 g	17 g/mol	1 mol	22.4 L/mol	6.02×10^{23} molecule

$$4 \times 6.02 \times 10^{23} \text{ atom} \quad 2 \times 6.02 \times 10^{23} \text{ atom} \quad 5 \times 6.02 \times 10^{23} \text{ atom} \quad 6.02 \times 10^{23} \text{ atom}$$



$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} \quad 1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} \quad 1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} \quad 1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$

$$0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}$$

$$0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}$$

$$0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}$$

$$0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}$$



ماذا يحدث عند زيادة كثافة الغاز للضعف ، بالنسبة لعدد مولاته ؟

« علماً بأن كثافة الغاز (g/L) =

$$\frac{\text{الكتلة المولية (g/mol)}}{\text{الكتلة المولية (L/mol)}}$$

أياً من البالونات الثلاثة المقابلة ذات كتلة أكبر ؟

Oxygen O₂
1 mole

Nitrogen N₂
1 mole

Nitrous oxide
NO
1 mole

الحجم المولي : هو الحجم الذي يشغله مول واحد من الغاز تحت الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة .

He O₂ CO

الحجم المولي

at STP:

$$1 \text{ mol He} = 22.4 \text{ L}$$

$$1 \text{ mol O}_2 = 22.4 \text{ L}$$


$$1 \text{ mol CO} = 22.4 \text{ L}$$



تطبيق علي نسب الغازات

① تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز الأكسجين لتكوين بخار الماء في STP : « يتحد 1 mol من H_2 مع

$\frac{1}{2}$ mol من O_2 لتكوين 1 mol من H_2O »



2g	+	16g	→	18g	- كتلة الغاز :
2g/mol	+	32g/mol	→	18g/mol	- الكتلة المولية :
1 mol	+	$\frac{1}{2}$ mol	→	1mol	- عدد المولات :
22.4L	+	22.4L	→	22.4L	- حجم الغاز :
$10^{23} \times 6.02$	+	$10^{23} \times 3.01$	→	$10^{23} \times 6.02$	- عدد الجزيئات :
$2 \times 6.02 \times 10^{23}$	+	$10^{23} \times 26.02$	→	$3 \times 6.02 \times 10^{23}$	- عدد الذرات :
1	:	$\frac{1}{2}$:	1	- النسبة بين حجوم الغازات :

ما النتائج المترتبة علي : تضاعف عدد مولات الغاز في الظروف القياسية ؟

العلاقة بين عدد الذرات (عدد الجزيئات - عدد الأيونات - عددالوحدات - عدد الإلكترونات - عدد الروابط) والمول والكتلة والحجم :

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{\text{حجم الغاز}}{22.4}$$

عدد الجزيئات او عدد الذرات او عدد وحدات الصيغة او عدد الأيونات او عدد الإلكترونات او عدد الروابط
عدد أفوجادرو ($10^{23} \times 6.02$)

ملخص تعريفات المول :

هو الكتلة الذرية أو الكتلة الجزيئية أو كتلة وحدة الصيغة من المادة مُعبّرًا عنها بالجرامات

هو كمية المادة التي تحتوي علي عدد أفوجادرو من الجسيمات (جزيئات أو ذرات أو أيونات وحدات الصيغة)

هو كتلة 22.4L (22.4 dm³) من الغاز في الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة (STP)

و الكتلة

عدد أفوجادرو

حجم الغاز

التحويلات :

÷ الكتلة المولية

عدد المولات

× عدد أفوجادرو

÷ عدد أفوجادرو

عدد الجسيمات

عدد أفوجادرو
الكتلة المولية
الكتلة المولية
عدد أفوجادرو

عدد الجسيمات

الكتلة المولية
22.4

22.4
الكتلة المولية

كتلة المادة

× الكتلة المولية



أمثلة

١ احسب حجم 11g من غاز CO_2 في STP [C=12 , O=16]

الحل

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{\text{حجم الغاز}}{22.4}$$

$$5.6\text{L} = \frac{11 \times 22.4}{[12 + (2 \times 16)]} = \frac{22.4 \times \text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = (\text{CO}_2) \text{ أكسيد الكربون}$$

٢ احسب حجم غاز الميثان الذي يشغله 1.6g منه في الظروف القياسية [H=1 , C=12]

الحل

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{\text{حجم الغاز}}{22.4}$$

$$2.24\text{L} = \frac{1.6 \times 22.4}{[12 + (4 \times 1)]} = \frac{22.4 \times \text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = (\text{CH}_4) \text{ غاز الميثان}$$

٣ احسب كتلة 44.8L من غاز النشادر في STP [N=14 , H=1]

الحل

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{\text{حجم الغاز}}{22.4}$$

$$34\text{g} = \frac{[14 + (3 \times 1)] \times 44.8}{22.4} = \frac{\text{حجم الغاز} \times \text{الكتلة المولية}}{22.4} = (\text{NH}_3) \text{ غاز النشادر}$$

٤ احسب كتلة عينة من غاز أكسيد النيتروز N_2O تشغل حجماً قدره 550 mL في STP [N=14 , O=16]



الحل

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{\text{حجم الغاز}}{22.4}$$


$$1.1\text{g} = \frac{[16 + (14 \times 2)] \times 550 \times 10^{-3}}{22.4} = \frac{\text{حجم الغاز} \times \text{الكتلة المولية}}{22.4} = (\text{N}_2\text{O}) \text{ غاز النيتروز}$$

٥ احسب حجم غاز الأكسجين اللازم لإنتاج 90g من الماء عند تفاعله مع وفرة من غاز الهيدروجين في

الظروف القياسية ، بناءً على التفاعل التالي : [H=1 , O=16]



X L




90g


$$56 \text{ L} = \frac{90 \times 22.4}{36} = (\text{حجم غاز الأكسجين})$$

٦ احسب حجم غاز الأكسجين في STP اللازم لإنتاج 3.01×10^{23} جزء من غاز ثاني أكسيد الكربون ، بناءً

على التفاعل التالي : $\text{CH}_{4(g)} + 2\text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CO}_{2(g)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(v)}$




X L



3.01×10^{23} molecule

$$22.4 \text{ L} = \frac{3.01 \times 10^{23} \times 2 \times 22.4}{6.02 \times 10^{23}} = (\text{حجم غاز الأكسجين})$$

٧ احسب كتلة كربونات الكالسيوم اللازمة لإنتاج 5.1L من غاز CO_2 في STP بناءً على التفاعل التالي :



(22.8 g)


٨ احسب الكتلة المولية لأحد أكاسيد النيتروجين ، علماً بأن حجم 19g منه 5.6L في STP ، ثم استنتج

الصيغة الجزيئية لهذا الأكسيد ، علماً بأن الجزء منه يحتوي على ذرتين نيتروجين . [N=14 , O=16]



٩ من تفاعل الصوديوم مع الماء ، احسب حجم غاز الهيدروجين المتصاعد من تفاعل 11.5g من الصوديوم

مع كمية وفيرة من الماء في الظروف القياسية ، ثم احسب عدد أيونات الصوديوم الناتج من هذا التفاعل؟



$$[(5.6 \text{ L}) / (3.01 \times 10^{23} \text{ ion})]$$


١٠ ما حجم غاز الهيدروجين الناتج من تفاعل 12.04×10^{23} ذرة من الخارصين مع وفرة من حمض الهيدروكلوريك؟

(ضعف الحجم المولي - نصف الحجم المولي - يساوي الحجم المولي - ثلث الحجم المولي)

١١ أيًا من الغازات الآتية كثافته 1.25g/L ؟



١٢ نتج عن التحلل الحراري لمبيد كتلتها 21.3g من كلورات الصوديوم ، ملح كلوريد الصوديوم وغاز الأكسجين



أكتب المعادلة موزونة .

احسب كتلة الغاز الناتجة .

احسب حجم الغاز الناتج في STP

احسب عدد جزيئات الغاز الناتج



١٣ احسب حجم غاز الأكسجين في الظروف القياسية _ بعد وزن المعادلة _ عند إستهلاك 14.2g من مركب

سوبر أكسيد البوتاسيوم KO_2 تبعاً للتفاعل التالي :



١٤ إذا كان حجم غاز الأكسجين اللازم لتكوين الماء يساوي 56 L في الظروف القياسية ، فإن عدد مولات

البخار =



١٥ أيًا من الأمثلة الآتية يُعتبر تطبيقاً لقانون أفوجادرو

١ احتواء 4 بالونات علي أعداد متساوية من جزيئات O_2 , H_2 , N_2 , Cl_2 يجعل أحجامها متساوية عندما

تكون في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة .

٢ يقل حجم مكبس به غاز الأرجون بزيادة الضغط الواقع عليه عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة

٣ كلما قل عدد مولات غاز النيون في البالون قل حجمه عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة .

٤ البالون المحتوي علي غاز N_2 يزداد حجمه برفع درجة الحرارة مع ثبوت الضغط .

» ملحوظة مهمة : للتحويل من الجرام (g) إلي وحدة كتلة ذرية (amu) نضرب في N_A والعكس صحيح »

4 المادة المحددة للتفاعل

لكي نحصل علي كميات مُحددة من النواتج يلزم إستخدام كميات محسوبة بدقة من المُتفاعلات ؛ ولكن ماذا يحدث إذا زادت كمية المُتفاعلات عن المقدار اللازم للتفاعل ؟! .. تظل الكمية الزائدة كما هي في حيز التفاعل دون أن تتفاعل أو تشترك في التفاعل وتُعرف هذه الكمية بالمادة الزائدة ، أما المادة التي تُستهلك تماماً أثناء التفاعل الكيميائي تُعرف بالمادة المُحددة للتفاعل .

المادة المُحددة للتفاعل

هي المادة التي تُستهلك تماماً أثناء التفاعل الكيميائي أو هي المادة التي ينتج عن تفاعلها مع باقي المُتفاعلات العدد الاقل من مولات المواد الناتجة .

المادة الزائدة في التفاعل الكيميائي


هي المادة التي تزيد كميتها عن المقدار اللازم للتفاعل الكيميائي أو هي المادة التي ينتج عن تفاعلها مع باقي المُتفاعلات العدد الأكبر من مولات المواد الناتجة .




١ في الصورة المُقابلة : « نلاحظ أن عدد الكراسي = 4 ، بينما عدد الأشخاص = 5 ؛ وبالتالي فإن عدد الأشخاص أكثر من عدد الكراسي بشخص واحد ، إذن العامل المُحدد (الكراسي) والعامل الزائد (الأشخاص) »



٢ في الصورة المُقابلة : « نلاحظ أن عدد السيارات = 8 ، بينما عدد الإطارات = 48 ، وبما أن السيارة الواحدة تحتاج إلي 4 إطارات ، فإن الـ 8 سيارات تحتاج فقط إلي 32 إطار ، وبالتالي يبقى 16 إطار ؛ إذن العامل المُحدد هو (السيارات) والعامل الزائد هو (الإطارات) » ١٦ إطار زائد +




٣ في التفاعل المُقابل « نلاحظ أن عدد مولات غاز الهيدروجين المُتفاعلة يساوي 6mol وعدد مولات غاز الكلور المُتفاعلة يساوي 4mol ، ولكي يحدث تفاعل ويتكون غاز كلوريد الهيدروجين ؛ يحتاج كل مول من غاز الكلور إلي مول من غاز الهيدروجين ، إذن الـ 4mol من الكلور يحتاجوا 4mol من الهيدروجين ، لكي يتكون 8mol من غاز كلوريد الهيدروجين ويتبقى 2mol من غاز الهيدروجين دون تفاعل ، ولذا فإن العامل المُحدد هو (غاز الكلور) والعامل الزائد هو (غاز الهيدروجين) »





أمثلة



١) يتفاعل الماغنسيوم مع الأكسجين تبعاً للتفاعل التالي :



- عند استخدام 32g من الأكسجين مع 12g من الماغنسيوم ، ما العامل المُحدد لهذا التفاعل ؟ [Mg=24 , O=16]



- نحسب كتلة الناتج بمعلومية كتل المتفاعلات والمادة التي تُعطي الكتلة الأقل هي العامل المُحدد :





∴ المادة التي تُعطي الكتلة الأقل هي العامل المُحدد للتفاعل . . . الماغنسيوم هي العامل المُحدد للتفاعل .



- نحسب عدد مولات الناتج بمعلومية عدد مولات المتفاعلات والمادة التي تُعطي عدد المولات الأقل

هي العامل المُحدد :





$\therefore X = (\text{عدد مولات أكسيد الماغنسيوم بمعلومية عدد مولات الأكسجين}) = \frac{1 \times 2}{1} = 2 \text{ mol}$

\therefore المادة التي تُعطي عدد المولات الأقل هي العامل المُحدد للتفاعل .

\therefore الماغنسيوم هي العامل المُحدد للتفاعل .


٢) يتفاعل الماغنسيوم مع حمض الهيدروكلوريك تبعاً للتفاعل التالي :




- عند استخدام 2.4g من الماغنسيوم مع 3.65g من الحمض ، ما العامل المُحدد لهذا التفاعل ؟ وما كتلة المادة المُتبقية بدون تفاعل ؟ [Mg=24 , H=1 , Cl=35.5]

المحل

1 - أولاً : حساب العامل المُحدد :



$\therefore X = (\text{كتلة كلوريد الماغنسيوم بمعلومية كتلة الماغنسيوم}) = \frac{2.4 \times 95}{24} = 9.5 \text{ g}$




$\therefore Y = (\text{كتلة كلوريد الماغنسيوم بمعلومية كتلة الحمض}) = \frac{3.65 \times 95}{73} = 4.75 \text{ g}$


\therefore المادة التي تُعطي الكتلة الأقل هي العامل المُحدد للتفاعل .

\therefore حمض الهيدروكلوريك هي العامل المُحدد للتفاعل .

2- ثانياً : حساب كتلة المادة المتبقية بدون تفاعل :



٣) يتفاعل النيتروجين مع الهيدروجين تبعاً للتفاعل التالي :




- عند استخدام 30L من النيتروجين مع 30L من الهيدروجين ،


- 1- احسب العامل المحدد
- 2- احسب حجم غاز النشادر المتكون .
- 3- احسب الحجم المتبقي بدون تفاعل .

الحل

1- حساب العامل المحدد :



∴ X (حجم النشادر بمعلومية حجم النيتروجين) = $\frac{44.8 \times 30}{22.4} = 60 \text{ L}$




∴ Y (حجم النشادر بمعلومية حجم الهيدروجين) = $\frac{44.8 \times 30}{67.2} = 20 \text{ L}$

∴ المادة التي تُعطي الحجم الأقل هي العامل المحدد للتفاعل .

∴ غاز الهيدروجين هي العامل المحدد للتفاعل .

2 - حساب حجم غاز النشادر المتكون : الحجم المتكون من العامل المُحدد للتفاعل هو حجم النشادر المتكون

والذي يساوي 20L



$$10L = \frac{30 \times 22.4}{67.2} = (\text{حجم النيتروجين المُتفاعل})$$

∴ حجم النيتروجين المُتبقى بدون تفاعل = 20L = 10 - 30




ما العامل المُحدد للتفاعل عند تفاعل 60g من الأكسجين مع 20g من الميثان ؟ [C=12 , H=1 , O=16]

(O₂)

⑥ العامل المُحدد لتفاعل تحضير النشادر من خليط يحتوي علي 0.98g من النيتروجين مع 0.9g من الهيدروجين

[N=14 , H=1]

هو ؟



⑦ ما كتلة المادة المُتبقية بدون تفاعل عند خلط 16g من غاز الأكسجين مع 8.4g من غاز الهيدروجين

[H=1 , O=16]

لتكوين بخار الماء ؟

$$[2 \text{ g} - 6.4 \text{ g} - 10 \text{ g} - 14 \text{ g}]$$


⑧ في تفاعل التعادل ما بين 4mol من حمض الكبريتيك مع 3mol من هيدروكسيد الصوديوم ؛ العامل

المُحدد هو [الحمض - القاعدة - الملح - الماء]

⑨ في تفاعل احتراق الإيثان C_2H_6 ، عند حرق منه 0.6mol مع 44.8L من غاز الأكسجين ؛ فإن الحجم

المُتبقى بدون تفاعل = [22.4 L - 0.224 L - 2.24 L - 5.6 L]

⑩ عند استخدام 5g من كل مُتفاعلات الآتية في المُعادلة الآتية ؛ فإن العامل المُحدد للتفاعل هو ؟



[KMnO₄ - Hg₂Cl₂ - HCl - H₂O]

١٠ كتلة الماء المتبقية بدون تفاعل عند إضافة 1.45 g من H_2O إلى 1.5 g من أكسيد الكالسيوم لتكوين محلول

هيدروكسيد الكالسيوم؟ [Ca=40 , H=1 , O=16]

[0.48 g – 1.3 g – 0.33 g – 0.97 g]

- استعمل بالكتل الذرية للعناصر الآتية :

H=1	O=16	C=12	Na=23	Cu=63.5	S=32	Ca=40	Cl=35.5	N=14
Mg=24	P=31	Br=80	Al=27	Si=28	Zn=65.5	K=39	Ag=108	Pb=207
Sc=45	B=10.8	F=18.9	Be=9	Li=6.9	Fe=55.8	I=127	Li=7	Ba=137
Ti=50.9	V=50.9	Cr=51.9	Mn=54.9	Ni=58.7	Co=58.9	Sr=89.8	Cd=112.4	Au=179.97

الفصل الثاني

حساب الصيغ الكيميائية

الحلقة

إعداد : د/ أحمد الحناوي

حساب النسبة المئوية

النسبة المئوية الكتلية للمركب : عبارة عن عدد الوحدات من الجزء بالنسبة لكل 100 وحدة من الكل
إذا أردنا أن نستخرج نسبة مئوية لعدد من عدد آخر نقوم بقسمة العدد المراد حساب نسبته على العدد الكلي
ثم الضرب في 100

إذا افترضنا أن طالباً بالثانوية العامة قد حصل علي 96% : ما معني ذلك ؟
يدل ذلك علي أن عدد الدرجات التي حصل عليها 96 درجة في كل 100 درجة ، حيث أن الجزء يساوي 96
والكل يساوي 100 ؛ فنسبته المئوية = $100 \times \frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \leftarrow \text{نسبة الطالب} = 100 \times \frac{96}{100} = 96\%$


كيفية حساب النسب المئوية الكتلية لمكون من مكونات المركب أو المخلوط ؟

« عن طريق معرفة الصيغة الجزيئية للمركب وبمعلومية كتلة كل ذرة من ذراته يمكن حساب النسبة المئوية الكتلية من خلال هذا القانون :

$$\text{النسبة المئوية الكتلية للعنصر} = 100 \times \frac{\text{كتلة العنصر في مول من المركب}}{\text{الكتلة المولية للمركب}}$$

إذا تم معرفة كتلة العينة ومكوناتها من خلال النتائج التجريبية التي يتم الحصول عليها عملياً ، نستخدم القانون التالي : **النسبة المئوية الكتلية للعنصر** = $100 \times \frac{\text{كتلة العنصر في العينة}}{\text{كتلة العينة}}$
إذا كان المركب مكون من عنصرين ونسبة أحد العنصرين 70% ؛ إذن نسبة الآخر 30% ؛ حيث أن مجموع النسب المئوية للعناصر المكونة لأي مركب تساوي 100%

تطبيق علي قانون النسب المئوية



احسب النسبة المئوية الكتلة لكل عنصر في سماد نترات الامونيوم
 NH_4NO_3 [N=14 , H=1 , O=16]

$$\text{نسبة عنصر النيتروجين} = 100 \times \frac{2N}{\text{NH}_4\text{NO}_3} = 100 \times \frac{2 \times 14}{14 + (4 \times 1) + 14 + (3 \times 16)} = 35\%$$

$$\text{نسبة عنصر الهيدروجين} = 100 \times \frac{4H}{\text{NH}_4\text{NO}_3} = 100 \times \frac{4 \times 1}{14 + (4 \times 1) + 14 + (3 \times 16)} = 5\%$$

$$\text{نسبة عنصر الأكسجين} = 100 \times \frac{3O}{\text{NH}_4\text{NO}_3} = 100 \times \frac{3 \times 16}{14 + (4 \times 1) + 14 + (3 \times 16)} = 60\%$$

من الممكن حساب عنصرين فقط من الثلاث عناصر المكونة للسماد ، وحساب العنصر الثالث من خلال جمع نسبة العنصرين ثم طرح الناتج من 100%

للتأكد من حساباتك ! قم بجمع النسب الثلاثة وإذا أعطي 100% ؛ إذن حساباتك صحيحة .

٢ احسب النسبة المئوية الكتلية لكل عنصر في ملح كبريتات البوتاسيوم K_2SO_4 [K=39 , S=32 , O=16]

الحل

أ نسبة عنصر البوتاسيوم = $100 \times \frac{2K}{K_2SO_4} = 100 \times \frac{2 \times 39}{(2 \times 39) + 32 + (4 \times 16)} = 44.83\%$

ب نسبة عنصر الكبريت = $100 \times \frac{S}{K_2SO_4} = 100 \times \frac{32}{(2 \times 39) + 32 + (4 \times 16)} = 18.39\%$

ج نسبة عنصر الأكسجين = $100 \times \frac{4O}{K_2SO_4} = 100 \times \frac{4 \times 16}{(2 \times 39) + 32 + (4 \times 16)} = 36.78\%$

٣ احسب النسبة المئوية الكتلية لكل عنصر في مركب الكارنالييت $(KCl.MgCl_2.6H_2O)$ ، وكذلك النسبة المئوية للماء فيه ونسبة ملح كلوريد البوتاسيوم وملح كلوريد الماغنسيوم .

[K=39 , Cl=35.5 , Mg=24 , O=16 , H=1]

الحل

$$(KCl.MgCl_2.6H_2O) = 39 + 35.5 + 24 + (2 \times 35.5) + 6(2 \times 1 + 16)$$

أ نسبة عنصر البوتاسيوم = $100 \times \frac{K}{KCl.MgCl_2.6H_2O} = 100 \times \frac{39}{277.5} = 14.05\%$

ب نسبة عنصر الماغنسيوم = $100 \times \frac{Mg}{KCl.MgCl_2.6H_2O} = 100 \times \frac{24}{277.5} = 8.6\%$

ج نسبة عنصر الكلور = $100 \times \frac{3Cl}{KCl.MgCl_2.6H_2O} = 100 \times \frac{3 \times 35.5}{277.5} = 38.44\%$

د نسبة عنصر الهيدروجين = $100 \times \frac{12H}{KCl.MgCl_2.6H_2O} = 100 \times \frac{12 \times 1}{277.5} = 4.32\%$

هـ نسبة عنصر الأكسجين = $100 \times \frac{6O}{KCl.MgCl_2.6H_2O} = 100 \times \frac{6 \times 16}{277.5} = 34.6\%$

للتأكد من حساباتك : نسبة البوتاسيوم + نسبة الماغنسيوم + نسبة الكلور + نسبة الهيدروجين + نسبة الأكسجين = $100\% = 14.05 + 8.6 + 38.43 + 4.32 + 34.6$

أ نسبة الماء = $100 \times \frac{6H_2O}{KCl.MgCl_2.6H_2O} = 100 \times \frac{6 \times 18}{277.5} = 38.92\%$

ب نسبة ملح كلوريد البوتاسيوم = $100 \times \frac{KCl}{KCl.MgCl_2.6H_2O} = 100 \times \frac{39 + 35.5}{277.5} = 26.85\%$

ج نسبة ملح كلوريد الماغنسيوم = $100 \times \frac{MgCl_2}{KCl.MgCl_2.6H_2O} = 100 \times \frac{24 + (2 \times 35.5)}{277.5} = 34.23\%$

٤ احسب كتلة الحديد الموجودة في 500Kg من خام الهيماتيت Fe_2O_3 غير النقي ، إذا علمت أن نسبة الحديد في هذا الخام تساوي 58%

النسبة المئوية الكتلية للعنصر = $\frac{\text{كتلة العنصر في العينة}}{\text{كتلة العينة}} \times 100$

كتلة العنصر في العينة (Fe) = $\frac{\text{كتلة العينة} \times \text{النسبة المئوية الكتلية للعنصر}}{100\%} = \frac{500 \times 58\%}{100\%} = 290Kg$

٥ يحتوي خام أكسيد الحديد علي 45% من أكسيد الحديد III ، احسب كتلة الحديد الناتجة من طن واحد من الخام . [Fe=56 , O=16]

حساب كتلة أكسيد الحديد III :

كتلة أكسيد الحديد III = $\frac{\text{كتلة الخام} \times \text{النسبة المئوية الكتلية للأكسيد}}{100\%} = \frac{500 \times 1\text{ ton}}{100\%} = 0.45\text{ton}$

حساب نسبة الحديد في الأكسيد Fe_2O_3 :

النسبة المئوية للحديد = $100 \times \frac{\text{كتلة الحديد في الأكسيد}}{\text{الكتلة المولية للأكسيد}} = 100 \times \frac{2Fe}{Fe_2O_3} = 100 \times \frac{2 \times 56}{(2 \times 56) + (3 \times 16)} = 70\%$

حساب كتلة الحديد في الأكسيد :

كتلة العنصر في العينة (Fe) = $\frac{\text{كتلة الأكسيد} \times \text{النسبة المئوية الكتلية للأكسيد}}{100\%} = \frac{0.45 \times 70\%}{100\%} = 0.315\text{ton}$

٦ احسب عدد مولات ذرات كل من الكربون والهيدروجين في مركب عضوي يتكون من عنصرى الهيدروجين والكربون فقط ، إذا علمت أن كتلته المولية 28g/mol والنسبة المئوية الكتلية للكربون فيه 58.7% ؛ ثم استنتج الصيغة الكيميائية لهذا المركب . [C=12 , H=1]

الحل

أ كتلة الكربون في مول من المركب = $\frac{\text{الكتلة المولية للمركب العضوي} \times \text{النسبة المئوية الكتلية للكربون}}{100\%} = \frac{28 \times 58.7\%}{100\%} = 24g$

ب عدد مولات ذرات الكربون = $\frac{\text{كتلة الكربون}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{24}{12} = 2\text{mol}$

ج نسبة الكربون = 58.7%

د نسبة الهيدروجين = 100% - 58.7% = 14.3%

هـ كتلة الهيدروجين في مول من المركب = $\frac{\text{الكتلة المولية للمركب العضوي} \times \text{النسبة المئوية الكتلية للهيدروجين}}{100\%}$

= $\frac{14.3\% \times 28}{100\%} = 4g$

و عدد مولات ذرات الهيدروجين = $\frac{\text{كتلة الهيدروجين}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{4}{1} = 4\text{mol}$

ز الصيغة الكيميائية للمركب العضوي مكونة من 2 مول ذرة كربون مع 4 مول ذرة هيدروجين = C_2H_4

٧ احسب نسبة كل من عنصر الحديد والأكسجين في أكسيد الحديد III ... [Fe=56 , O=16]

(70 % / 30 %)

٨ احسب نسبة الماء في مركب كبريتات النحاس II المائية ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)

(Cu=63.5 , S=32 , O=16 , H=1)

(36.1%)

٩ احسب نسبة أكسيد النيتريك في مركب الحلقة البنية ($\text{FeSO}_4 \cdot \text{NO}$)

[Fe=56 , S=32 , O=16 , N=14]

(16.48 %)

١٠ احسب نسبة الحديد في خام السبديريت (FeCO_3) .

[Fe=56 , C=12 , O=16]

(48.28 %)

١١ احسب كتلة الحديد الموجودة في 1000Kg خام الهيماتيت Fe_2O_3 ، إذا علمت أن نسبة الحديد فيه 65%

[Fe=56 , O=16]

(0.65 g)

١٢ يحتوي خام أكسيد الحديد علي 30% من أكسيد الحديد III ، كم طن من الخام يلزم لإنتاج طن واحد

من الحديد .

[Fe=56 , O=16]

(4.77 ton = 4770 Kg = 4770000 g)

١٣ احسب عدد مولات ذرات الكربون والهيدروجين في المركب العضوي الذي يتكون من عنصر الكربون

والهيدروجين فقط ، إذا كانت نسبة الكربون 85.71% والكتلة المولية للمركب 56g/mol ، ثم استنتج

الصيغة الكيميائية للمركب العضوي . [C=12 , H=1]

(4mol C / 8 mol H / C_4H_8)

١٤ تحتوي أحد السبائك علي 10% من كبريتيد الرصاص II (PbS) تُستخدم في إنتاج الرصاص ، فإذا كان

معدل إستهلاك أحد المصانع 200ton من السبيكة في اليوم الواحد ، ما كتلة الرصاص التي يمكن إنتاجها

في اليوم الواحد ؟

[Pb=207 , S=32]

[1.732 ton – 17.32 Kg – 17.32 ton – 1.732 Kg]

١٥ يتحد 0.025mol من الأكسجين مع 0.025mol من الخارصين لتكوين أكسيد الخارصين ، ما نسبة العنصر

الفلزي في الأكسيد ؟ [Zn=65 , O=16]


[19.7 % - 80.3 % - 70.3 % - 29.7 %]

2 حساب الصيغة الأولية

أنواع الصيغ الكيميائية:

① **الصيغة الأولية:** وهي صيغة كيميائية تُعبر عن أبسط نسبة عددية صحيحة بين ذرات أو أيونات العناصر المكونة للمركب ، مثل : CH_2O لسكر الجلوكوز .

② **الصيغة الجزيئية:** وهي صيغة كيميائية تُعبر عن نوع وعدد الذرات أو الأيونات التي يتكون منها جزيء أو وحدة صيغة المركب ، مثل : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ لسكر الجلوكوز .



③ **الصيغة البنائية:** وهي صيغة كيميائية تُعبر عن نوع وعدد الذرات أو الأيونات التي يتكون منها جزيء أو وحدة صيغة المركب وطريقة الارتباط بين الذرات أو الأيونات ، مثل : صيغة الجلوكوز الموضحة في الشكل المقابل .

من خلال معرفتك للصيغة الجزيئية يمكن معرفة الصيغة الأولية من خلال اختصار عدد الذرات والأيونات المكونة للجزيء أو وحدة الصيغة في أبسط صورة ممكنة ، مثل :

كما هو موضح بالجدول

CH	C_6H_6
CH_2	C_2H_4
CH_2	C_3H_6
CH_2	C_4H_8
CH_2	C_6H_{12}
CH_2	C_8H_{16}
CH_3	C_2H_6
C_2H_5	C_4H_{10}
CH_2O	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
CH_2O	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$
$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	$\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_2$
$\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}$	C_5H_{12}

لعلك لاحظت أن الصيغة الأولية لا تصلح للتعبير عن التركيب الحقيقي للمركب في معظم الأحيان ؛ حيث أنها لا تُعبر بالضرورة عن العدد الفعلي للذرات أو الأيونات سواء للجزيء أو لوحدة الصيغة فهي تُعبر عن أبسط صورة للمركب ؛ ولكن من الممكن اعتبارها مجرد إحصاء نسبي لعدد الذرات أو الأيونات في الجزيء أو في وحدة الصيغة .

الصيغة الجزيئية لكل من CO و NO هي نفس الصيغة الأولية لكليهما ، أي لا يوجد أبسط من الصيغة الجزيئية ؛ وذلك لأن الكتلة المولية للصيغة الأولية تساوي الكتلة المولية لكل منهما .

هناك الكثير من المركبات لها نفس الصيغة الأولية ولكن تختلف في الصيغة الجزيئية ؛ كما هو موضح بالجدول السابق .

يتفق كل من الاستيلين C_2H_2 والبنزين العطري C_6H_6 في الصيغة الأولية CH ، لكنهما يختلفان في الصيغة الجزيئية ؟

وذلك لأن أبسط صورة ممكنة للصيغة الجزيئية لكل منهما هي CH عند إختصار عدد مولات ذرات الكربون مع عدد مولات ذرات الهيدروجين وبالتالي تصبح النسبة بينهما $= 1 : 1$ ، واختلافهما في الصيغة الجزيئية نظراً لإختلاف عدد مولات تكرار الصيغة الأولية (عدد الوحدات) .

$$\text{قانون عدد الوحدات (n)} = \frac{\text{الكتلة المولية للصيغة الجزيئية}}{\text{الكتلة المولية للصيغة الأولية}} = \frac{\text{الصيغة الجزيئية}}{\text{الصيغة الأولية}}$$

كيفية حساب الصيغة الأولية للمركب

أولاً

مثال توضيحي :

احسب الصيغة الأولية لمركب عضوي يتكون من عنصري الكربون والهيدروجين فقط ، إذا علمت أن النسبة المئوية الكتلية للكربون فيه 85.72% وللهيدروجين 14.28% $[C=12, H=1]$

طريقة الحل :

يمكن اعتبار بأن النسب المئوية لكل عنصر هي الكتل الجرامية المعبّرة عنها ، حيث أن هذه العناصر تمثّل الـ $100g$ من المركب .

إذن : كتلة الكربون = نسبته = $85.72g$ ، كتلة الهيدروجين = نسبته = $14.28g$

حساب عدد مولات ذرات كل عنصر من العناصر المكونة للمركب

إذن : عدد مولات ذرات الكربون = $\frac{85.72}{12} = 7.14$ مول ، عدد مولات ذرات الهيدروجين = $\frac{14.28}{1} = 14.28$ مول

حساب النسبة بين عدد مولات ذرات كل عنصر « وذلك عن طريق القسمة على عدد مولات ذرات العنصر الأقل »

إذن : النسبة بين عنصري الكربون : الهيدروجين = $\frac{7.14}{7.14} : \frac{14.28}{7.14} = 1 : 2$

إذا كانت النسبة النهائية بين العناصر تحتوي على كسور ! لا بد من التخلص من الكسر وذلك عن طريق

الضرب في 2 وفي هذا المثال لا يوجد أي كسور .

كتابة الصيغة الأولية .

إذن : صيغة المركب العضوي المكون من مول ذرة كربون مع مول ذرتي هيدروجين هي (CH_2) .



أمثلة

١ احسب الصيغة الأولية لمركب عضوي يحتوي علي عنصري الكربون والهيدروجين فقط ؛ حيث أن نسبة

الكربون فيه 75% ونسبة الهيدروجين 25% [C=12 , H=1]

الحل

بطريقة الجدول يُمكن اختصار البيانات الموضحة في المثال السابق :

كتلة العنصر (g)	25 g	75 g
الكتلة المولية له (g/mol)	1 g/mol	12 g/mol
عدد مولاته (mol) = $\frac{\text{كتلة العنصر}}{\text{الكتلة المولية}}$	$\frac{25}{1} = 25 \text{ mol}$	$\frac{75}{12} = 6.25 \text{ mol}$
النسبة بين عدد مولات كل عنصر	$4 = \frac{25}{6.25}$	$1 = \frac{6.25}{6.25}$
الصيغة الأولية	CH_4	

٢ احسب الصيغة الأولية لمركب عضوي يحتوي علي عنصري الكربون والهيدروجين فقط ؛ حيث أن نسبة

الكربون فيه 92.3% [C=12 , H=1]

الحل

نسبة الكربون = 92.3% نسبة الهيدروجين = 100% - 92.3% = 7.7%

كتلة العنصر (g)	7.7 g	92.3 g
الكتلة المولية له (g/mol)	1 g/mol	12 g/mol
عدد مولاته (mol) = $\frac{\text{كتلة العنصر}}{\text{الكتلة المولية}}$	$\frac{7.7}{1} = 7.7 \text{ mol}$	$\frac{92.3}{12} = 7.7 \text{ mol}$
النسبة بين عدد مولات كل عنصر	$1 = \frac{7.7}{7.7}$	$1 = \frac{7.7}{7.7}$
الصيغة الأولية	CH	

٣ احسب الصيغة الأولية لحمض الأسيتيك (الخليك) ، إذا علمت أن النسب المئوية الكتلية لعناصره ، كالتالي

(الكربون 40% ، الهيدروجين 6.67% ، الأكسجين 53.33%) . [C=12 , H=1 , O=16]

الحل

كتلة العنصر (g)	53.33 g	6.67 g	40 g
الكتلة المولية له (g/mol)	16 g/mol	1 g/mol	12 g/mol
عدد مولاته (mol) = $\frac{\text{كتلة العنصر}}{\text{الكتلة المولية}}$	$\frac{53.33}{16} = 3.33 \text{ mol}$	$\frac{6.67}{1} = 6.67 \text{ mol}$	$\frac{40}{12} = 3.33 \text{ mol}$
النسبة بين عدد مولات كل عنصر	$1 = \frac{3.33}{3.33}$	$2 = \frac{6.67}{3.33}$	$1 = \frac{3.33}{3.33}$
الصيغة الأولية	CH_2O		

٤ احسب الصيغة الأولية لمركب يتكون من عنصري النيتروجين والأكسجين فقط ، حيث نسبة النيتروجين


25.9% ونسبة الأكسجين 74.1% [N=14 , O=16]

الحل

25.9 g	74.1 g	كتلة العنصر (g)
14 g/mol	16 g/mol	الكتلة المولية له (g/mol)
$\frac{25.9}{14} = 1.85 \text{ mol}$	$\frac{74.1}{16} = 4.63 \text{ mol}$	عدد مولاته (mol) = $\frac{\text{كتلة العنصر}}{\text{الكتلة المولية}}$
$1 = \frac{1.85}{1.85}$	$2.5 = \frac{4.63}{1.85}$	النسبة بين عدد مولات كل عنصر
$1 \times 2 = 2$	$2.5 \times 2 = 5$	بالضرب في 2 للحصول على نسب عددية صحيحة
N_2O_5		الصيغة الأولية

٥ استنتج صيغة أكسيد الكبريت الذي يحتوي على 40% كبريت . [S=32 , O=16]

٦ ما الصيغة الأولية للهيدروكربون الذي يحتوي على 80% كربون ؟ [C=12 , H=1]



٤ حساب الصيغة الجزيئية

لحساب الصيغة الجزيئية للمركب ، لابد من معرفة الكتلة المولية للمركب ومن خلال ذلك نحسب عدد مرات تكرار الصيغة الأولية (عدد الوحدات) (n) ، ثم يتم ضرب عدد الوحدات في الصيغة الأولية فنحصل على الصيغة الجزيئية للمركب ، لاحظ ذلك في المثال التالي :

مثال توضيحي : احسب الصيغة الأولية والجزيئية لمركب عضوي نسبة الكربون فيه 92.3% ونسبة الهيدروجين فيه 7.7% ، حيث أن الكتلة المولية الجزيئية له 78g/mol
[C=12 , H=1]

92.3 g	7.7 g	كتلة العنصر (g)
12 g/mol	1 g/mol	الكتلة المولية له (g/mol)
$\frac{92.3}{12} = 7.7 \text{ mol}$	$\frac{7.7}{1} = 7.7 \text{ mol}$	عدد مولاته (mol) = $\frac{\text{كتلة العنصر}}{\text{الكتلة المولية}}$
$1 = \frac{7.7}{7.7}$	$1 = \frac{7.7}{7.7}$	النسبة بين عدد مولات كل عنصر
		الصيغة الأولية

المل

الكتلة المولية من المركب

الكتلة المولية الصيغة الأولية

١ عدد وحدات الصيغة الأولية (n) =

٢ الكتلة المولية من الصيغة الأولية (CH) = 1 + 12 = 13g/mol ، الكتلة المولية من المركب = 78g/mol

٣ عدد الوحدات (n) = $\frac{\text{الكتلة المولية من المركب}}{\text{الكتلة المولية الصيغة الأولية}} = \frac{78}{13} = 6$ وحدة.

٤ الصيغة الجزيئية = عدد الوحدات (n) × الصيغة الأولية .

٥ الصيغة الجزيئية = CH × 6 = C₆H₆



أهـ ثلثة

١ احسب الصيغة الأولية والجزئية لحمض الأسيتك (الخليك) ، إذا علمت أن النسب المئوية الكتلية لعناصره ،

كالتالي (الكربون 40% ، الهيدروجين 6.67% ، الأكسجين 53.33%) والكتلة المولية الجزئية له 60g/mol

[C=12 , H=1 , O=16

العمل

كتلة العنصر (g)	كتلة العنصر له (g/mol)	عدد مولاته (mol)	النسبة بين عدد مولات كل عنصر	الصيغة الأولية
40 g	12 g/mol	$\frac{40}{12} = 3.33 \text{ mol}$	$1 = \frac{3.33}{3.33}$	
6.67 g	1 g/mol	$\frac{6.67}{1} = 6.67 \text{ mol}$	$2 = \frac{6.67}{3.33}$	CH_2O
53.33 g	16 g/mol	$\frac{53.33}{16} = 3.33 \text{ mol}$	$1 = \frac{3.33}{3.33}$	

∴ عدد وحدات الصيغة الأولية (n) = $\frac{\text{الكتلة المولية من المركب}}{\text{الكتلة المولية الصيغة الأولية}}$

∴ الكتلة المولية من الصيغة الأولية (CH₂O) = 16 + (2×1) + 12 = 30g/mol ، الكتلة المولية من

المركب = 60g/mol

∴ عدد الوحدات (n) = $\frac{\text{الكتلة المولية من المركب}}{\text{الكتلة المولية الصيغة الأولية}} = \frac{60}{30} = 2$ وحدة .

∴ الصيغة الجزيئية = عدد الوحدات (n) × الصيغة الأولية .

∴ الصيغة الجزيئية = CH₂O × 2 = C₂H₄O₂

٢ احسب الصيغة الأولية لمركب يتكون من عنصرى النيتروجين والأكسجين فقط ، حيث نسبة النيتروجين

[N=14 , O=16]

25.9% ونسبة الأكسجين 74.1% ، والكتلة المولية الجزئية 108g/mol

العمل

كتلة العنصر (g)	كتلة العنصر له (g/mol)	عدد مولاته (mol)	النسبة بين عدد مولات كل عنصر	الصيغة الأولية
25.9 g	14 g/mol	$\frac{25.9}{14} = 1.85 \text{ mol}$	$1 = \frac{1.85}{1.85}$	
74.1 %	16 g/mol	$\frac{74.1}{16} = 4.63 \text{ mol}$	$2.5 = \frac{4.63}{1.85}$	
			$2.5 \times 2 = 5$	N_2O_5

∴ عدد وحدات الصيغة الأولية (n) = $\frac{\text{الكتلة المولية من المركب}}{\text{الكتلة المولية الصيغة الأولية}}$

∴ الكتلة المولية من الصيغة الأولية $(N_2O_5) = (2 \times 14) + (5 \times 16) = 108 \text{ g/mol}$ ، الكتلة المولية من

المركب = 108 g/mol

∴ عدد الوحدات $(n) = \frac{\text{الكتلة المولية من المركب}}{\text{الكتلة المولية الصيغة الأولية}} = \frac{108}{108} = 1$ وحدة .

∴ الصيغة الجزيئية = عدد الوحدات $(n) \times$ الصيغة الأولية .

∴ الصيغة الجزيئية $N_2O_5 = N_2O_5 \times 1 = N_2O_5$

٣ احسب الصيغة الجزيئية لمركب كتلته المولية 70 g/mol ، إذا علمت أنه يحتوي علي كربون بنسبة

85.7% وهيدروجين بنسبة 14.3% $[C=12, H=1]$

الحل

كتلة العنصر (g)	الكتلة المولية له (g/mol)
14.3 g	1 g/mol
85.7 g	12 g/mol
$\frac{14.3}{1} = 14.3 \text{ mol}$	$\frac{85.7}{12} = 7.14 \text{ mol}$

عدد مولاته (mol) = $\frac{\text{كتلة العنصر}}{\text{الكتلة المولية}}$

النسبة بين عدد مولات كل عنصر

$$1 = \frac{7.14}{7.14} \quad 2 = \frac{14.3}{7.14}$$

CH_2

الصيغة الأولية

∴ عدد وحدات الصيغة الأولية $(n) = \frac{\text{الكتلة المولية من المركب}}{\text{الكتلة المولية الصيغة الأولية}}$

∴ الكتلة المولية من الصيغة الأولية $(CH_2) = (21) + 12 = 14 \text{ g/mol}$ ، الكتلة المولية من المركب 70 g/mol

∴ عدد الوحدات $(n) = \frac{\text{الكتلة المولية من المركب}}{\text{الكتلة المولية الصيغة الأولية}} = \frac{70}{14} = 5$ وحدة

∴ الصيغة الجزيئية = عدد الوحدات $(n) \times$ الصيغة الأولية .

∴ الصيغة الجزيئية $C_5H_{10} = CH_2 \times 5$

٤ مركب صيغته الأولية CH_2O ويحتوي 0.0833 mol منه علي 1 g من ذرات الهيدروجين ، احسب الصيغة

الجزئية للمركب ، وعدد ذرات الكربون في مول من المركب . $[C=12, H=1]$

٥ أوجد الصيغ الجزئية لكل من الفورمالدهيد وحمض الأسيتك وحمض اللاكتيك علماً بأن الكتل المولية لهم

علي الترتيب هي $30, 60, 90 \text{ g/mol}$ ، وأن جميعهم يشترك في صيغة أولية واحدة هي CH_2O

٤ حساب النسبة المئوية للناتج الفعلي

أب تفاعل كيميائي كمية المواد الناتجة منه (الناتج الفعلي) تكون دائماً أقل من الكمية المتوقعة حسابياً (الناتج النظري) ؛ والسبب في ذلك أن :

- ١ عدم نقاء المواد المتفاعلة .
- ٢ تطاير جزء من المادة الناتجة أثناء حدوث التفاعل .
- ٣ حدوث تفاعلات ثانوية تستهلك جزء من المادة الناتجة .
- ٤ التصاق جزء من المادة الناتجة بالجدار الداخلي لإناء التفاعل .

الناتج الفعلي :

كمية المادة التي يتم الحصول عليها عملياً من التفاعل الكيميائي أو كمية المادة التي يتم الحصول عليها فعلياً في المعمل من التفاعل الكيميائي .

الناتج النظري :

كمية المادة المحسوبة أو المتوقعة اعتماداً علي معادلة التفاعل أو كمية المادة المتوقعة الحصول عليها اعتاداً علي حسابات معادلة التفاعل .

قانون حساب النسبة المئوية للناتج الفعلي : النسبة المئوية للناتج الفعلي = $100 \times \frac{\text{الناتج الفعلي}}{\text{الناتج النظري}}$



أمثلة

١ يحضر الكحول الميثيلي CH_3OH تبعاً للتفاعل التالي : $\text{CO}_{(g)} + 2\text{H}_{2(g)} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{OH}_{(L)}$

احسب النسبة المئوية للناتج الفعلي للتفاعل إذا علمت أنه عند تفاعل 1.2g من غاز الهيدروجين مع وفرة من غاز أول أكسيد الكربون ينتج 6.1g من الكحول الميثيلي . [C=12 , H=1 , O=16]

الحل



$$\therefore X (\text{الناتج النظري}) = 100 \times \frac{1.2 \times 32}{4} = 9.6\text{g}$$

$$\therefore \text{النسبة المئوية للناتج الفعلي} = 100 \times \frac{\text{الناتج الفعلي}}{\text{الناتج النظري}}$$

$$\therefore \text{النسبة المئوية للناتج الفعلي} = 100 \times \frac{6.1}{9.6} = 63.54\%$$

٢ احسب النسبة المئوية للناتج الفعلي عند تفاعل 20g من محلول كلوريد الصوديوم مع وفرة من محلول نترات الفضة ، إذا علمت أنه يترسب 45g من كلوريد الفضة . [Na=23 , Cl=35.5 , Ag=108]




$\therefore X \text{ (الناتج النظري)} = \frac{143.5 \times 20}{58.5} = 49.1\text{g}$

$\therefore \text{النسبة المئوية للناتج الفعلي} = \frac{\text{الناتج الفعلي}}{\text{الناتج النظري}} \times 100$


$\therefore \text{النسبة المئوية للناتج الفعلي} = \frac{45}{49.1} \times 100 = 91.6\%$

٣ إذا علمت أن نسبة الناتج الفعلي لأكسيد النيتريك 75% وأن كتلة أكسيد النيتريك المحسوبة 12g ، احسب حجم غاز الاكسجين المتفاعل مع وفرة من غاز النشادر في الظروف القياسية ، تبعاً للتفاعل التالي :



الحل : $\therefore \text{النسبة المئوية للناتج الفعلي} = \frac{\text{الناتج الفعلي}}{\text{الناتج النظري}} \times 100$

$\therefore \text{الناتج النظري} = \frac{\text{الناتج الفعلي}}{\text{النسبة المئوية للناتج الفعلي}} \times 100$



$\therefore X \text{ (حجم غاز الأكسجين)} = \frac{16 \times 112}{120} = 14.933\text{L}$

٤ احسب النسبة المئوية للناتج الفعلي عند تفاعل 40g من محلول كلوريد الباريوم BaCl_2 مع وفرة من محلول كبريتات البوتاسيوم K_2SO_4 ، علماً بأن الكتلة الفعلية من الراسب BaSO_4 تساوي 39.4g [Ba=137 , Cl=35.5 , S=32 , O=16]

(87.93 %)



- إذا كان شريط المغنسيوم المحترق كتلته 12g ، احسب الكتلة الفعلية لأكسيد المغنسيوم الناتج، إذا

كانت النسبة المئوية للناتج الفعلي 60% [Mg=24 , O=16] (12 g)



الباب الثالث

المحاليل - الأحماض والقواعد

إعداد : د/ أحمد الحناوي

الفصل الأول

الكيمياء والقياس

محتويات الفصل

المحاليل و أنواعها

1

تركيز المحاليل


2

الخواص الجمعية

3

خواص الغرويات و المعلقات

4



المحاليل وأنواعها

تراككم معرفي :

١- مكونات الماء

- ١- الأكسجين بنسبة 88.8% وزناً .
- ٢- الهيدروجين بنسبة 11.2% وزناً .



٢- تكوين جزيء الماء

- ١- يتكون من ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين .
- ٢- ترتبط ذرة الأكسجين برابطتين تساهميتين أحاديتين بذرتي الهيدروجين .
- ٣- الزاوية بين الرابطتين تساوي 104.5°

٣- السالبية الكهربائية


قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية نحوها .



- ١- ترتبط العناصر الكيميائية مع بعضها بـ (روابط) ، ولها أنواع منها الرابطة التساهمية التي تتم بـ المشاركة (يشارك كل عنصر بالإلكترون مفرد على الأقل في تكوين الرابطة ، ثم يرتبط الإلكترونين معاً مكوناً رابطة تساهمية .

٢- السالبية الكهربائية مصطلح يعبر عن قدرة الذرة على جذب إلكترونات هذه الرابطة ، فالذرة التي تجذب الإلكترونات أكثر تسمى الذرة الأكثر سالبية .. فهي كالمغناطيس .. بينما الذرة الأخرى تكون أقل قدرة على جذب الإلكترونات فتسمى الذرة الأقل سالبية .

٣- ونتيجة إزاحة إلكترونات الرابطة نحو الذرة (الأكثر سالبية) تكون هذه الذرة قد اكتسبت إلكترونات (اكتساب جزئي) وتحمل نتيجة ذلك شحنة سالبة جزئية (δ^-) ، أما الذرة الأخرى (الأقل سالبية) التي ابتعدت عنها الإلكترونات تكون قد فقدت إلكترونات (فقد جزئي) وتحمل نتيجة ذلك شحنة موجبة جزئية (δ^+) .



4- الرابطة القطبية

رابطة تساهمية بين ذرتين مختلفتين في السالبية والذرة الأكبر سالبية شحنتها سالبة جزئية δ^- و الأقل سالبية تحمل شحنة موجبة جزئية δ^+

مثل الرابطة في فلوريد الهيدروجين HF

- فنجد أن:-

الفلور أعلى في السالبية من الهيدروجين ، لذلك تجذب إلكترونات الرابطة نحوها أكثر ، ونتيجة

لذلك يكتسب الفلور شحنة سالبة جزئية (δ^-) .

أما الهيدروجين الأقل في السالبية فيكتسب شحنة موجبة جزئية (δ^+) نتيجة إزاحة إلكترونات الرابطة عنه . و يطلق على الجزئ جزئ قطبي .

الرابطة القطبية

أعلى العناصر في السالبية هي الهالوجينات
(فلور - كلور - بروم - يود)

5- الجزيئات القطبية :-

هي الجزيئات التي يحمل إحدي طرفيها شحنة موجبة جزئية والطرف الآخر شحنة سالبة جزئية ، مثل جزئ الماء .

سؤال الماء مذيب قطبي ؟

أولاً : توجد عوامل تتوقف عليها قطبية الجزئ لأبْد من التعرف عليها أولاً ،

ومن ثَم نحكم علي الجزئ هل قطبي أم لا ؟....

< وهذه العوامل هي :

① قطبية الروابط المكونة للجزئ .


② الشكل الفراغي للجزئ .

③ الزوايا بين الروابط في الجزئ .


الماء مذيب قطبي

وذلك لسببين :

① الماء يتكون من قطبان : القطب الأول وهو الهيدروجين (الأقل سالبيه 2.2 ويحمل شحنة موجبة جزئية (δ^+) والقطب الثاني هو الأكسجين (الأعلى سالبيه 3.44 ويحمل شحنة سالبة جزئية (δ^-))





② وجود رابطتين قطبيتين بين (O - H) في كل جزئ منه وذلك لارتفاع قيمة السالبية الكهربائية للأكسجين عن الهيدروجين ، وكبر الزاوية بين هاتين الرابطتين القطبيتين التي تُقدر بـ (104.5°) .



⑥ المخاليط


اتحاد بين مادتين أو أكثر ، و فيه تحتفظ المواد المكونة له بخصائصها .
و معظم المواد التي نتعامل معها تعتبر مخاليط ، كالهواء و المشروبات الغازية و محلول ملح الطعام ... الخ



تصنيف المخاليط إلى نوعين هما

- ١ مخاليط متجانسة "وهي المحاليل"
- ٢ مخاليط غير متجانسة "وهي المعلقات والغرويات"





الشكل السابق يوضح الفرق بين العناصر والمركبات :- :: والمخاليط

١ **المادة** : قد تكون عنصر أو مركب .

٢ **العنصر** : مادة نقية بسيطة تحتوي علي نوع واحد من الذرات ، مثل : عنصر النيتروجين .

٣ **المركب** : ناتج اتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر من عنصرين بنسب ثابتة ، مثل : جزئ ثاني أكسيد الكربون .

٤ **المخلوط** : هو خلط أو مزج عنصرين أو أكثر مع بعضهما أو مركبين أو أكثر مع بعضهما ، دون حدوث أي تفاعل كيميائي بين مكونات المخلوط ؛ حيث يبقى كل عنصر أو كل مركب كما هو محافظاً علي خواصه الفيزيائية والكيميائية في معظم الحالات ، مثل : مخلوط الهواء الجوي الذي يتكون من عدة مركبات وعدة عناصر

معني التجانس

التجانس :

يُوصف المخلوط أنه مُتجانس إذا أخذنا عينتين منه فوجدنا أنهما يحتويان على نفس المواد بنفس الكميات

أولاً المخلوط

مخلوط متجانس التركيب والخواص من مادتين أو أكثر غير متحدتين كيميائياً ولا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة أو بالميكروسكوب المركب (المجهر) ، ومن أمثلته : ملح الطعام في الماء - سكر المائدة في الماء - كلوريد الكوبلت II في الماء [.

إحدى المادتين المكونين له : تسمى بالمذيب والأخرى تسمى بالمذاب.



المذاب :

هي المادة التي توجد بكمية أقل ، مثل : السكر .



المذاب

المذيب :

هي المادة التي توجد بكمية أكبر ، مثل : الماء .



المذيب

محلول السكر في الماء

تكون مخلوط متجانس التركيب في جميع أجزائه ويسمى مثل هذا المخلوط محلولاً حقيقياً ويسمى الماء بالمذيب. ويسمى السكر بالمذاب

السكر قد اختفى في الماء ولا يمكن رؤية جزيئات السكر بالعين أو بأقوى المجاهر. الماء في الكوب رائق ومتجانس.

١ نضع ملعقة صغيرة من السكر في كوب به ماء مع التقليب الجيد.
٢ نتذوق عينات مختلفة من المخلوط.




المذيب



محلول

المذاب



محلول

لاحظ

- ١ عند تحليل عينتين من محلول واحد ، سوف نجد أنهما يحتويان علي نفس المواد بنفس النسب ، وهو ما يؤكد تجانس المحلول ، فالمذاق الحلو لمحلول السكر في الماء في كل جزء من أجزائه ؛ نظراً لأنه مخلوط متجانس قوي يحتوي علي نفس المواد بنفس النسب في كل جزء من أجزائه .
- ٢ في المحاليل المائية : الماء هو المذيب حتي لو قلت نسبته عن المذاب .
- ٣ المحاليل ضرورية في العمليات الحيوية التي تحدث داخل جسم الكائن الحي فهي شرط أساسي لحدوث تفاعلات كيميائية معينة .

ثانياً المعلق



مخلوط غير متجانس حيث يمكن رؤية دقائق المذاب بالعين ويمكن فصلها بالتريسيب أو الترشيح " أي يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة أو بالميكروسكوب المركب"، مثل : [ملح الطعام في الكيروسين - سكر المادة في الكيروسين - كلوريد الكوبلت II في الكيروسين - الزيت في الماء] .

مثال معلق الرمل في الماء

التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
1. نضع كمية من مسحوق الرمل في الماء مع التقليب. 2. نترك المحلول فترة من الوقت.	1. يتعكر الماء. 2. يترسب مسحوق الرمل تدريجياً في قاع الكوب.	تكون مخلوط غير متجانس حيث يمكن رؤية دقائق الرمل بالعين كما يمكن فصلها بالترشيح.

ثالثاً الغروي



مخلوط متجانس (وسط بين المحلول الحقيقي والمعلق) لا يمكن رؤية دقائق المذاب بالعين المجردة ويمكن رؤيتها بالمجهر الإلكتروني (المركب) ولا يمكن فصلها بالترشيح ، مثل : [الأيروسولات - جل الشعر - مُستحلب المايونيز - الدم - اللبن] .
يمكن الحصول عليه بخلط مادتين مع بعضهما دون أن يتحدا كيميائياً .

(للإطلاع فقط)

مثال الكبريت الغروي في الماء

التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
إضافة حمض الهيدروكلوريك إلى المحلول المائي لثيوكبريتات الصوديوم.	يتغير لون المحلول بلون الكبريت.	تكونت دقائق الكبريت التي: 1. تظل عالقة في الماء ولا تترسب مثل الطباشير ولا تختفي مثل السكر. 2. لا يمكن تمييزها بالعين المجردة ولكن يمكن رؤيتها بالمجهر الإلكتروني. 3. يمكنها النفاذ خلال ورقة الترشيح.



يستخدم هذا التفاعل في الكشف عن أيون الثيوكبريتات ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$)

لاحظ الفرق بين
المحلول الحقيقي
والمعلق :

جسيمات قابلة
للذوبان في الماء

المحلول الحقيقي

ماء (H₂O)

خلط

محلول

جسيمات لا تذوب
في الماء

المعلق

ماء (H₂O)

خلط

معلقة غروية
(محلول معلق)

أنواع المحاليل

نمكن تصنيف المحاليل تبعاً لـ :

درجة التشتت

المصدر على
نوعين الكهربيين

الحالة المبريانية
المحاليل

محاليل
الكهربيين

محاليل
الكهربيين

محاليل
الكهربيين

محاليل
الكهربيين

محاليل
الكهربيين

محاليل فوق
المحاليل

محاليل
المحاليل

محاليل
المحاليل

محاليل
المحاليل

محاليل
المحاليل

محاليل
المحاليل

محاليل
المحاليل

محاليل
المحاليل

الحالة الفيزيائية للمذيب :

أ محاليل غازية .

ب محاليل سائلة .

ج محاليل صلبة .



أمثلة علي المحاليل الثلاثة

الهواء الجوي - الغاز الطبيعي	غاز	غاز
قطرات بخار الماء في الهواء	غاز	سائل
دقائق الغبار في الهواء	غاز	صلب
ثاني أكسيد الكربون في الماء - الأكسجين الذائب في الماء - المشروبات الغازية	سائل	غاز
الكحول في الماء - الأسيتون في الماء - الإيثيلين جليكول في الماء " محلول مضاد للتجمد في مبردات السيارات "	سائل	سائل
السكر في الماء - الملح في الماء	سائل	صلب
الهيدروجين علي البلاتين (Pt) أو علي البلاديوم (Pd)	صلب	غاز
مُملغم الفلزات		
الزئبق علي الفضة ($Ag_{(s)} / Hg_{(L)}$)	صلب	سائل
أو علي الذهب ($Au_{(s)} / Hg_{(L)}$)		
أو علي البلاتين ($Pt_{(s)} / Hg_{(L)}$)		
السبائك ، مثل : سبيكة البرونز - سبيكة النيكل كروم - سبيكة الحديد الصلب - سبيكة النحاس الأصفر	صلب	صلب

وستدرس بالتفصيل محلول من نوع صلب في سائل "كالمح في الماء"

ع) في الهواء الجوي يكون الأكسجين هو المذاب والنتروجين هو المذيب؟

ج) لان الأكسجين يوجد في الهواء بنسبه اقل والنتروجين يوجد في الهواء بنسبه اكبر

ع) المشروبات الغازية محاليل سائلة ؟

ج) لان المذيب سائل

ع) السبائك من المحاليل الصلبه ؟

ج) لان المذيب سائل


٢ قدرتها علي توصيل الكهرباء :

أُصنف حسب التوصيل الكهربائي إلى :

ب محاليل لإلكتروليتيّة .

أ محاليل إلكتروليتيّة .

١ محاليل إلكتروليتيّة



أولاً: نتعرف علي معني التيار الكهربائي « وهو عبارة عن إنتقال الشحنات الكهربائية ، وينتج في الفلزات عن طريق حركة الإلكترونات ؛ بينما ينتج في المحاليل المائية الإلكترونية عن طريق حركة الأيونات المُذابة »

الإلكتروليتيّات مواد توصل محاليلها التيار الكهربائي عن طريق حركة أيوناتها المُماهة أو مواد توصل مصاهيرها التيار الكهربائي عن طريق حركة الأيونات الحرة .

وبناء علي درجة التوصيل الكهربائي تم تصنيف الإلكترونيّات إلى قوية وضعيفة :

الإلكتروليّات القويّة (Electrolytes)

١ هي مواد تامة التأيّن في الماء .

٢ توصل التيار الكهربائي بدرجة كبيرة .

٣ تعمل علي إضاءة قوية للمصباح الكهربائي .

المواد تامة التأيّن : هي مواد تتفكك جميع جزيئاتها إلى أيونات عند ذوبانها في الماء « كـ كلوريد البوتاسيوم » .



كلوريد البوتاسيوم
محلول إلكتروليتي
قوي

أمثلة :-

أولاً المركبات الأيونية

مواد صلبة مُتأينة تماماً في الماء فإنها تتفكك إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة فإن هذه المحاليل تُصبح جيدة التوصيل الكهربائي ؛ ومنها :


١ محاليل أملاح تامة الذوبان في الماء : كلوريد البوتاسيوم (KCl) - كلوريد الصوديوم (NaCl) - كبريتات البوتاسيوم (K_2SO_4) - كبريتات الصوديوم (K_2SO_4) .

٢ محاليل قلويات تامة الذوبان في الماء : هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) - هيدروكسيد البوتاسيوم

(KOH) - هيدروكسيد الباريوم ($Ba(OH)_2$) .

الفصل الدراسي الأول

المركبات التساهمية القطبية



مركبات تتكون بين ذرات ترتبط بروابط تساهمية وعند ذوبانها في الماء فإنها تتأين إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة وتُصبح جيدة التوصيل الكهربائي؛ ومنها:

١- محاليل أحماض تامة الذوبان في الماء: حمض الكبريتيك (H_2SO_4)
- حمض النيتريك (HNO_3) - حمض الهيدروكلوريك (HCl) -

حمض الهيدروبروميك (HBr) - حمض الهيدروبيودييك (HI) - حمض البيروكلوريك ($HClO_4$) .

٢- حمض الهيدروكلوريك $HCl_{(aq)}$ الناتج من ذوبان غاز كلوريد الهيدروجين $HCl_{(g)}$ في الماء .

٣- الغاز لا يوصل التيار الكهربائي مثل $HCl_{(g)}$ ولكن عند ذوبانه في الماء يكون محلول حمض قوي تام التأين في الماء $HCl_{(aq)}$ جيد التوصيل الكهربائي .

٤- عند ذوبان غاز كلوريد الهيدروجين في الماء يتأين إلى أيونات الهيدروجين الموجبة (H^+) وأيونات الكلوريد السالبة (Cl^-) ، وترتبط أيونات الهيدروجين الموجبة (H^+) بجزيئات الماء برابطة تناسقية مكونة أيونات الهيدرونيوم (H_3O^+) « بروتونات مُتهدرة » .

٥- أيون الهيدرونيوم : البروتون المُماه وهو عبارة عن الأيون الناتج من ارتباط أيونات الهيدروجين الموجبة (البروتون الفارغ) الناتجة من تأين الأحماض مع جزيئات الماء بروابط تناسقية ويُرمز له بالرمز H_3O^+



٦- لا يوجد أيون الهيدروجين (البروتون) مُنفرداً في المحاليل المائية للأحماض ؟


٧- وذلك لأن أيون الهيدروجين الموجب الناتج من تأين الأحماض في الماء يرتبط بجزيئات الماء برابطة تناسقية مكوناً أيونات الهيدرونيوم H_3O^+

٨- الأملاح الصلبة لا توصل التيار الكهربائي لعدم احتوائها على أيونات ؛ ولكن عند ذوبانها في الماء تكون محاليل وتوصل التيار الكهربائي ، مثل : ملح الطعام ($NaCl_{(s)}$) لا يوصل التيار الكهربائي ؛ إما عند ذوبانه في الماء يكون محلول ملح الطعام ($NaCl_{(aq)}$) ويتفكك إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة فيوصل التيار الكهربائي .

٩- الغازات ، مثل : غاز الأكسجين وغاز النيتروجين وغاز كلوريد الهيدروجين لا توصل التيار الكهربائي

(at STP) ولكن عند ذوبانها في الماء توصل التيار الكهربائي

١ من خلال الشكل المقابل ، أيا من الثلاث أشكال يحتوي علي أيونات الهيدرونيوم ؟.....





(a) ١

(b) ٢

(c) ٣


٢ من خلال الشكل المقابل ، أيا من المحاليل الموضحة تمثل تفكك ملح كبريتات الصوديوم Na_2SO_4



(a) ١

(b) ٢

(c) ٣



١ هي مواد غير تامة التأين (أي ضعيفة التأين) في الماء .

٢ توصل التيار الكهربائي بدرجة ضعيفة .

٣ تعمل علي إضاءة خافتة للمصباح الكهربائي .

المواد غير تامة التأين : هي مواد تتفكك جزء صغير

من جزيئاتها إلي أيونات عند ذوبانها في الماء

« ك حمض الأسيتيك » .



أمثلة :-

المركبات الأيونية :

مواد صلبة متأينة جزئياً في الماء فإنه يتفكك جزء ضئيل من جزيئاتها إلي أيونات

موجبة وأيونات سالبة فإن هذه المحاليل تصبح ضعيفة التوصيل الكهربائي

ومنها :


١ محاليل أملاح شحيحة الذوبان في الماء : كلوريد الفضة ($AgCl$) - بروميد

الرصاص $(PbCl_2)$ - كبريتات الباريوم ($BaSO_4$) - كبريتات الكالسيوم ($CaSO_4$) .

٢ محاليل قلويات شحيحة الذوبان في الماء : هيدروكسيد الأمونيوم « الأمونيا في الماء » (NH_4OH) -

هيدروكسيد النحاس $(Cu(OH)_2)$ - هيدروكسيد الحديد $(Fe(OH)_3)$.

٥ ثانياً المركبات التساهمية القطبية



مركبات تتكون بين ذرات ترتبط بروابط تساهمية وعند ذوبانها في الماء فإنها تتأين جزئياً إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة وتُصبح ضعيفة التوصيل الكهربائي؛ ومنها:

- ١ محاليل أحماض غير تامة الذوبان في الماء: حمض الكبريتوز (H_2SO_3) - حمض النيتروز (HNO_2) - حمض الهيدروفلوريك (HF) - حمض الهيدروسيانيك (HCN) - حمض الهيدرويوديك (HI) - حمض الفوسفوريك (H_3PO_4) - حمض الكربونيك (H_2CO_3) - حمض الخليك أو الأسيتيك (CH_3COOH) - كل الأحماض العضوية ضعيفة.

٢ الماء النقي (H_2O) من المواد ضعيفة التأين.


٣ محلول هيدروكسيد الأمونيوم $\text{NH}_4\text{OH}_{(aq)}$ الناتج من ذوبان غاز النشادر (الأمونيا) $\text{NH}_3(g)$ في الماء.

٤ الغاز لا يوصل التيار الكهربائي مثل $\text{NH}_3(g)$ ولكن عند ذوبانه في الماء يكون محلول قاعدة ضعيفة غير تامة التأين في الماء $\text{NH}_4\text{OH}_{(aq)}$ ضعيف التوصيل الكهربائي.


٥ عند ذوبان غاز النشادر في الماء يتأين جزء ضئيل من الماء إلى أيونات الهيدروجين الموجبة (H^+) وأيونات الهيدروكسيد السالبة (OH^-)، وترتبط أيونات الهيدروجين الموجبة (H^+) بجزيئات النشادر برابطة تناسقية مكونة أيونات الأمونيوم (NH_4^+).

٦ أيون الأمونيوم: هو عبارة عن الأيون الناتج من ارتباط أيونات الهيدروجين الموجبة (البروتون الفارغ)


الناتجة من تأين الماء جزئياً مع جزيئات النشادر بروابط تناسقية ويُرمز له بالرمز NH_4^+



⚡ لاحظ الفرق بين تأين الحمض القوي الذي يتحول بالكامل إلى أيونات والحمض الضعيف الذي يتحول منه جزء ضئيل جداً إلى أيونات ويظل بقية الحمض جزيئات.



سؤال 1 أياً من الأشكال الثلاثة الآتية به أكبر عدد من أيونات الهيدرونيوم ؟



HX 1

HY 2

HZ 3

سؤال 2 أي المواد الآتية محلولة بوصول التيار الكهربائي بدرجة عالية ؟



2 محاليل لا إلكتروليتيّة

اللاإلكتروليتيّة : هي المواد التي لا توصل محاليلها أو مصاهيرها التيار الكهربائي لعدم

وجود أيونات حرة أو مُماهة وإنما تحتوي على جزيئات فقط ، مثل : السكر في الماء (C₆H₁₂O₆)

- الكحول الإيثيلي (C₂H₅OH) - الكحول الميثيلي (CH₃OH) - فوق أكسيد الهيدروجين

(H₂O₂) - السكروز (C₁₂H₂₂O₁₁) - غاز كلوريد الهيدروجين في البنزين - حمض الخليك في البنزين

الكحول الإيثيلي
محلول غير
الكتروليتي


الفصل بين التفكك والتأين

1 التفكك : يحدث للمركب الأيوني الذي يحتوي على روابط أيونية أو الذي يتكون من أيونات وعند ذوبانه في

الماء فإنه يتفكك إلى أيونات حرة « مثل ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء » .

2 التأين : يحدث للمركب التساهمي الذي يحتوي على روابط تساهمية قطبية أو الذي يتكون من جزيئات


وعند ذوبانه في الماء فإنه يتأين إلى أيونات مُماه « مثل ذوبان غاز كلوريد الهيدروجين في الماء » .



الفرق بين التأين التام والتأين الغير تام (المصباح)

أ) التأين التام : عملية تحول كل الجزيئات الغير مُتأينة إلى أيونات ويحدث في الإلكتروليتات القوية ، مثل : ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء أو ذوبان غاز كلوريد الهيدروجين في الماء « فالإلكتروليتات القوية تتحول بالكامل في الماء إلى أيونات ونسبة التأين تكون عالية جداً : 100% »

ب) التأين الغير تام : عملية تحول جزء ضئيل من الجزيئات غير المُتأينة إلى أيونات ويظل الجزء الباقي في صورة جزيئات ويحدث في الإلكتروليتات الضعيفة ، مثل : ذوبان حمض الخليك في الماء أو الأحماض العضوية « فالإلكتروليتات الضعيفة يتحول جزء ضئيل جداً منها إلى أيونات ويظل الجزء الأكبر في صورة جزيئات ونسبة التأين تكون محدودة جداً تكون 1% أيونات والباقي 99% جزيئات »



◀ لاحظ الفرق بين الأشكال الثلاثة الآتية :

① حمض الخليك CH_3COOH مُتأين جزئياً ، حيث محلوله يحتوي بالكامل على جزيئات CH_3COOH وجزء ضئيل جداً منه أيونات $(\text{CH}_3\text{COO}^- , \text{H}_3\text{O}^+)$ ، والقلة القليلة من الأيونات تُضيء المصباح إضاءة خافتة .

② ملح كلوريد الصوديوم NaCl مُتأين كلياً (أو مُتفكك) ، حيث محلوله

يحتوي بالكامل على أيونات $(\text{Na}^+ , \text{Cl}^-)$ ، وبالتالي يُضيء المصباح إضاءة قوية

③ الكحول الميثيلي CH_3OH غير مُتأين تماماً ، حيث محلوله يحتوي بالكامل على جزيئات فقط وبالتالي لا يُضيء المصباح لعدم وجود أيونات .

سؤال مهم


قارن بين (كيف تفرق بين) غاز كلوريد الهيدروجين وحمض الهيدروكلوريك ؟

④ غاز كلوريد الهيدروجين لا يوصل تيار كهربى لان جميع الغازات لا توصل التيار الكهربى في الظروف العاديه بينما حمض الهيدروكلوريك موصل جيد للتيار الكهربى.

ع ١ حمض الهيدروكلوريك الكتروليت قوي ؟ ﻻ ﻻنه تام التأيين في الماء.

ع ٢ محلول ملح الطعام في الماء محلول الكتروليتي ؟ ﻻ ﻻنه يحتوي على ايونات وجيد التوصيل للكهرباء

ع ٣ محلول السكر في الماء من اللاالكتروليتات ؟ ﻻ ﻻنه مادة غير متأينه لا توصل التيار الكهربائي.



س ١ وضح من خلال الشكل التالي ، أيًا منهم يمثل :

١ حمض قوي ؟

AY ب

AX ا

AY ب

AX ا

٣ كحول ؟

AY ب

AX ا

س ٢ أي العبارات الآتية توضح ماذا يحدث لكوريد الهيدروجين في البنزين ؟

ب يذوب ولا يتأين .

ا يذوب ويتأين .

د لا يذوب ولا يتأين .

ج لا يذوب ويتأين .

س ٣ أي من المحاليل الآتية جيدة التوصيل الكهربائي ؟

ا محلول كلوريد الماغنسيوم في الماء .

ب محلول الجلوكوز في الماء .

ج محلول السكر في الكحول الإيثيلي .

د محلول اليود في الكحول الإيثيلي .

س ٤ أيًا من المواد الآتية لا تحتوي على جزيئات غير متأينه في محاليلها المائية ؟

ب حمض الكبريتيك .

ا الكحول الإيثيلي .

د الميثانول .

ج الجلوكوز .

س ٥ عند ذوبان غاز كلوريد الهيدروجين في الماء فإن أيون الهيدروجين H^+ ؟

ا ينفصل ويبقى في صورته الغازية .

ب ينفصل ويتحد بجزيء الماء .

ج ينفصل ويتصاعد في صورة غاز .

د لا ينفصل مطلقاً



٣ المحاليل تبعاً لدرجة التشبع

تُصنف المحاليل تبعاً لدرجة تشبعها إلى :




١ محلول غير المشبع

وهو المحلول الذي يتقبل إضافة كمية أخرى من المذاب عند درجة حرارة معينة.



٢ المحلول المشبع


وهو المحلول الذي يحتوي على أقصى كمية من المذاب عند درجة حرارة معينة.



٣ المحلول فوق المشبع

وهو المحلول الذي يتقبل بالتسخين المزيد من المذاب بعد وصوله إلى حالة التشبع.

لاحظ تحول المحلول الغير مشبع للفوق مشبع :



إضافة المزيد
من المذاب

راسب

١ المحلول الغير مُشبع إلي محلول مُشبع : عن طريق إضافة المزيد من المُذاب مع التقليب
٢ المحلول المُشبع إلي محلول فوق مُشبع : عن طريق تسخين المحلول المُشبع وإضافة المزيد من المُذاب مع التقليب .

٣ المحلول فوق المُشبع إلي محلول مُشبع : عن طريقين :-

أ طريقة التبريد : وذلك بإنخفاض درجة حرارة المحلول فوق المُشبع فتتفصل (تترسب) جزيئات المُذاب الزائدة عن حالة التشبع .

ب طريقة التبلر : وذلك بوضع بللورة صغيرة من المُذاب في المحلول فوق المُشبع فتتجمع جزيئات المُذاب الزائدة حولها علي هيئة بللورات ، كما هو موضح بالصور .



يمكن تحويل المحلول الغير مُشبع إلي محلول فوق مُشبع : عن طريق إضافة المزيد من المُذاب مع التسخين مباشرة .

يمكن تحويل المحلول المُشبع لأي غير مُشبع : عن طريق إضافة المزيد من المُذيب (الماء مثلا) .

خلاصة العلاقات بين المحاليل الثلاثة





تدريب محلّول

كيف يمكنك تحويل :-

١- المحلول الغير مشبع الى محلول مشبع .

ج باضافة كمية من المذاب الى المذيب.

٢- المحلول المشبع الى محلول فوق مشبع .

ج بتسخين المحلول المشبع واطافة المزيد من المذاب

٣- المحلول الفوق مشبع الى محلول مشبع .

ج بطريقتين هما :

١- التبريد :- وذلك بخفض درجة حرارة المحلول الفوق مشبع فتتفصل (تترسب) جزيئات المذاب

الزائدة عن حالة التشبع .


٢- التبلر :- وذلك بوضع بلورة صغيرة من المذاب في المحلول فوق المشبع فتتجمع جزيئات المذاب

الزائدة حولها على هيئة بلورات .

٤- يمكن اضافة كميه من المذاب للمحلول المشبع بعد فتره من التسخين ؟

ج لان التسخين يعمل على زيادة المسافات البينية للمذيب فيدخل فيها المزيد من المذاب .

عملية الإذابة



يبدو أن الماء ساكناً علي المستوي المرئي ! ولكن ليس ساكناً علي المستوي الغير مرئي بل إن جزيئاته في حالة حركة مُستمرة وخاصة جزيئات السطح ! نظراً لطاقة حركة كل جزئ من جزيئات الماء .

عند إضافة مذاب إلى الماء : تحدث عملية الإذابة

إذا كان المُذاب:

١- مادة أيونية: فإن دقائق المُذاب تتفكك إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة، ثم ترتبط بجزيئات المُذيب.

٢- مادة قطبية : فإن دقائق المُذاب تتأين إلى جزيئات قطبية مُنفصلة ، ثم ترتبط بجزيئات المُذيب

وبالتالي فإن عملية الإذابة : هي عملية تفكك دقائق المُذاب إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة

، أو تأين دقائق المُذاب إلى جزيئات قطبية مُنفصلة ، ثم ترتبط تلك الأيونات أو الجزيئات القطبية بجزيئات المُذيب.

عملية ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء



تفسير ذوبان ملح الطعام في الماء (NaCl)

(اصطدام ثم تجاذب ثم إحاطة ثم إنتشار ثم تكوين محلول كلوريد الصوديوم)

عند وضع البلورة من كلوريد الصوديوم في الماء يحدث الآتي :

- ١ تصطدم جزيئات الماء القطبية بفعل طاقة حركتها بالبلورة .
- ٢ تجذب جزيئات الماء كل من أيونات الصوديوم الموجبة Na⁺ وأيونات الكلوريد السالبة Cl⁻ نحوها ، فتتفصل هذه الأيونات مُبتعدة عن البلورة .

- ٣ تُحاط كل من أيونات الصوديوم وأيونات الكلوريد بجزيئات الماء لتكون أيونات مُماهة .

- ٤ تنتشر الأيونات المُماهة بشكل مُنتظم مكونة محلول

العوامل التي تؤثر علي سرعة عملية الإذابة :

- ١ مساحة سطح المُذاب أو الطحن .
- ٢ عملية التقليب أو التحريك أو الخلط .
- ٣ درجة الحرارة .

النتائج

- ١ كلما زادت سرعة عملية الإذابة ؛ قل وقت الذوبان .
- ٢ المُذاب في حجم المسحوق أسرع في الإذابة من المُذاب في حجم القطع الصغيرة أو في حجم القطعة الواحدة .
- ٣ بزيادة عملية التقليب تزداد عملية الإذابة .
- ٤ بزيادة درجة الحرارة تزداد عملية الإذابة .

الذوبانية

- ١ قابلية المذاب للذوبان في مذيب معين أو قدرة المذيب علي إذابة مذاب ما .
- ٢ كتلة المذاب بالجرام التي تذوب في 100g من الماء لتكوين محلول مُشبع في الظروف القياسية .
- ٣ تُقدر بوحدة (100gH₂O / مذاب g) .

العوامل التي تؤثر علي الذوبانية :

- ١ طبيعة المذيب والمذاب .
- ٢ درجة الحرارة .

١ أولاً : الطبيعة المذيب والمذاب علي الذوبانية

” الشبيه يذيب الشبيه (like dissolves like) ” هذه القاعدة تحكم عملية الذوبانية .

◀ فإذا كان المذيب قطبي فإن المذاب يكون قطبي أيضاً أو أيوني .

◀ وإذا كان المذيب غير قطبي (عضوي) فإن المذاب غير قطبي (عضوي) أيضاً .

المصنفات

غير القطبية (العضوية)	القطبية مثل : الماء تُذيب
١ مثل : البترين أو ثنائي كلوروميثان أو الكحول الإيثيلي أو الكلورفورم أو الأسيتون أو رابع كلوريد الكربون .	١ المواد القطبية مثل : كلوريد الهيدروجين (HCl) - النشادر (NH ₃) - بروميد الهيدروجين (HBr) - يوديد الهيدروجين (HI) - فلوريد الهيدروجين (HF)
٢ المواد الغير قطبية مثل : الميثان (CH ₄) - الزيت - الدهن - الشحم - اليود - الجازولين .	٢ المواد الأيونية مثل : كلوريد الصوديوم (NaCl) - هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) - كلوريد البوتاسيوم (KCl) - هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) - نترات النيكل II Ni (NO ₃) ₂ - كبريتات الصوديوم (Na ₂ SO ₄)
ذوبان الزيت في الكحول	ذوبان الملح في الماء



سؤال 1: الزيت يذوب في البنزين؟

جواب: وذلك لأن البنزين مذيب غير قطبي ويذيب المواد الغير قطبية كالزيت ، وبالتالي فعند خلطهما فإن الشبيه يذيب الشبيه ، فتنتشر جزيئات الزيت بين جزيئات البنزين ضعيفة الروابط فتترتبط جزيئات المذاب (الزيت) بجزيئات المذيب (البنزين) .

سؤال 2: ملح الطعام يذوب في الماء؟

جواب: وذلك لأن الماء مذيب قطبي ويذيب المواد الأيونية كملح الطعام ، وبالتالي فعند خلطهما فإن الشبيه يذيب الشبيه ، فتنتشر جزيئات الملح بين جزيئات الماء ضعيفة الروابط فتترتبط جزيئات المذاب (الملح) بجزيئات المذيب (الماء) .

سؤال 3: الزيت لا يذوب في الماء؟

جواب: وذلك لأن الماء مذيب قطبي والزيت من المواد غير القطبية .

سؤال 4: ملح الطعام لا يذوب في البنزين؟



جواب: وذلك لأن البنزين مذيب عضوي والملح من المواد الأيونية .

سؤال 5: اليود يذوب في البنزين ولا يذوب في الماء؟

جواب: وذلك لأن البنزين عضوي والماء قطبي ، بينما اليود من المواد غير القطبية (العضوية) .

سؤال 6: السكر (C₆H₁₂O₆) من المواد غير القطبية ولكن يذوب في الماء؟

جواب: وذلك لأن السكر يحتوي علي مجموعات الهيدروكسيل (OH) القطبية التي ترتبط بجزيئات الماء عن طريق الروابط الهيدروجينية .



الصيغة البنائية للسكر



تطبيق على القطبية وعدم القطبية

الذوبانية في 100 من الماء عند درجة حرارة 20°C الإيثانول عند درجة حرارة 20°C
الذوبانية في 100 من

3.8g

192g

47.6g

6.5g

المصدر

عالم الكيمياء
(NF NOJ)
كيمياء المحاليل
(H2O)

نترات الأمونيوم أعلى قطبية وذلك لأنه يذوب في المذيب القطبي (الماء) بدرجة أعلى من كلوريد الزئبق II الأقل قطبية.


كلوريد الزئبق II الأقل قطبية أعلى ذوبانية في الكحول الأقل قطبية من الماء

من خلال الشكل المقابل :

نلاحظ 3 أنابيب تحتوي كل منها على خليط

غير متجانس من الماء «مذيب قطبي» ورابع

كلوريد الكربون «مذيب غير قطبي» :



١ في الأنبوبة (a) : كلاً من المذيبين لا يذوبا في الآخر

؛ وذلك لأن الماء مذيب قطبي ورابع كلوريد الكربون مذيب غير قطبي .

٢ في الأنبوبة (b) : عند إضافة اليود إلى الأنبوبة (a) «الخليط من الماء ورابع كلوريد الكربون» ، نلاحظ أن اليود

يذوب في شبيهه وهو رابع كلوريد الكربون ولا يذوب في الماء ؛ لأن اليود من المركبات الغير قطبية وبالتالي

تذوب في المذيبات الغير قطبية كرابع كلوريد الكربون بينما الماء قطبي .

٣ في الأنبوبة (c) : عند إضافة نترات النيكل II الخضراء إلى الأنبوبة (a) ، نلاحظ أن نترات النيكل II تذوب في

الماء ولا تذوب في رابع كلوريد الكربون ؛ وذلك لأن نترات النيكل II من المركبات الأيونية التي تذوب في

المذيبات القطبية كالماء ولا تذوب في المذيبات الغير قطبية كرابع كلوريد الكربون .

أربع تجارب أجريت لتكوين أربع محاليل متجانسة :

١ التجربة الأولى : تم إذابة 20g من كلوريد الصوديوم في 100g من الماء .

٢ التجربة الثانية : تم إذابة 20g من كلوريد الصوديوم في 100g من الكيروسين .

٣ التجربة الثالثة : تم إذابة 2L من غاز الميثان في أنبوبة مغلقة تحتوي على 100g من الأسييتون (at STP) .

٤ التجربة الرابعة : تم إذابة 20g من الجازولين في 100g من الكلوروفورم .

كل هذه التجارب تكون محاليل مُتجانسة عدا ؟.....


- أ. التجربة الأولى . ب. التجربة الثانية . ج. التجربة الثالثة . د. التجربة الرابعة .

يستخدم قمع فصل يمكن فصل

- أ. كبريتات الصوديوم في الماء . ب. نترات البوتاسيوم في البنزين .
ج. غاز كلوريد الهيدروجين في الماء . د. مكونات الدم .

أولاً درجة الحرارة

" تعتمد الذوبانية علي درجة الحرارة ؛ حيث أنه بزيادة درجة حرارة المُذيب تزداد ذوبانية معظم المواد الصلبة "



من خلال الشكل المُقابل :

" يتضح أثر درجة حرارة الماء

علي كتلة السكر المذابة في الماء ،

حيث أنه برفع درجة حرارة الماء بمقدار


20°C تذوب كتلة من السكر مقدارها 100g.

تزداد ذوبانية معظم الأملاح زيادة كبيرة بزيادة درجة الحرارة . مثل : نترات البوتاسيوم - نترات الصوديوم

- كلوريد البوتاسيوم - كلورات البوتاسيوم ($KClO_3$) - بيكرومات البوتاسيوم ($K_2Cr_2O_7$) -

نترات الرصاص II ($Pb(NO_3)_2$) - كلوريد الكالسيوم .


" أي كلما زادت درجة الحرارة زادت ذوبانية هذه الأملاح "



تزداد ذوبانية بعض الأملاح زيادة طفيفة بزيادة درجة الحرارة ،

مثل : كلوريد الصوديوم .

" أي كلما زادت درجة الحرارة زادت ذوبانية كلوريد الصوديوم بدرجة قليلة "




تقل ذوبانية بعض الأملاح بزيادة درجة الحرارة ،

مثل : كبريتات السيريوم $Ce_2(SO_4)_3$

" أي كلما زادت درجة الحرارة قلت ذوبانية كبريتات السيريوم "



يلاحظ من خلال المخطط المقابل اختلاف ذوبانية هذه الأملاح برفع درجة الحرارة



١) أملاح تذوب بدرجة كبيرة ولكن تقل بخفض درجة الحرارة

ع سبيل المثال : نترات البوتاسيوم بالشكل المقابل : عند درجة

حرارة 0°C ذاب 12g ، وعند درجة حرارة 52°C ذاب 100g
فعند رفع درجة الحرارة زادت ذوبانية نترات البوتاسيوم .

٢) أملاح تذوب بدرجة ضعيفة ولكن تقل بنفس الدرجة عند


خفض درجة الحرارة

ع سبيل المثال : كلوريد الصوديوم بالشكل المقابل : عند درجة حرارة

0°C ذاب 33g ، وعند درجة حرارة 100°C ذاب 100g فعند رفع درجة الحرارة زادت ذوبانية كلوريد الصوديوم
ولكن بدرجة طفيفة جداً »

٣) أملاح لا تزداد ذوبانيتها بل تقل ولكن تزداد بخفض درجة الحرارة

ع سبيل المثال : كبريتات السيريوم بالشكل المقابل : عند درجة حرارة 0°C ذاب 18g ، وعند 100°C ذاب 2g
فعند رفع درجة الحرارة قلت ذوبانية كبريتات السيريوم »




من خلال المخطط المقابل نلاحظ

نلاحظ أن الغازات تقل ذوبانيتها برفع درجة الحرارة

أي أن العلاقة عكسية بين درجة الحرارة وذوبانية الغازات

ولكن تزداد ذوبانية الغاز في الماء البارد وليس الساخن

ادرس الشكل المقابل : الذي يمثل منحني الذوبانية لبعض الأملاح في الماء ، ثم اجب عما يلي :



١) ما الملح الذي يزداد ذوبانه برفع درجة الحرارة ؟

٢) ما الملح الأقل تغيراً في ذوبانيته برفع درجة الحرارة ؟

٣) أيًا من الملحين (بروميد البوتاسيوم أم كلورات الصوديوم) أكثر ذوباناً

برفع درجة الحرارة ؟

٤) احسب الفرق بين كتلة كلورات الصوديوم المذابة في محلول مشبع

منه عند تسخينها من 45°C إلي 90°C ؟

٥) احسب الفرق بين كتلة بروميد البوتاسيوم المذابة في محلول مشبع منه عند تسخينها من 50°C إلي 90°C ؟

٦ احسب كتلة كلورات الصوديوم اللازمة للذوبان في 200g من الماء لتكوين محلول مُشبع عند 90°C ؟

٧ احسب كتلة نترات البوتاسيوم اللازمة للذوبان في 50g من الماء لتكوين محلول مُشبع عند 60°C ؟

٨ احسب كتلة كلورات الصوديوم المترسبة عند تبريد محلول مُشبع منه من 100°C إلى 25°C ؟

٩ احسب كتلة بروميد البوتاسيوم المترسبة عند تبريد محلول مُشبع منه بمقدار 40°C ؟

١٠ احسب كتلة نترات البوتاسيوم المترسبة من محلول مُشبع به 200g من الماء عند تبريده من 40°C إلى 10°C ؟

الاول

١ نترات البوتاسيوم . ٢ كلوريد الصوديوم .

٣ كلورات الصوديوم ؛ وذلك لأن ذوبانيته أعلى من ذوبانية بروميد البوتاسيوم .

٤ الفرق في كتلة كلورات الصوديوم : عند درجة الحرارة 45°C كانت كتلة كلورات الصوديوم 120g وعند درجة

الحرارة 90°C كانت كتلة كلورات الصوديوم 180g.

الفرق في كتلة كلورات الصوديوم = 180 - 120 = 60g

٥ الفرق في كتلة بروميد البوتاسيوم : عند درجة الحرارة 50°C كانت كتلة بروميد البوتاسيوم 80g وعند درجة

الحرارة 90°C كانت كتلة بروميد البوتاسيوم 100g

الفرق في كتلة بروميد البوتاسيوم = 100 - 80 = 20g

٦ يتضح من منحنى الذوبانية أنه عند 90°C يذوب 180g من كلورات الصوديوم في 100g من الماء لتكوين

محلول مُشبع ، إذن ما الكتلة المُذابة منه في 200g من الماء ؟



$$X \text{ (كتلة كلورات الصوديوم المُذابة في 200 g من الماء)} = \frac{200 \times 180}{100} = 360g$$

٧ يتضح من منحنى الذوبانية أنه عند 60°C يذوب 110g من نترات البوتاسيوم في 100g من الماء لتكوين

محلول مُشبع ، إذن ما الكتلة المُذابة منه في 50g من الماء ؟



$$X \text{ (كتلة نترات البوتاسيوم المُذابة في 200 g من الماء)} = \frac{50 \times 110}{100} = 55g$$

٨ كتلة كلورات الصوديوم المترسبة : عند درجة حرارة 100°C كانت كلورات الصوديوم 200g وعند درجة حرارة

25°C كانت كتلة كلورات الصوديوم 100g

كتلة كلورات الصوديوم المترسبة = $200 - 100 = 100\text{g}$

٩ كتلة بروميد البوتاسيوم المترسبة : عند درجة حرارة 90°C كانت بروميد البوتاسيوم 100g وعند درجة حرارة

50°C كانت كتلة بروميد البوتاسيوم 80g » بمفترض درجات الحرارة من 90°C إلي 50°C وذلك لأنه تم تبريد

المحلول بمقدار 40°C ، أي تم خفض درجة الحرارة بمقدار 40°C "

كتلة بروميد البوتاسيوم المترسبة = $100 - 80 = 20\text{g}$

١٠ كتلة نترات البوتاسيوم المترسبة :

يتضح من منحنى الذوبانية أنه عند 40°C يذوب 60g من نترات البوتاسيوم في 100g من الماء لتكوين محلول


مشبع ، وعند 10°C يذوب 20g وبالتالي فإنه عند خفض درجة الحرارة بمقدار 30°C (من 40°C إلي 10°C) ،

فإنه يترسب 40g في 100g من الماء ، إذن كتلة نترات البوتاسيوم المترسبة في 200g من الماء ؟



$$X \text{ (كتلة نترات البوتاسيوم المذابة في } 200\text{ g من الماء)} = \frac{200 \times 40}{100} = 80\text{g}$$

١١ ادرس الشكل المقابل ، الذي يمثل منحنى الذوبانية لبعض الأملاح في الماء ، ثم اجب عما يلي :



١ ما المادة التي يزداد ذوبانها برفع درجة الحرارة ؟

٢ ما الملح الأقل تغيراً في ذوبانيته برفع درجة الحرارة ؟

٣ أيًا من الغازات (غاز النشادر - غاز ثاني أكسيد الكبريت - غاز كلوريد

الهيدروجين) أكثر ذوباناً بخفض درجة الحرارة ؟

٤ ما الملح

٥ احسب الفرق بين كتلة كلورات البوتاسيوم المذابة في محلول مشبع

منه عند تسخينها من 55°C إلي 90°C ؟

٦ احسب الفرق بين كتلة كلوريد البوتاسيوم المذابة في محلول مشبع

منه عند تسخينها من 10°C إلي 60°C ؟

٧ احسب كتلة كلوريد الأمونيوم اللازمة للذوبان في 200g من الماء لتكوين محلول مشبع عند 70°C ؟

٨ احسب كتلة نترات الصوديوم اللازمة للذوبان في 50g من الماء لتكوين محلول مشبع عند 70°C ؟

٩ احسب كتلة يوديد البوتاسيوم المترسبة عند تبريد محلول مشبع منه من 20°C إلي 10°C ؟

١٠ احسب كتلة كلورات الصوديوم المترسبة عند تبريد محلول مشبع منه بمقدار 40°C ؟

١١ احسب كتلة نترات البوتاسيوم المترسبة من محلول مشبع به 300g من الماء عند تبريده من 70°C إلي 50°C ؟

١٢ احسب حجم غاز النشادر في عند تبريد محلوله المائي من 90°C إلى 50°C ؟ عند ثبوت الضغط .

١٣ يوضح الجدول المقابل ذوبانية أنواع مختلفة من الأملاح في الماء عند درجة حرارة مُعينة ، أي الأملاح

أقلها ذوبانية في الماء عند 60°C ؟

الدرجة الحرارة (°C)	الماء
10g	50g ماء
20g	60g ماء
30g	120g ماء
40g	80g ماء

ب الملح Y

د الملح Z









ا الملح W

ج الملح X


٢ من خلال الجدول المقابل : أيًا من الأشكال البيانية الآتية تُعبر عن منحنى

ذوبانية هذا المركب ؟

درجة الحرارة (°C)	الذوبانية (g)
0	0.0069
10	0.0054
20	0.0043




من خلال الشكل المقابل . اجب :



1. أعلي المواد ذوبانية عند رفع درجة الحرارة ؟
2. أقل المواد ذوبانية عند رفع درجة الحرارة ؟
3. أعلي المواد ذوبانية عند خفض درجة الحرارة ؟
4. أقل المواد ذوبانية عند خفض درجة الحرارة ؟
5. المادة التي تتغير ذوبانيتها قليلاً عند رفع درجة الحرارة ؟
6. رتب هذه المواد تصاعدياً حسب الذوبانية .
7. ما النسبة المئوية الكتلية للمادة للذوبان (6) في المحلول المشبع عند درجة حرارة 20°C ؟

منحني ذوبانية شامل لمعظم الأملاح المعروفة





تركيز المحاليل والخواص الجمعية وخواص الغرويات والمعلقات

زيادة كمية المذاب أو قلتها تؤثر على تركيز المحلول وقوته .

- فإذا كانت كمية المذاب كبيرة ولكنها أقل من كمية المذيب ؛ فإن المحلول مُركّز .

- وإذا كانت كمية المذاب صغيرة ؛ فإن المحلول مُخفف .



- الشكل المُقابل يوضح دويان المذاب أكثر في المحلول المُركّز عن المحلول المُخفف .

- لتحويل المحلول المُخفف إلى مُركّز : زيادة كمية المذيب .

- لتحويل المحلول المُركّز إلى مُخفف : زيادة كمية المذاب .

طرق التعبير عن تركيز المحاليل

- ١ النسبة المئوية (%)
- ٢ المولارية
- ٣ المولالية

١ النسبة المئوية (%)

عدد وحدات الجزء بالنسبة لكل 100 وحدة من الكل .

للتعبير عن تركيز مكونات المواد الغذائية والأدوية نستخدم النسب المئوية .

مفاتيح تعريفية للنسبة المئوية

هي حجم المذاب في 100mL من المحلول

هي كتلة المذاب في 100g من المحلول

القانون المستخدم :

القانون المستخدم :

النسبة المئوية الكتلية (m/m) (كتلة/كتلة) (g/g) النسبة المئوية الحجمية (v/v) (حجم/حجم) (mL/mL)

$$100\% = \frac{\text{حجم المذاب (mL)}}{\text{حجم المحلول (mL)}}$$

$$100\% = \frac{\text{كتلة المذاب (g)}}{\text{كتلة المحلول (g)}}$$

حجم المحلول = حجم المذاب + حجم المذيب

كتلة المحلول = كتلة المذاب + كتلة المذيب

سؤال ما معنى قولنا أن ؟

١ النسبة المئوية (m/m) لمحلول تساوي 25% ؟

ج أي أن كتلة المذاب في 100g من المحلول تساوي 25g

٢ النسبة المئوية (V/V) لمحلول ما تساوي 20% ؟

ج أي أن حجم المذاب في 100mL من المحلول يساوي 20mL

أعط

١ إذا أعطى أحجوم كلاً من المذيب و المذاب

$$\text{نستخدم : النسبة المئوية الحجمية} = \frac{\text{حجم المذاب}}{\text{حجم المحلول}} \times 100\%$$

◀ يقاس الحجم بوحدة اللتر (L) أو وحدة المليلتر (mL) لكن يجب أن تكون وحدة البسط هي نفسها وحدة المقام .

◀ حجم المحلول = حجم المذيب + حجم المذاب .

٢ أما إذا أعطى كتل كلاً من المذيب و المذاب

$$\text{نستخدم : النسبة المئوية الكتلية} = \frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

◀ يقاس الحجم بوحدة الكيلو جرام (Kg) أو وحدة الجرام (g) لكن يجب أن تكون وحدة البسط هي نفسها وحدة المقام .

◀ كتلة المحلول = كتلة المذيب + كتلة المذاب

٣ كتلة 1mL من المحلول المخفف = 1g « حيث أن كثافة الماء = 1g/mL »



مسائل

١ احسب النسبة المئوية الكتلية (m/m) للمحلول الناتج من ذوبان 10g من السكر في 240g من الماء.

$$\text{كتلة المحلول} = \text{كتلة المذاب} + \text{كتلة المذيب} = 250g = 240 + 10$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية} = \frac{\text{كتلة المذاب (g)}}{\text{كتلة المحلول (g)}} \times 100\% = 100\% \times \frac{10}{250} = 4\%$$

٢ احسب النسبة المئوية الحجمية (V/V) للمحلول الناتج من إضافة 25mL من الإيثانول إلى كمية من الماء

لتكوين محلول حجمه 50mL

$$\text{النسبة المئوية الحجمية} = \frac{\text{حجم المذاب (mL)}}{\text{حجم المحلول (mL)}} \times 100\% = 100\% \times \frac{25}{50} = 50\%$$

١ ما النسبة المئوية الكتلية (m/m) للمحلول الناتج من ذوبان 20g من كلوريد الصوديوم في 180g من

الماء ؟

10% أ

20% ب

50% ج

70% د

٢ أضيف 50mL من الإيثانول في ورق عيارى ، ثم أضيف إليه كمية من الماء فأكمل حجم المحلول إلى

250mL ، كم النسبة المئوية الحجمية (v/v) =

10% أ

20% ب

50% ج

70% د

٣ المولالية.

٢ المولارية

المولارية والمولالية

المولالية (m)

هي عدد مولات المذاب في كيلوجرام من المذيب

القانون المستخدم :

المولالية (m)

عدد مولات المذاب (mol)

كتلة المذيب (Kg)

الوحدة : (mol/Kg) (مول / كجم) ويُمكن اختصارها إلى (m)

كتلة المذاب (g)

الكتلة المولية من المذاب (g/mol)



هي عدد مولات المذاب في لتر من المحلول

القانون المستخدم :


المولارية (M)

المذاب مولات عدد (mol)

المحلول حجم (L)

الوحدة : (mol/L) (مول / لتر) أو (Mol) (مولر) ويُمكن اختصارها إلى (M)

عدد مولات المذاب (mol) =



- المحلول المولاري : محلول يحتوي اللتر منه على واحد مول من المادة المذابة .

- للتحويل من لتر (L) ← مليلتر (mL) نقسم على 10^3 أو نضرب $\times 10^{-3}$ ، العكس نضرب $\times 10^3$



مسائل

١ احسب التركيز المولاري لمحلول سكر القصب $C_{12}H_{22}O_{11}$ في الماء إذا علمت أن كتلة السكر المذابة 85.5g في محلول حجمه 0.5L

(C=12 ، H=1 ، O=16)

$$\frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \text{عدد المولات}$$

$$\frac{\text{عدد المولات}}{\text{حجم المحلول}} = \text{المولارية (M)}$$

$$\text{الكتلة المولية لسكر القصب} = (12 \times 12) + (22 \times 1) + (11 \times 16) = 342 \text{g/mol}$$

$$\text{المولارية (M)} = \frac{0.25}{0.5} = 5.0 \text{ مول / لتر.}$$

$$\text{عدد المولات} = \frac{85.5}{342} = 0.25 \text{ مول}$$

٢ احسب التركيز المولالي لمحلول مُحضَر بإذابة 20g هيدروكسيد صوديوم في 800g من الماء علماً بأن (O = 16 ، H = 1 ، Na = 23)

$$\frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية}} = \text{عدد المولات}$$

$$\frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{كتلة المذيب}} = \text{المولارية (M)}$$


$$\text{كتلة المذيب} = 800 \text{g}$$

$$\text{الكتلة المولية ل NaOH} = 1 + 16 + 23 = 40 \text{g/mol}$$

$$\text{المولالية (m)} = \frac{0.5}{0.8} = 0.625 \text{ مول / كيلوجرام.}$$

$$\text{عدد مولات NaOH} = \frac{20}{40} = 0.5 \text{ مول}$$

٣ ما تركيز أيونات الكلوريد والصوديوم في الماء لتكوين محلول كلوريد الصوديوم تركيزه 0.5M؟



$$1 \text{ mol} \quad 1 \text{ mol} \quad 1 \text{ mol}$$

$$1 \times 0.5 \text{ M} \quad 1 \times 0.5 \text{ M} \quad 1 \times 0.5 \text{ M}$$

- تركيز أيونات الكلوريد = 0.5M

- تركيز أيونات الصوديوم = 0.5M

مسائل غير محلولة :

١) ما التركيز المولاري لمحلول حمض الكبريتيك H_2SO_4 عند إذابة 9.8 منه في محلول حجمه 200mL
(O = 16 , H=1 , S = 32)

- 0.2M ☐ أ 0.3M ☐ ب 0.5M ☐ ج 0.6M ☐ د

٢) ما التركيز المولالي لمحلول هيدروكسيد الصوديوم عند إذابة 10g منه في محلول كتلته 510g
(O = 16 , H = 1 , Na = 23)

- 0.2M ☐ أ 0.3M ☐ ب 0.5M ☐ ج 0.6M ☐ د

٣) احسب تركيز المحلول الناتج من خلط 1g من الإيثانول C_2H_5OH مع 99g من الماء مُعبراً عنه بالطرق التالية : (O = 16 , H = 1 , C = 12)

(1) النسبة المئوية؟

(2) المولالية؟

٤) ما هي النسبة المئوية الحجمية للإيثانول (C_2H_5OH) عندما يُخفف 85mL منه بالماء ليصل لحجم المحلول النهائي 250mL؟

- 34% ☐ أ 44% ☐ ب 64% ☐ ج 84% ☐ د

٥) ما هي النسبة المئوية الحجمية للأسيتون عند تخفيف 10mL منه بالماء ليعطي محلولاً حجمه 200mL ؟

- 5% ☐ أ 20% ☐ ب 25% ☐ ج 55% ☐ د

٦) كم عدد المليلترات من H_2O_2 (ماء الأكسجين المُطهر) الموضح علي ملصق علي زجاجة حيث أن تركيزه 3% علماً بأن حجمها من المحلول 400mL ؟

- 5mL ☐ أ 12mL ☐ ب 30mL ☐ ج 20mL ☐ د

٧) كم مولارية محلول يحتوي علي 0.9g من NaCl في 100mL من المحلول ؟ [NaCl=58.5]

- 0.01M ☐ أ 0.1M ☐ ب 0.02M ☐ ج 0.2M ☐ د

٨) كم مولارية محلول حجمه 2L من الجلوكوز كتلته 36g ؟ [الكتلة المولية للجلوكوز = 180g/mol]

- 0.05M ☐ أ 0.01M ☐ ب 0.5M ☐ ج 0.1M ☐ د

٩) ما مولارية محلول حجمه 250mL ويحتوي علي 0.7mol NaCl ، علماً بأن الكتلة المولية لكلوريد الصوديوم هي 58.5g/mol ؟

- 1.8M ☐ أ 2.1M ☐ ب 2.5M ☐ ج 2.8M ☐ د

١٠ كم عدد مولات نترات الأمونيوم الموجودة في 335mL من محلول NH_4NO_3 تركيزه 0.4M ، علماً بأن الكتلة المولية هي 80g/mol ؟

0.134mol

0.324mol

0.153mol

0.0534mol

١١ كم عدد مولات المُذاب الموجودة في CaCl_2 من محلول 250mL تركيزه 2M ؟ مول ، ثم احسب عدد جرامات CaCl_2 في هذا المحلول ؟ [Ca=40 , Cl=35.5]

[0.5 mol – 55.5 g]

١٢ كم عدد جرامات يوديد البوتاسيوم الذي يلزم لتذوب في 500g الماء لتحضير محلول KI مولاته 0.06m ؟ علماً بأن $[\text{H}_2\text{O} = 1 \text{ g} , 1\text{mL}]$ ، الكتلة المولية ليوديد البوتاسيوم = 166g/mol


[5 g]

١٣ ما مولارية 4L من محلول كبريتات النحاس تحتوي علي 400g من CuSO_4 ؟ علماً بأن الكتلة المولية لكبريتات النحاس هي 159.6g/mol

١٤ ما مولارية 1500mL من محلول بيكربونات الصوديوم تحتوي علي 0.06mol من بيكربونات الصوديوم ؟ [Na=23 , C=12 , O=16 , H=1]

١٥ ما تركيز أيونات الفوسفات المُذابة في الماء لتكوين محلول فوسفات البوتاسيوم تركيزه 0.2M ؟

تخفيف المحاليل



- المحاليل القياسية معلومة التركيز كيفية تحويلها إلى محاليل مُخففة ؟
عن طريق إضافة المذاب ، وبالتالي يُقلل ذلك عدد مولات المذاب في وحدة الحجم ، لكن العدد الكلي لمولات المذاب في المحلول تبقى كما هي ؛ لذلك عدد مولات المذاب قبل التخفيف يساوي عدد المولات بعد التخفيف :

عدد المولات قبل التخفيف = عدد المولات بعد التخفيف .

التركيز الأصلي × الحجم الأصلي = التركيز النهائي × الحجم الكلي .

الحجم الكلي = حجم المحلول + حجم الماء المضاف .

مثال توضيحي

كم حجم محلول $MgSO_4$ مولاريته 2M اللازم لتحضير 100mL من $MgSO_4$ مولاريته 0.4M ؟

∴ عدد مولات المذاب قبل التخفيف = عدد مولات المذاب بعد التخفيف

∴ تركيز كبريتات الماغنسيوم الأصلي (2M) × حجم المحلول الأصلي (X mL) = تركيز كبريتات الماغنسيوم النهائي (0.4 M) × حجم المحلول الكلي (100 mL)

$$100 \times 0.4 = X \times 2 \quad \therefore$$

$$\therefore (X) \text{ حجم محلول كبريتات الماغنسيوم} = \frac{100 \times 0.4}{2} = 20\text{mL}$$

مثال إذا توفرت لديك المحاليل المركزة الآتية :

١ محلول NaCl مولاريته 2M

٢ محلول KNO_3 مولاريته 4M

٣ محلول $MgSO_4$ مولاريته 0.5M

- احسب الحجوم التي يلزم تخفيفها من المحاليل السابقة لتحضير المحاليل الآتية :

أ 500mL NaCl مولاريته 0.5M

ب 50mL KNO_3 مولاريته 2M

ج 2L $MgSO_4$ مولاريته 0.2M

الخواص الجموعية

1 الخواص الجموعية


- « يتطلب طهي وجبات كثيرة من الطعام إضافة كميات صغيرة من الملح للماء الذي يُستخدم في عملية الطهي ، فمعظم الناس يفضلون مذاق الطعام المُمَلح !! ، فما هو التأثير الآخر للملح علي عملية الطهي ؟؟؟ »
- « أيضاً في كثير من المناطق التي يكون شتاؤها بارداً وتنخفض فيها درجات الحرارة إلي ما دون الصفر ، تضطر هذه البلاد إلي رش الطرق بالملح الصلب لمنع تجمد الماء وتكوين جليد والحد من كثرة الحوادث . »
- « وأيضاً يضطر سائقو السيارات شراء بعض المواد المضادة للتجمد (Anti - gel) ويفرغونها في مبرد السيارة لتجنب تجمد مياه المبرد فيُصبح تشغيل المحرك مُستحيلاً ؛ ما أسباب هذه التأثيرات التي تخفض درجة التجمد ؟؟؟ »
- وبالتالي :-

- « تختلف خواص المحاليل عن خواص المذيبات النقية لها بعد إذابة مواد غير متطايرة بها تحت نفس الظروف ، وتسمى هذه الخواص بالخواص الجموعية . ومن هذه الخواص :
- 1 انخفاض الضغط البخاري .
- 2 ارتفاع درجة الغليان .
- 3 انخفاض درجة التجمد .

أولاً : انخفاض الضغط البخاري

« عند وضع كمية من سائل معين وليكن (الماء) في إناء مغلق ، ثم التسخين نلاحظ أنه :


- 1 في البداية يبدأ السائل في التبخر تدريجياً ، وتكون سرعة التبخر أكبر من سرعة التكاثف « عدد جزيئات السائل المتبخرة أكبر من عدد جزيئات السائل المتكثفة » .
 - 2 بمرور الوقت تزداد كمية البخار فيسبب ضغطاً على سطح السائل يعرف بالضغط البخاري و تبدأ عملية التكاثف تدريجياً حتى تتساوي سرعة التكاثف مع سرعة التبخر .
- و (عندما يكون سرعة التبخر = سرعة التكاثف)
- يوصف هذا النظام بأنه نظام متزن في حالة إتزان ديناميكي



الضغط البخاري

- « الضغط الذي يؤثر به بخار السائل علي سطح السائل ، عندما يكون البخار في حالة إتزان ديناميكي مع السائل ، داخل إناء مغلق عند ضغط و حرارة ثابتين . »

يعتمد الضغط البخاري للسائل على درجة حرارة السائل ، فكلما زادت درجة الحرارة :



هذا الشكل يوضح أثر إضافة مذاب إلى المذيب وتأثير الضغط البخاري للمذيب

١) يزداد معدل التبخر.

٢) يزداد الضغط البخاري.

الضغط البخاري للمذيب النقي أكبر من الضغط البخاري للمحلول عند نفس درجة الحرارة.

وللتوضيح انظر الجدول التالي :

محلول | خطوط متساوية



ترتبط جزيئات المذاب بالمذيب فيقل من عدد جزيئات المذيب المعرضة للتبخر وتكون القوى التي يجب التغلب عليها هي قوى التجاذب بين جزيئات المذيب و المذاب

قوة التجاذب بين جزيئات المذيب و بعضها
أضعف من

قوة التجاذب بين جزيئات المذيب و المذاب



تكون جزيئات السطح المعرضة للتبخر جزيئات المذيب فقط

وتكون القوى الوحيدة التي يجب التغلب عليها هي قوى التجاذب بين جزيئات المذيب و بعضها

الضغط البخاري للمذيب النقي أكبر


الضغط البخاري للمحلول أقل

علال الضغط البخاري للمحلول أقل دائماً من الضغط البخاري للمذيب النقي المكون له ؟

لأن قوى التجاذب بين جزيئات المذيب و المذاب (في المحلول) أكبر من قوى التجاذب بين جزيئات المذيب و بعضها (في حالة المذيب) ، وبالتالي يقل عدد جزيئات المذيب المعرضة للتبخر من سطح المحلول .


الضغط البخاري

ب. فعند إذابة مادة غير متطايرة في مذيب نقي يحدث الآتي :




لاحظ قلة الضغط البخاري (عدد جزيئات المذيب المتبخرة)

١. ترتبط جزيئات المذاب بالمذيب .
٢. فيقل عدد جزيئات المذيب المعرضة للتبخر .
٣. وتكون القوى التي يجب التغلب عليها هي قوى التجاذب بين جزيئات المذيب و المذاب .
٤. وبالتالي يقل الضغط البخاري .




مذيب نقي
حيث الضغط البخاري أكبر



مذيب به مادة غير متطايرة
حيث الضغط البخاري أقل

الخطأ

١. كلما زادت عدد مولات أيونات أو جزيئات المذاب ؛ فإن الإنخفاض في الضغط البخاري يزداد «علاقة طردية» .
٢. كلما زادت عدد مولات أيونات أو جزيئات المذاب ؛ فإن الضغط البخاري يقل «علاقة عكسية» .
٣. الضغط البخاري لا يتوقف علي نوع المحلول بل علي عدد مولات الأيونات (بالمحلول الإلكتروليتي) وعدد مولات الجزيئات (بالمحلول اللاإلكتروليتي) .



الشكل المقابل يوضح العلاقة بين الضغط البخاري للماء وبعض المركبات عند ذوبانها في الماء :


« من خلال الشكل السابق : نتضح بأن أكثر المواد المذابة إنخفاضاً في الضغط البخاري للماء هي المادة الأكثر عدد مولات أيونات وهي (CaCl₂) ثم (K₂HPO₄) »

ثانياً : ارتفاع درجة الغليان

إذا استمرت درجة الحرارة في الارتفاع حتى يصبح الضغط البخاري مساوياً للضغط الجوي فإن السائل يبدأ في الغليان ، و تسمى درجة حرارة السائل في هذه الحالة نقطة الغليان الطبيعية .

نقطة (درجة) الغليان الطبيعية


النقطة (أو : درجة الحرارة) التي يتساوى عندها الضغط البخاري مع الضغط الجوي المعتاد



نقطة (درجة) الغليان المقاسة

النقطة (أو : درجة الحرارة) التي يتساوى عندها الضغط البخاري مع الضغط الواقع عليه .

① يمكن الإستدلال على نقاء سائل من خلال درجة غليانها حيث يكون السائل نقي إذا تطابقت درجة غليانه المقاسة مع درجة الغليان الطبيعية له .



■ من الشكل التالي يتضح أن :

« الماء النقي يغلي عند 100 °C ، في ضغط جوي مُعتاد (1atm) »
 « عند إضافة نسبة من الملح في الماء النقي يصبح مخلوط متجانس (محلول مائي) وقد وجد أن : درجة غليانه أعلى من الماء النقي . »



من ذلك نستنتج أن

ارتفاع درجة غليان الماء المالح (المحلول) عن درجة غليان الماء النقي .

وتفسير ذلك هو أن : جسيمات الملح تقلل من عدد جزيئات الماء المتبخرة التي تهرب من سطح السائل ، وإذا قل عدد جزيئات البخار قل ضغطها البخاري وحتى نصل إلى نقطة الغليان نحتاج إلى زيادة الضغط البخاري حتى يتساوى مع الضغط الجوي ، فنزيد درجة الحرارة لأننا بحاجة إلى طاقة أكبر للتغلب على قوى التجاذب بين المذيب و المذاب ولزيادة عدد جزيئات الماء المتبخرة حتى يصبح ضغطها البخاري متساوي مع الضغط الجوي ، لذلك ترتفع درجة الغليان . ويتكرر ذلك مع أي مذاب غير متطاير يضاف للمذيب .


٢ تتوقف درجة غليان المحلول على : عدد مولات جزيئات أو أيونات المذاب في المحلول وليس على نوع المحلول .

أمثلة

١ محلول 0.2M من ملح الطعام NaCl يحدث به نفس التفسيرات الذي يحدث لمحلول 0.2M من نترات البوتاسيوم KNO_3 نظراً لتساوي عدد مولات الملح الناتجة من تفككه عند الإذابة .



٢ ولكن إذا قارنا درجة غليان محلول 0.2M من ملح الطعام NaCl مع درجة غليان محلول 0.2M كربونات صوديوم Na_2CO_3 فنجد ارتفاع درجة الغليان بدرجة أكبر في حالة محلول كربونات صوديوم نظراً لزيادة عدد مولات الملح الناتجة من تفككه عند الإذابة .



تعليقات هامة

عال يمكن الإستدلال على نقاء السوائل من درجة غليانها ؟

ج لأن السوائل النقية تتساوى فيها درجة الغليان المقاسة مع درجة الغليان الطبيعية .

عال اختلاف درجة غليان الماء المالح عن درجة غليان الماء النقي ؟

ج لأن إضافة الملح للماء ترفع من درجة غليان المحلول عن الماء النقي حيث أن :

- ١ جسيمات الملح تقلل جزيئات الماء التي تهرب من سطح السائل .
- ٢ فيقل الضغط البخاري .
- ٣ ويحتاج الماء إلى طاقة أكبر .
- ٤ وبالتالي ترتفع درجة الغليان .

عال درجة غليان محلول كلوريد الصوديوم تساوي درجة غليان محلول نترات البوتاسيوم الذي له نفس التركيز؟

ج لأن كل منهما ينتج نفس عدد مولات الأيونات في المحلول .

1 مول	2 مول	1 مول	2 مول
NaCl	NaCl	NaCl	NaCl

عال ارتفاع درجة غليان محلول كربونات الصوديوم عن درجة غليان محلول كلوريد الصوديوم الذي له نفس التركيز ؟

ج بسبب زيادة عدد مولات الأيونات الناتجة في حالة كربونات الصوديوم عن كلوريد الصوديوم .

1 مول	2 مول	1 مول	3 مول
NaCl	NaCl	NaCl	NaCl

س١ محلولين لهما نفس التركيز أحدهما من ملح الطعام و الآخر من كربونات الصوديوم ، وضع أيهما أعلى في درجة الغليان مع التفسير .

س٢ أيا من المحاليل الآتية عند ذوبان كتلة متساوية منها في 100g من الماء تكون لها الارتفاع الأكبر في درجة الغليان ؟

- ١ $(CH_3COO)_2Pb$ ٢ $C_{12}H_{22}O_{11}$ ٣ $Ba_3(PO_4)_2$ ٤ $BaCl_2$

انخفاض درجة التجمد

- ◀ عند إضافة مذاب غير متطاير ك (الملح) إلى مذيب ما يؤثر ذلك تأثيراً عكسياً على درجة تجمد المحلول عما يحدث في درجة الغليان . أي يحدث انخفاض في درجة تجمد المحلول
- ◀ فعند إضافة مذاب إلى المذيب : تنخفض درجة تجمد المذيب عن حالته النقية ، لأن قوى التجاذب بين المذيب و المذاب في المحلول ، تعوق تحول المذيب من سائل إلى صلب (بلورات جليد)

تأثير على درجة التجمد



في المناطق الجليدية: يتم رش كميات كبيرة من الملح على الطرق الجليدية عقب سقوط الأمطار، حتى يمنع انزلاق السيارات ويقلل من الحوادث حيث أن ذوبان الملح في ماء المطر يقلل من درجة تجمده فتقل كمية الجليد على الطريق.

يتناسب مدى الانخفاض في نقطة تجمد المحلول تناسباً طردياً مع عدد مولات جسيمات المذاب الذائبة في المذيب ولا يعتمد علي طبيعة كل منهما.

تجربة للتوضيح

التجربة الثانية

إضافة مول من كلوريد الصوديوم (58.5g) إلى 1000g ماء.

التجربة الأولى

إضافة مول من الجلوكوز (180g) إلى 1000g ماء.

النتيجة

يتجمد المحلول الناتج عند
- 3.72 °C

يتجمد المحلول الناتج عند
- 1.86 °C

أي أن درجة تجمد محلول الملح أقل من درجة تجمد محلول السكر

التفسير

لأن مولاً واحداً من NaCl ينتج مولين من الأيونات ،
ويؤدي ذلك إلى مضاعفة الانخفاض في درجة التجمد.
أي أنه كلما زاد عدد مولات جسيمات المذاب الذائبة في المذيب
يزداد الانخفاض في درجة تجمد المحلول (أي : تقل درجة تجمد المحلول)

تعليقات هامة

علال درجة تجمد المحلول أقل دائماً من درجة تجمد المذيب النقي المكون له ؟

علال عند إضافة مذاب الى المذيب : تنخفض درجة تجمد المذيب عن حالته النقية ؟

علال لأن قوى التجاذب بين المذيب و المذاب في المحلول ، تعوق تحول المذيب من سائل الى صلب (بلورات جليد) فيلزم خفض حرارة المحلول إلى درجة أقل من درجة تجمد المذيب النقي ، حتى تنفصل بلورات المذاب عن بلورات المذيب .

علال في المناطق الجليدية : يتم رش كميات كبيرة من الملح على الطرق الجليدية عقب سقوط الأمطار ؟
ج حتى يمنع انزلاق السيارات ويقلل من الحوادث حيث أن ذوبان الملح في ماء المطر يقلل من درجة تجمده فتقل كمية الجليد على الطريق .

علال الإنخفاض في درجة تجمد محلول كلوريد الصوديوم ضعف الإنخفاض في درجة تجمد محلول سكر الجلوكوز الذي له نفس التركيز ؟

ج لأن ذوبان 1 مول من سكر الجلوكوز في الماء ينتج عنه 1 مول من جزيئاته في المحلول .
ج بينما ذوبان 1 مول من كلوريد الصوديوم في الماء ينتج عنه 2 مول من الأيونات في المحلول .

1 مول	2 مول
و كلما زاد عدد مولات جسيمات المذاب الذائبة في المذيب زاد الإنخفاض في درجة تجمد المحلول	

قانون هسليم

ت حسب درجة تجمد محاليل المواد التي تتأين في الماء (الإلكتروليتات) من العلاقة :
 درجة تجمد المحلول الإلكتروليتي = عدد مولات أيونات في المحلول المولي (1.86 °C) -

مثال احسب درجة تجمد المحلول الذي يحتوي على مول كلوريد الكالسيوم $CaCl_2$ في 1000g ماء ؟

مثال أيهما أقل في التجمد مع التفسير ، محلول من كلوريد الماغنسيوم أم محلول من كلوريد الألومنيوم .

ملاحظة هامة

! الخواص الجمعية للمحاليل تعتمد علي التركيز الكلي لجسيمات المذاب بغض النظر عن نوعيته ، إن التغيرات في الخواص الجمعية للمحاليل التي يُسببها الإلكتروليتات ، تتناسب طردياً مع التركيز المولي الكلي للجسيمات المذابة وليس لوحدة الصيغة . وبالتالي فإن :
ب تأثير التركيز المولي لمالح الطعام (2مول أيون) ضعف تأثير نفس التركيز للسكر (1مول جزئ) .

مثال

! ذوبان نترات الباريوم في الماء :



ب وبالتالي فإن نترات الباريوم تُقلل درجة تجمد المذاب بمقدار ثلاثة أمثال ما يقلله مذاب لا إلكتروليتي عند ذوبانه في نفس المذيب وب نفس التركيز المولي .



تدريب محلّول


س1 ما التغير المتوقع في درجة تجمد الماء في محلول مكون من 62.5g من نترات الباريوم $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ و 1Kg من الماء ؟ (الكتلة المولية لنترات الباريوم = 261g/mol)

طريقة الحل :

أ نحسب التركيز المولالي :-

$$\text{التركيز المولالي} = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{كتلة المذيب (Kg)}} = \frac{62.5}{261} = 0.24m$$

ب نحسب عدد مولات الأيونات الناتجة عن ذوبان نترات الباريوم :-



ج حساب التركيز المولالي للأيونات الناتجة :-

$$= \text{التركيز المولالي} = \text{عدد مولات الأيونات} = 0.24m \times 3 = 0.72m$$

د حساب الإنخفاض في درجة التجمد (التغير المتوقع) من خلال القانون المستخدم :-

$$\text{درجة تجمد المحلول الإلكتروليتي} = \text{عدد مولات أيونات في المحلول المولالي} \times 1.86 = -1.86 \times 0.72 = -1.336^\circ\text{C}$$

س2 ما مقدار الإنخفاض في درجة التجمد المتوقع لمحلول يحتوي علي 0.2mol من كبريتات الماغنسيوم مذابة في 1Kg من الماء ؟

$$[-7.4^\circ\text{C}]$$

س3 إذا كانت درجة تجمد لمحلول مائي من كلوريد الصوديوم -0.20°C ، فما مولالية هذا المحلول ؟


$$[0.054 m]$$

س4 تنخفض درجة تجمد الماء إلي -0.39°C ، عندما يذاب 3.9g من فذاب جزيئي وغير متطاير في 475g من الماء ، احسب الكتلة المولية للمذاب ؟

$$[39.2 \text{ g/mol}]$$

س5 محلول يحتوي علي 16.9g من مركب جزيئي وغير متطاير في 250g من الماء ودرجة تجمده -0.744°C ، ما الكتلة المولية للمذاب ؟

$$[169 \text{ g/mol}]$$



الشكل المقابل يوضح ذوبان الجلوكوز وكلوريد الصوديوم وكلوريد الكالسيوم في الماء :

من خلال الشكل نلاحظ أن :

الجلوكوز لا يتأين بل يذوب في الماء وبالتالي فإن عدد مولات الجزيئات الناتجة عن ذوبانه = 1 مول جزيء



جلوكوز ، ملح الطعام يتفكك في الماء وبالتالي فإن عدد مولات أيوناته = 2 مول أيون



كلوريد الكالسيوم يتفكك في الماء وبالتالي فإن عدد مولات أيوناته = 3 مول أيون (1 مول أيون كالسيوم موجب + 2 مول أيون كلوريد سالب)



أكبر عدد مولات أيونات .. أكبر إنخفاض في الضغط البخاري ، أكبر ارتفاع في درجة الغليان ، أكبر إنخفاض في درجة التجمد (وهو كلوريد الكالسيوم) والعكس صحيح .

ملخص الخواص الجمعية للمحاليل


ماذا يحدث عند : إضافة مذاب غير متطاير (كملح الطعام) إلى مذيب نقي ؟

- 1 ترابط جزيئات المذاب بالمذيب
- 2 فيقل عدد جزيئات المذيب المعرضة للبخار
- 3 تكون القوى التي يجب التغلب عليها هي قوى التجاذب بين جزيئات المذيب و المذاب
- 4 فيقل الضغط البخاري .
- 5 جسيمات المذاب (كالمحلول) تقلل جزيئات الماء التي تهرب من سطح السائل .
- 6 فيقل الضغط البخاري . 3 ويحتاج الماء إلى طاقة أكبر (تسخين).
- 7 تترفع درجة الغليان

قوى التجاذب بين المذيب و المذاب في المحلول ، تعوق تحول المذيب من سائل إلى صلب (بلورات جليد) فتتخفض درجة تجمد المذيب عن حالته النقية .



الشكل البياني المقابل : يوضح التغير في الضغط البخاري ودرجتي غليان وتجمد المذيب النقي(الماء النقي) ، عند إذابة مادة غير متطايرة فيه لتكوين محلول :-



أسئلة تدريب علي الخواص الجمعية

- ١) محاليل متساوية التركيز ، أيًا منها يكون له أكبر ضغط بخاري ؟
 - أ حمض الفورميك .
 - ب ملح الطعام .
 - ج فوسفات الصوديوم .
 - د كبريتات البوتاسيوم .
- ٢) درجة غليان محلول مولالي من ملح الطعام درجة غليان محلول مولالي من سكر الجلوكوز .
 - أ أعلى من
 - ب أقل من
 - ج تساوي
 - د نصف
- ٣) أيًا من المحاليل الآتية (متساوية التركيز) تكون درجة غليانه هي الأكبر ؟
 - أ نترات الصوديوم .
 - ب كلوريد الكالسيوم .
 - ج كبريتات الألومنيوم .
 - د حمض الخليك .
- ٤) أيًا من المحاليل الآتية تكون أعلي في درجة الغليان ؟
 - أ 0.5m K₂CO₃
 - ب 1m K₂CO₃
 - ج 0.5m FeCl₃
 - د 1m FeCl₃

٥ عند إذابة 15 من مادة إلكترونية غير متآينة (كتلتها الجزيئية = 60g/mol) في 500 من الماء ، فإن

درجة تجمد المحلول تقل بمقدار ؟

- 1.86°C ☐ 3.72°C ☐ 0.93°C ☐ 5.58°C ☐

٦ أيًا المحاليل الآتية متساوية التركيز درجة تجمدها هي الأقل ؟

- كلوريد البوتاسيوم ☐ الجلوكوز ☐
كلوريد الحديد III ☐ كلوريد الباريوم ☐

٧ إذا كانت درجة تجمد ملح (X) تركيزه 1mol/Kg هي -5.58°C ، فإن الملح الناتج يحتمل أن يكون

- كلوريد الصوديوم ☐ كربونات الصوديوم ☐
كبريتات الحديدوز ☐ كبريتات الحديد ☐

٨ عند قياس درجتَي تجمد وغليان محلول مائي من كلوريد الصوديوم قد تكون قراءتي الترمومتر هي

- 0°C / 100 °C ☐ -7.44°C / 98 °C ☐
-7.44°C / 102 °C ☐ 0°C / 102 °C ☐

٩ أيًا من العوامل الآتية تعتمد عليها الخواص الجمعية للمحاليل ؟

- تركيز جسيمات المذاب في المحلول ☐ نوع جسيمات المذاب ☐
درجة تشبع المحلول ☐ درجة إنصهار جسيمات المذاب ☐

١٠ ما الصيغة الكيميائية لمُح إذا كانت درجة تجمد محلول مولالي من ملح الصوديوم = -5.58°C ؟


خواص الغرويات والمعلقات

مقدمة

- تعرفنا سابقاً علي أن المخاليط نوعان :
- ١) مخاليط مُتجانسة :- وهي المحاليل .
- ٢) مخليط غير مُتجانسة :- وهما [المُعلقات - الغرويات] .
- سنتعرف علي بعض الخواص الفيزيائية للمخاليط المُتجانسة والغير مُتجانسة :

أولاً : ظاهرة تبدال

- ظاهرة تبدال : تأثير لتيعثر الضوء في جزيئات المادة الغروية أو في جزيئات المادة المُعلقة .
- المحلول الحقيقي ينفذ الضوء الساقط عليه لصغر قطر دقائقه المكونة له .
- الغروي (أو الغرواني) والمُعلق يُشتت الضوء الساقط عليهما لكبر قطر دقائقهما المكونة لهما .




الصياغ من الغرويات ، فهي تشتت الضوء الساقط عليه .

ثانياً : الأنظمة الغروية :-

- يتكون النظام الغروي من :
- ١) دقائق غروية تُعرف بالصنف المُنتشر .
- ٢) وسط تنتشر فيه الدقائق الغروية يُعرف بوسط الإنتشار .
- ٣) الصنف المُنتشر يُشبه المذاب في المحلول .
- ٤) وسط الإنتشار يُشبه المذيب في المحلول .



أمثلة على الأنظمة الغروية



نوع

الجدول التالي يوضح بعض الأنظمة الغروية وأمثلة عليها :-

نوع النظام الغروي	أمثلة
لا يوجد	الكريمة - فقاعات الصابون - زجاجة مشروبات غازية غير مُثلجة بعد فتحها ورجها - زلال البيض المخفوق "نظام غروي مكون من الهواء (غاز) في البيض (سائل) ويتم حقن البيض باستخدام مضرب كهربائي"
لا يوجد	حجر الخُف - الاسفنج - الفوم - حلوي الهلام المصنوعة من السكر "غزل البنات" (وهو عبارة عن الهواء (غاز) في السكر (صلب))
لا يوجد	رذاذ الأيروسولات "البخاخات"
لا يوجد	مُستحلب المايونيز - مُستحلب الزيت والخل
لا يوجد	جل الشعر - الجيلي - الجيلاتين - المراهم - الجبنَة

"لا يوجد نظام غروي غاز في غاز" لأن الغازات تمتزج إمتزاجاً تاماً ببعضها البعض (تجانس تام) مكونة مخاليط مُتجانسة (محاليل) وليست غرويات .





الغبار أو التراب في الهواء أو الدخان في الهواء



الدهانات
"نظام غروي مكون من مسحوق التلوين (صلب) في المذيب (سائل) - الدم - اللبن - النشا في الماء - الشامبو - مُنعم الشعر

"لا يوجد نظام غروي صلب في صلب" لأن المواد الصلبة تمتزج إمتزاجاً تاماً ببعضها البعض (تجانس تام) مكونة مخاليط مُتجانسة (محاليل) وليست غرويات.

لا يوجد



• طرق تحضير الغرويات :

① طريقة الإنتشار .

② طريقة التكتيف .

1 طريقة الإنتشار :

◀ طريقة يتم فيه تفتيت الدقائق كبيرة الحجم إلى دقائق بحجم الدقائق الغروي ، ومن ثم تُضاف إلى

وسط الإنتشار مع التقليب .

• من أمثلة الغرويات بطريقة الإنتشار :

① سحق النشأ وتفتيته بحجم الغروي


② وضعه في الماء

③ تقليب النشأ في الماء .

④ التسخين .

- يتكون نظام غروي (صلب في سائل) بطريقة الإنتشار .

- دقائق النشأ (الصنف المُنتشر) في الماء (وسط الإنتشار)



2. طريقة التكثيف (عكس طريقة الإنبثاق)

طريقة يتم فيها تجميع الدقائق صغيرة الحجم إلى دقائق بحجم دقائق الغروي وتُجرب عن طريق

أيًا من العمليات الآتية :

العملية الأولى : عملية التحلل المائي :- المحاليل الغروية لأكاسيد الفلزات وهيدروكسيدات

الفلزات (للإطلاع فقط)

العملية الثانية : عملية الأكسدة والاختزال « مثل : تفاعل محلول كبريتيد الهيدروجين مع غاز ثاني

أكسيد الكبريت »

من أمثلة الغرويات بطريقة التكثيف بعملية الأكسدة والاختزال :-

١ إضافة محلول كبريتيد الهيدروجين إلى غاز ثاني أكسيد الكبريت ،

٢ يتجمع الكبريت الغروي ،

٣ يتكون نظام غروي «تجميع ذرات الكبريت بحجم دقائق الغروي في الماء»

٤ ما حدث من أكسدة واختزال : أيون الكبريتيد السالب S^{2-} بمحلول كبريتيد الهيدروجين يحدث

له عملية أكسدة ويتحول إلى كبريت ذري ، أيون الكبريت الموجب S^{4+} بغاز ثاني أكسيد الكبريت

يحدث له عملية اختزال ويتحول إلى كبريت ذري ، تبعاً للمعادلة التالية :



يوجد عمليات أخرى كالتبادل المزدوج وكإستبدال المذيب ...

<p>مخلوط غير متجانس (يبدو متجانس ظاهرياً)</p> <p>مخلوط غير متجانس يتكون من الصنف المنتشر (كالنشا) ووسط الإشتار (الماء)</p> <p>المذيب (الماء)</p> <p>"تتوزع دقائقه بشكل منتظم لذا يكون متمائلاً"</p> <p>ومتجانساً تجانساً تاماً في تركيبه وخواصه</p>	<p>مخلوط غير متجانس يتكون من المذاب (الكسكس)</p> <p>ومتجانساً تجانساً تاماً في تركيبه وخواصه</p>
<p>مخلوط غير متجانس يتكون من مُعلق صلب في سائل</p> <p>أكبر من 1000 nm</p>	<p>يختلف شكله باختلاف تركيزه: فإذا كان:-</p> <p>مركزاً: يظهر شكله كالحليب أو كالسحب</p> <p>مُخففاً تخفيفاً شديداً: يظهر شكله رائقاً أو صافياً</p> <p>تتراوح ما بين (1 : 1000 nm)</p>
<p>يمكن تمييز الدقائق المكونة له بالعين المجردة أو بالمجهر</p>	<p>لا يمكن تمييز الدقائق المكونة له بالمجهر المجردة أو بالمجهر الإلكتروني فقط (الميكروسكوب) وليس بالعين المجردة</p> <p>نظراً لتجانس قائقه الشديد</p>
<p>يُشتت الضوء الساقط عليه</p>	<p>يُشتت الضوء الساقط عليه</p>
<p>تترسب سواء تم رجها أم لا</p>	<p>لا تترسب</p> <p>لا تترسب سواء تم رجها أم لا</p>
<p>يمكن فصلها (عن طريق فصل المعلق الصلب عن السائل)</p> <p>"حيثُ تحتجز ورقة الترشيح الدقائق الصلبة المعلقة في حين ينفذ الماء من خلالها"</p>	<p>لا يمكن فصلها</p>

- ملح الطعام في الكيروسين

- سكر المائدة في الكيروسين

- كلوريد الكوبلت II في الكيروسين

- الزيت في الماء

- الطباشير (الحجر الجيري) في الماء

(كربونات الكالسيوم في الماء)

- الرمل أو الطحون في الماء

- هيدروكسيد الماغنسيوم في الماء (لبن الماغنسيا)

الاستعمال

- المضادات الحيوية التي يلزم رجمها قبل

الاستعمال

- الأملاح الغير ذائبة في الماء (الرواسب في الماء)

- غاز (صف فنتش)

غاز: لا يوجد

سائل: الكريمة و زلال البيض المخفوق و فقاعات

الصابون وزجاجات المشروبات الغازية

صلب: حلوي الهلام و حجر الخف و الاسفنج

والفوم

- سائل (صف فنتش)

غاز: رذاذ الايروسولات

سائل: مستحلب المايونيز و مستحلب الزيت

والخل

صلب: جل الشعر والجيلي والجيلاتين والمراهم

الماء

- صلب (صف فنتش)

غاز: الغبار في الهواء أو التراب في الهواء

سائل: الدهانات والدم واللبن والنشأ في الماء

والشامبو و منعم الشعر

صلب: لا يوجد

- غاز (مذيب)

غاز: الهواء الجوي - الغاز الطبيعي

سائل: قطرات بخار الماء في الهواء

صلب: دقائق الغبار في الهواء

- سائل (مذيب)

غاز: المشروبات الغازية والأكسجين اللائب في

الماء

سائل: الكحول في الماء و الإيثيلين جليكول في

الماء

صلب: ملح الطعام في الماء و سكر المائدة والخل

في الماء و كلوريد الكوبلت II في الماء و أملاح

النترات في الماء و أملاح الصوديوم في الماء و

أملاح الأمونيوم في الماء و أملاح البيكربونات في

الماء


- صلب (مذيب)

غاز: الهيدروجين علي البلاستيك أو علي البلاديوم

سائل: مُلغم الفضة $Ag_{(s)} / Hg_{(l)}$

صلب: السبائك كالكروم والنيكل كروم


كيف يُمكن فصل خليط مكون من رمل وملح وماء؟



من طرق فصل المخاليط

١ الترشيح : عن طريق فصل المادة الصلبة الغير قابلة للذوبان في الماء باستخدام قمع وورقة الترشيح

« مثل فصل الرمل عن ملح الطعام باستخدام الماء كمذيب »



٢ التبخير أو التبلور : عن طريق تسخين المادة الصلبة المذابة في محلول

« مثل تسخين ملح الطعام المذاب في الماء حتي تمام تبخير الماء »



٣ التقطير البسيط : عن طريق تسخين وتكثيف المذيب من المحلول.

« مثل فصل الماء بالتبخير ثم تكثيف البخار الناتج »





استلثة تدريب علي خواص المحاليل والغرويات والمعلقات :

كل المخاليط الآتية تُعبر عن حالة وسط بين المحلول الحقيقي والمُعلق عدا

أ الزيت والخل .

ب الكيروسين والملح .

ج الدهانات .

د الدم .

١ قطر دقائق الزيت من المايونيز قد تساوي

أ 0.25nm

أ 0.5nm

ب 1200nm

ب 600nm

٢ الضباب الذي يُعرف بالشبورة نظام غروي

أ صلب في غاز .

أ غاز في سائل .

ب سائل في غاز .

ب غاز في غاز .

٣ ما المخروط الذي يُمكن فصله باستخدام ورقة الترشيح ؟

أ النحاس ومحلول مائي من كلوريد النحاس II

ب محلول مائي من كلوريد النحاس II وكلوريد الصوديوم .

ج الماء والكحول الإيثيلي .

د الإيثيلين جليكول والماء .

٤ وضع كيف يُمكنك فصل :

أ الزيت والماء .

ب السكر والملح والماء .

ج الرمل والماء .

الحناوي

الفصل الثاني

الأحماض والقواعد

أحمد

الحلقة

محتويات الفصل

1 استخدامات الأحماض والقواعد ونظريات تفسير الأحماض والقواعد

1
المقدمة

2 تصنيف الأحماض والقواعد وطرق تحضير الأملاح

2
المقدمة

إعداد : د/ أحمد الحناوي

استخدامات الأحماض والقواعد ونظريات تفسير الأحماض والقواعد

أولاً استخدامات الأحماض والقواعد

تمثل الأحماض والقواعد جزءاً كبيراً من حياة الإنسان مثلاً :

حيث تدخل الأحماض في صناعة :



- ١ الأسمدة .
- ٢ الأدوية .
- ٣ المتفجرات .
- ٤ البطاريات .
- ٥ البلاستيك .
- ٦ المشروبات الغازية .
- ٧ زبادي والجبن .

وحيث تدخل أيضاً القواعد في صناعة :



- ١ الصابون .
- ٢ الأدوية .
- ٣ الأصباغ .
- ٤ المنظفات الصناعية .

و الجدول التالي يوضح بعض المنتجات والأحماض أو القواعد الداخلة في تركيبها

الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية
حمض الهيدروكلوريك	HCl	النباتات الحامضية	
حمض الكبريتيك	H_2SO_4	(ليمون ، برتقال ، طماطم)	
حمض النيتريك	HNO_3	منتجات الألبان	
حمض الكبريتيك	H_2SO_4	(الجبن ، الزبادي)	
حمض الكبريتيك	H_2SO_4	المشروبات	
حمض الفوسفوريك	H_3PO_4	الغازية	
كربونات الصوديوم	Na_2CO_3	الصابون	
كربونات الصوديوم	Na_2CO_3	صودا الخبز	
كربونات الصوديوم	Na_2CO_3	صودا الغسيل	

القلويات	الأحماض
<p>لها طعم قابض (مر) - لملمسها صابوني</p> <p>تُزرق صبغة عباد الشمس تُزرق ورقة عباد الشمس الحمراء المُبللة بالماء</p> 	<p>لها طعم لاذع</p> <p>تُحمر صبغة عباد الشمس تُحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء المُبللة بالماء</p> 

١. مع القواعد و يعطي ملحاً و ماء .
٢. مع الفلزات النشطة و يتصاعد
الهيدروجين H_2 الذي يشتعل بفرقة
عند تقريب شظية مُشتعلة إليه
٣. مع أملاح الكربونات أو البيكربونات
ويحدث فوران و يتصاعد غاز ثاني أكسيد
الكربون الذي يُعكر ماء الجير الراق
 $Ca(OH)_2$ هيدروكسيد الكالسيوم .

مع الأحماض و تعطي ملحاً و ماء .



المعادلات التالية توضح التفاعلات الكيميائية للأحماض والقواعد :-


تفاعل محلول حمض النيتريك مع محلول هيدروكسيد الصوديوم لتكوين محلول ملح نترات الصوديوم والماء.



تفاعل محلول حمض الهيدروكلوريك مع فلز الخارصين لتكوين محلول كلوريد الخارصين وماء



تفاعل محلول حمض الكبريتيك مع محلول كربونات الصوديوم لتكوين محلول كبريتات الصوديوم وماء وغاز ثاني أكسيد الكربون الذي يُعكّر ماء الجير الرائق



تعريف الأحماض والقواعد



التعريف التجريبي (التنفيذي)

التعريف التجريبي (التنفيذي) يعتمد على الخواص الظاهرية لكل من للأحماض و القواعد ، ولكنه تعريف قاصر حيث يقوم على الملاحظة و لا يصف أو يفسر الخواص غير المرئية التي أتت بهذا السلوك .

عالم التعريف التجريبي للأحماض و القواعد يعتبر تعريف قاصراً ؟

لأنه يقوم على الملاحظة و لا يصف أو يفسر الخواص غير المرئية التي أتت بهذا السلوك .

< والتعريف الأكثر شمولاً يأتي من خلال الدراسات والتجارب والتي وضعت في صورة نظريات يعطي العلماء


فرصة للتنبؤ بسلوك هذه المواد كالتالي :

١) نظرية أرهينيوس .

٢) نظرية برونشتد - لوري .

٣) نظرية لويس .

نظرية أرهينيوس



لاحظ أرهينيوس أن المحاليل المائية للأحماض والقواعد توصل التيار الكهربائي فاستنتج أنها تذوب (تتأين أو تتفكك) في الماء، ويتضح ذلك في:


1 ذوبان كلوريد الهيدروجين.

2 ذوبان هيدروكسيد الصوديوم.

كما وضعنا سابقاً الفرق بين التفكك والتأين " فالمركبات الأيونية **تتفكك** عند ذوبانها في الماء (ككلوريد الصوديوم في الماء) والمركبات التساهمية **تتأين** عند ذوبانها في الماء (ككلوريد الهيدروجين في الماء "تأين تام" وحمض الخليك "تأين ضعيف")

3 ذوبان كلوريد الهيدروجين (حمض الهيدروكلوريك) :

عند ذوبان غاز كلوريد الهيدروجين (HCl) في الماء فإنه يتأين إلى أيونات الهيدروجين الموجبة H⁺ و أيونات الكلوريد السالبة Cl⁻




وبذلك تمكن من وضع تعريف للحمض كما يلي :

حمض أرهينيوس مادة تذوب في الماء و تعطي أيوناً أو أكثر من أيونات

الهيدروجين الموجبة H⁺ أو أيونات الهيدرونيوم H₃O⁺

عند ذوبان هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) في الماء فإنه يتفكك

مكوناً أيونات الصوديوم الموجبة Na⁺ و أيونات الهيدروكسيد السالبة OH⁻



◀ وبذلك تمكن من وضع تعريف للقاعدة كما يلي :

◀ قاعدة أرهينيوس : مادة تذوب في الماء و تعطي أيوناً أو أكثر من أيونات الهيدروكسيد السالبة OH^-




• ويتضح من نظرية أرهينيوس أن

- يحتوي على مصدر لـ H^+
- يعمل على زيادة تركيز الـ H^+ في المحاليل المائية .
- يحتوي على مصدر لـ OH^-
- تعمل على زيادة تركيز الـ OH^- في المحاليل المائية .



أي من المواد الآتية حمض أرهينيوس وأيها قاعدة أرهينيوس؟ مع التفسير .




◀ وبناء علي ما سبق : قام أرهينيوس بتفسير تفاعلات التعادل (حمض + قاعدة = ملح + ماء)

« يُعرف تفاعل الأحماض مع القواعد لتكوين الملح والماء بإسم التعادل »

◀ مثال : تفاعل محلول حمض الهيدروكلوريك مع محلول هيدروكسيد الصوديوم لتكوين محلول كلوريد الصوديوم

والماء ، تبعاً للمعادلة الآتية :



و عند إيجاد المعادلة الأيونية النهائية لهذا التفاعل ، نجد أن : $H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \longrightarrow H_2O_{(L)}$

تساعد نظرية أرهينيوس في تفسير ما يحدث في تفاعل التعادل ..

١ الحمض يحتوي على أيون الهيدروجين الموجب .

٢ القاعدة تحتوي على أيون الهيدروكسيد السالب .

٣ عند اتحاد الحمض مع القاعدة يتحد أيون الهيدروجين الموجب من الحمض مع أيون الهيدروكسيد السالب من القاعدة لتكوين الماء حسب المعادلة التالية :



٤ وبالتالي يكون الماء ناتجاً أساسياً عند تعادل الحمض مع القاعدة .


و رغم جهود أرهينيوس إلا أن نظريته تُعتبر قاصرة ! لأنها لم تستطع تفسير :

١ حامضية بعض المركبات مثل : ثاني أكسيد الكربون CO_2 وثاني أكسيد الكبريت SO_2 وثالث أكسيد الكبريت

SO_3 وثاني أكسيد النيتروجين NO_2 .. وهي لا تحتوي على أيون H^+

٢ قاعدية بعض المركبات مثل : النشادر NH_3 والفوسفين PH_3 .. وهي لا تحتوي على أيون OH^-

أيا من المواد الآتية تمثل قاعدة أرهينيوس ؟



نظرية برونشتد - لوري



وضع العالمان برونشتد و لوري تصوراً آخر لمفهوم الحمض و القاعدة ، حيث استطاعا تفسير حامضية و قاعدية المواد التي فشل أرهينيوس في تفسيرها ، وهي كالتالي :

١ حمض برونشتد - لوري : مادة تفقد (تمنح) بروتوناً H^+ لمادة أخرى .

٢ قاعدة برونشتد - لوري : مادة تستقبل بروتوناً H^+ من مادة أخرى .

الخطأ

١ حمض برونشتد - لوري يشبه حمض أرهينيوس في احتوائه على H في تركيبه .

٢ اتحاد الحمض و القاعدة : هو عبارة عن انتقال البروتون من الحمض إلى القاعدة .

٣ عندما يفقد (يمنح) الحمض بروتوناً يتحول إلى قاعدة تعرف بـ (القاعدة المرافقة) .

و القاعدة المرافقة : المادة الناتجة بعدما يفقد الحمض بروتوناً H^+ .

٤ عندما تكتسب القاعدة هذا البروتون تتحول إلى حمض يعرف بـ (الحمض المرافق)

الحمض المرافق : المادة الناتجة عن اكتساب القاعدة بروتوناً H^+ .



(B) : حمض لأنه مانح البروتون H^+

(HA) : قاعدة لأنه مُستقبل البروتون H^+


(HB⁺) : حمض مُرافق .

(A⁻) : قاعدة مُرافقة .



تطبيقات على نظرية برونستيد-لوري

① عند إذابة حمض (HCl) في الماء :



١ يعتبر (HCl) حمضاً لأنه منح بروتوناً إلى الماء .


٢ يعتبر الماء قاعدة لأنه يكتسب هذا البروتون .

٣ يصبح أيون الكلوريد (Cl⁻) قاعدة مرافقة .



٤ يصبح أيون الهيدرونيوم

(H₃O⁺) حمض مرافق .



② عند إذابة النشادر (NH₃) في الماء :




١ يعتبر الماء حمضاً لأنه منح بروتوناً إلى النشادر (NH₃) .

٢ يعتبر النشادر (NH₃) قاعدة لأنه يكتسب هذا البروتون .

٣ يصبح أيون الهيدروكسيد (OH⁻) قاعدة مرافقة .

٤ يصبح أيون الأمونيوم

(NH₄⁺) حمض مرافق .



تطبيقات على نظرية برنستد-لوري

٣ عند ذوبان غاز فلوريد الهيدروجين (HF) في الماء :




١ يعتبر فلوريد الهيدروجين حمضاً لأنه منح بروتوناً إلى الماء .

٢ يعتبر الماء قاعدة لأنه يكتسب هذا البروتون .

٣ يصبح أيون الفلوريد (F⁻) قاعدة مرافقة .

٤ يصبح أيون الهيدرونيوم (H₃O⁺) حمض مرافق .



٤ عند ذوبان غاز حمض الخليك (CH₃COOH) في الماء :




١ يعتبر CH₃COOH حمضاً لأنه منح بروتوناً إلى الماء .

٢ يعتبر الماء قاعدة لأنه يكتسب هذا البروتون .

٣ يصبح أيون الخلات (CH₃COO⁻) قاعدة مرافقة .

٤ يصبح أيون الهيدرونيوم (H₃O⁺) حمض مرافق .



الجدول التالي يوضح بعض الأمثلة من الأحماض والقواعد على الطريقة برنستيد


حمض	قاعدة	محلول	محلول
HCl	+ H ₂ O	→	Cl ⁻ + H ₃ O ⁺
HNO ₃	+ H ₂ SO ₄	→	NO ₃ ⁻ + H ₂ SO ₄
HClO ₄	+ H ₂ O	→	ClO ₄ ⁻ + H ₃ O ⁺
HNO ₃	+ H ₂ O	→	NO ₃ ⁻ + H ₃ O ⁺
CH ₃ COOH	+ H ₂ O	⇌	CH ₃ COO ⁻ + H ₃ O ⁺
H ₂ O	+ NH ₃	⇌	OH ⁻ + NH ₄ ⁺
NH ₄ ⁺	+ H ₂ O	⇌	NH ₃ + H ₃ O ⁺
HF	+ H ₂ O	⇌	F ⁻ + H ₃ O ⁺

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن القاعدة المرافقة هي صيغة الحمض ناقصاً منها H⁺ ، بينما الحمض المرافق هو صيغة القاعدة مضافاً إليه H⁺

وبالتالي فإن أي تفاعل يشتمل على إنتقال H⁺ من حمض إلى قاعدة يتألف من زوجين مترافقين ما بين حمض وقاعدة .

لاحظ أنه عندما يذوب HF في الماء ؛ فإن الماء يسلك سلوك القاعدة ، بينما عندما يذوب الأمونيا NH₃ في الماء ؛ فإن الماء يسلك سلوك الحمض .

لذا الماء يسلك سلوك الحمض أو القاعدة بحسب طبيعة المواد المذابة في المحلول ، ويُسمى الماء والمواد الأخرى التي تستطيع أن تسلك سلوك الأحماض والقواعد مواد مُترددة (أمفوتيرية) Amphoteric



أهمية النظرية برونستيد - لوري

يمكن من خلال هذه النظرية تفسير الأحماض والقواعد التي تحتوي على أيونات الهيدروجين و الهيدروكسيد ، ويمكن لهذه النظرية تفسير أيضاً القواعد التي لا تحتوي على أيونات OH^- كالأمونيا NH_3 وكالأيونات HS^- أو CO_3^{2-} ، وكذلك لا يشترط توافر الوسط المائي ، وأيضاً يمكن تعريف الخواص الحامضية والقاعدية للأملاح بعد تفككها في الماء .


أنواع الحمض برونستيد - لوري

- ① حمض يحتوي على الهيدروجين ، مثل : $HCl, HCN, HF, H_2CO_3, CH_3COOH$
- ② أيوناً موجباً ، مثل : H_3S^+, NH_4^+, H_3O^+
- ③ أيوناً سالباً يحتوي على هيدروجين ، مثل : HCO_3^-, HSO_4^-, HS^-

أنواع القاعدة برونستيد - لوري

- ① قاعدة تحتوي على الهيدروكسيد ، مثل : $NaOH, KOH, Ca(OH)_2$
- ② جزيئاً متعادلاً ، مثل : $NH_3, CH_3NH_2, N_2H_4, C_6H_5NH_2$
- ③ أيوناً سالباً ، مثل : $CH_3COO^-, HSO_4^-, CO_3^{2-}, OH^-, HS^-, S^{2-}$

مثال حدد الأزواج المترافقة من الحمض والقاعدة في التفاعلات الآتية :



نظرية لويس




- وضع لويس نظرية أكثر شمولاً لتعريف الحمض والقاعدة تعتمد على المشاركة بزوج من الإلكترونات الحرة بدلاً من انتقال البروتونات .
- حمض لويس** : مادة تستقبل زوج أو أكثر من الإلكترونات.
- قاعدة لويس** : مادة تمنح زوج أو أكثر من الإلكترونات .



قاعدة لويس
مانح لزوج من
الإلكترونات



حمض لويس
مستقبل لزوج من
الإلكترونات




- عند اتحاد أيون الهيدروجين (H^+) مع أيون الفلوريد (F^-) ، يعتبر (H^+) حمض لويس بينما أيون (F^-) قاعدة لويس ويتضح ذلك في الشكل التالي :



- أيون الفلوريد السالب (F^-) قاعدة ؟ لأنه يمنح زوج من الإلكترونات الحرة لأيون الهيدروجين الموجب H^+
- أيون الهيدروجين الموجب (H^+) حمض ؟ لأنه يستقبل الزوج الحر من الإلكترونات القادم من أيون الفلوريد السالب F^-

◀ توضيح أيون الفلوريد السالب F^- :-




إلكترون





◀ « ذرة الفلور بها $9e^-$ تميل لإكتساب $1e^-$ لتصل لحالة التشبع ($10e^-$) وتتحول من ذرة فلور إلي أيون فلوريد سالب »

◀ تفسير ذوبان النشادر NH_3 في الماء حسب نظرية لويس :



◀ ويُلاحظ أن غاز النشادر يمنح زوج إلكتروناته الحر للماء، إذن غاز النشادر قاعدة، والماء يستقبل زوج الإلكترونات، إذن الماء حمض .

◀ تفسير تفاعل الأمونيا مع فلوريد البورون (BF_3) :-



أحماض لويس - مثال

① جميع أحماض برونشتد - لوري وأحماض أرهينيوس : HF , HBr , HClO_4

② جزيئات متعادلة تحتوي علي ذرة لم تصل غلي حالة الاستقرار : BF_3 , AlCl_3

③ أيونات موجبة :

$[\text{Al}^{3+}, \text{Fe}^{3+}, \text{K}^+, \text{Cu}^{2+}, \text{Ag}^+, \text{Co}^{2+}, \text{Ni}^{2+}, \text{Cr}^{3+}, \text{Mn}^{2+}, \text{Zn}^{2+}, \text{Ag}^+, \text{Au}^{3+}, \text{Pb}^{2+}]$

④ أيون الهيدروجين الموجب H^+

⑤ جزيء به رابطة ثنائية أو الأكاسيد اللافلزية : CO_2 , SO_3 , CO , SO_2 , NO_3 , NO_2 , NO

⑥ كل المركبات التي تحتوي علي البورون والبريليوم :

$[\text{B}(\text{OH})_3, \text{BF}_3, \text{BCl}_3, \text{BeH}_2, \text{BeCl}_2, \text{Be}(\text{OH})_2, \text{BeBr}_2]$

« بشكل عام حمض لويس هو عبارة عن كاتيون موجب أو جزيء متعادل به ذرة لم تصل لحالة الاستقرار »

أنواع لويس مثل

١ قواعد برونشتد - لوري وقواعد أرهينيوس : NaOH , KOH , Ca(OH)_2

٢ جزيئات متعادلة مُعطية إلكترونات : NH_3 , PH_3 , H_2O , OF_2

٣ أيونات سالبة : SO_4^{2-} , NO_3^- , HS^- , CN^- , Br^- , I^- , O^{2-}

٤ أكاسيد فلزية : Na_2O , BaO , CaO

٥ مركبات عنصر النيتروجين والفوسفور :


$[\text{PH}_3, \text{PCl}_3, \text{PF}_3, \text{PBr}_3], [\text{NH}_3, \text{NCl}_3, \text{NF}_3, \text{N}_2\text{H}_4, \text{CH}_3\text{NH}_2]$

٦ أيون الهيدريد السالب H^- أكثر قاعدية من أيون الهيدروكسيد السالب OH^-

يوجد مواد تسلك كحمض أو كقاعدة ، مثل : الماء و OH^- و HSO_4^- و H_2PO_4^-



تفاعلات توضيحية :



لإطلاع فقط :



تحذير علي السريع

١ أيا من المركبات الآتية حمض لويس وأيا منها قاعدة :



٢ أيا من المركبات الآتية يمثل حمض لويس ؟



٣ أيا من المركبات الآتية يمثل قاعدة لويس ؟




٤ رغم أن النشادر لا يحتوي علي أيونات الهيدروكسيد السالبة (OH^-) إلا أنه قاعدة ؟

٥ وذلك نظراً لنظرية برونشتيد - لوري فإنه يستقبل بروتون من مادة أخرى متفاعلة معه (كالماء) .

ونظراً لنظرية لويس فإنه يمنح زوج من الإلكترونات الحرة للمادة الأخرى الداخلة معه في التفاعل (كالماء) .

الحناوي



المادة التي تذوب في الماء وتُعطي أيوناً أو أكثر من أيونات الهيدروجين الموجبة H^+ أكثر من أيونات الهيدروكسيد السالبة OH^-



المادة التي تمنح بروتوناً H^+ للمادة الأخرى المادة التي تستقبل بروتوناً H^+ من المادة الأخرى




المادة التي تستقبل زوجاً أو أكثر من الإلكترونات الحرة من المادة التي تمنح زوجاً أو أكثر من الإلكترونات الحرة لمادة أخرى






استئلة تدريبيه على النظريات :


١) الحمض المرافق والقاعدة المرافقة لأيون البكبريتات




٢) يعتبر قاعدة مرافقة للماء .



٣) أيًا مما يلي يمثل زوج من قاعدة مرافقة وحمض ؟




٤) أي من الأنواع الآتية لا يمكن أن يكون بمثابة قاعدة لويس ؟



٥) في المعادلة الآتية :



- تصنف المتفاعلات والنواتج من اليسار إلى اليمين كالتالي :



٦) استنتج الحمض المرافق والقاعدة المرافقة حسب نظرية برونشتد - لوري في معادلة ذوبان حمض

الخليك في الماء ؟

٧) حدد الحمض المرافق والقاعدة المرافقة في المعادلة الآتية :



٨) كيف تميز بين حمض الزبادي (حمض اللاكتيك) والصابون ؟

٩) في معادلة تفاعل الأمونيا مع غاز كلوريد الهيدروجين في ضوء نظرية لويس وضع الحمض والقاعدة .

١٠) حدد الحمض والقاعدة من المركبات الآتية :-



تصنيف الأحماض والقواعد وطرق تحضير الأملاح

تصنيف الأحماض :

تصنيف الأحماض حسب :

٣ عدد قاعديتها .

٢ مصدرها (نشأتها) .

١ درجة تأينها .


تصنيف الأحماض حسب درجة تأينها

أحماض قوية	أحماض متوسطة	أحماض ضعيفة
<p>أحماض تامة التآين .. تتأين كل جزيئتها في المحلول .. ومحاليلها موصلة قوية للكهرباء لإحتوائها على وفرة من الأيونات</p> <p>قوية</p> <p>HClO₄ بيروكلوريك H₂SO₄ كبريتيك HBr هيدروبروميك HI هيدرويوديك</p>	<p>أحماض غير تامة التآين في محاليلها موصلة قوية للكهرباء .. تتأين جزئياً</p> <p>متوسطة</p> <p>HNO₃ نيتريك H₂CO₃ كربونيك H₃PO₄ فوسفوريك HCl هيدروكلوريك</p>	<p>أحماض غير تامة التآين .. يتأين جزءاً ضئيلاً من جزيئتها إلى أيونات .. محاليلها موصلة ضعيفة للكهرباء</p> <p>ضعيفة</p> <p>C₃H₆O₃ اللاكتيك CH₃COOH الأسيتيك</p>

الشكل التخطيطي للحمض القوي (مثل : حمض الهيدروكلوريك) :-




الشكل التخطيطي للحمض الضعيف (مثل : حمض الهيدروفلوريك) :-



أسئلة هامة

- ١ حمض النيتريك موصل جيد للتيار الكهربائي ، بينما حمض الفوسفوريك ضعيف التوصيل الكهربائي ؟
☒ لأن حمض النيتريك تام التأين ، بينما حمض الفوسفوريك غير تام التأين .
- ٢ يعتبر الحمض القوي من الإلكتروليتات القوية ؟
☒ لأن جميع جزيئاته تتأين في الماء إلى أيونات مكونة محلول جيد التوصيل.
- ٣ يعتبر الحمض الضعيف من الإلكتروليتات الضعيفة ؟
☒ لأن جميع جزء ضئيل من جزيئاته يتأين في الماء إلى أيونات مكونة محلول رديء التوصيل للكهرباء .



٤ تبعاً للشكل : وضع :-

١- الحمض الضعيف

- a ☒
- b ☒
- c ☒
- d ☒

٢- الحمض الضعيف جداً

- a ☒

٣- الحمض القوي

- a ☒

2 تصنيف الأحماض حسب مصدرها

أحماض غير عضوية	أحماض عضوية						
أحماض يدخل في تركيبها عناصر لافلززية غالباً ك: الكلور/ الكبريت / النيتروجين / الفوسفور وغيرها وليست من أصل عضوي كلها أحماض ضعيفة	أحماض ضعيفة من أصل عضوي .. تستخلص من أعضاء الكائنات الحية (نبات أو حيوان) تتميز بإحتوائها على مجموعة الكربوكسيل (-COOH) بعضها قوية وبعضها ضعيفة						
HNO_3 H_2SO_4 H_2CO_3 HCl	<table><tr><td>$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ بروبانويك</td><td>$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$ ستريك</td><td>$\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$ أوكساليك</td></tr><tr><td>$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ لاكتيك</td><td>CH_3COOH أستتيك</td><td>HCOOH فورميك</td></tr></table>	$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ بروبانويك	$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$ ستريك	$\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$ أوكساليك	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ لاكتيك	CH_3COOH أستتيك	HCOOH فورميك
$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ بروبانويك	$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$ ستريك	$\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$ أوكساليك					
$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ لاكتيك	CH_3COOH أستتيك	HCOOH فورميك					

أحمد الحناوي

3 تصنيف الأحماض حسب قاعدتها

← قاعدة الحمض : عدد ذرات الهيدروجين البدول التي يتفاعل الحمض عن طريقها

أحماض أحادية القاعدية (أحادي البروتون)	أحماض ثنائية القاعدية (ثنائي البروتون)	أحماض ثلاثية القاعدية (ثلاثي البروتون)
أحماض تفقد الجزيء منها عند ذوبانه في الماء بروتوناً واحداً H^+ .	أحماض يفقد الجزيء منها عند ذوبانه في الماء بروتوناً واحداً أو اثنين .	أحماض يفقد الجزيء منها عند ذوبانه في الماء بروتوناً واحداً أو اثنين أو ثلاثة .
أحماض عضوية أحادية	أحماض عضوية ثنائية	أحماض عضوية ثلاثية
① الفورميك $HCOOH$	حمض الأكساليك	حمض الستريك
② الأسيتيك CH_3COOH	$\begin{array}{c} COOH \\ \\ COOH \end{array}$	$\begin{array}{c} H \\ \\ H-C-COOH \\ \\ HO-C-COOH \\ \\ H-C-COOH \\ \\ H \end{array}$
أحماض معدنية أحادية	أحماض معدنية ثنائية	أحماض معدنية ثلاثية
① الهيدروكلوريك HCl	① الكبريتيك H_2SO_4	① الفوسفوريك H_3PO_4
② النيتريك HNO_3	② الكربونيك H_2CO_3	

← لا توجد علاقة بين قوة الحمض وعدد ذرات الهيدروجين في تركيبه الجزيئي

فحمض الفوسفوريك H_3PO_4 يحتوي الجزيء منه على ثلاث ذرات هيدروجين ، ومع ذلك فهو أضعف من حمض النيتريك HNO_3 الذي يحتوي على ذرة هيدروجين واحدة .



أسئلة هامة

- ① يتفق حمض الستريك مع حمض الفوسفوريك في عدد القاعدية ، بينما يختلف عنه في طبيعة المنشأ؟
❌ لأن كلاهما ثلاثي القاعدية ولكن الستريك حمض عضوي ، بينما الفوسفوريك حمض معدني .
- ② حمض الأسيتيك أحادي القاعدية (أحادي البروتون) رغم احتوائه على 4 ذرات هيدروجين ؟
❌ لأنه عندما يتأين في الماء يعطي بروتون واحد .
- ③ لحمض H_2SO_4 ملحان ؟
❌ لأنه يعطي عند ذوبانه في الماء بروتوناً واحداً أو اثنين .



أسئلة هامة

- ٤ حمض الستريك ثلاثي القاعدية ؟
لأنه يعطي عند ذوبانه في الماء بروتوناً واحداً أو اثنين أو ثلاثة .
- ٥ لحمض الفوسفوريك ثلاث أملاح ؟
لأنه يعطي عند ذوبانه في الماء بروتوناً واحداً أو اثنين أو ثلاثة .
- ٦ ما وجه الشبه والاختلاف بين :
حمض البوريك (H_3BO_3) وحمض الستريك .
حمض البنزنويك (C_6H_5COOH) وحمض الهيدروسيانيك (HCN) .
حمض الكبريتوز (H_2SO_3) وحمض المالونيك [$CH_2(COOH)_2$]

تصنيف القواعد :

١ درجة تأينها .

٢ تصنيف القواعد حسب :


تصنيف القواعد حسب درجة تأينها

القواعد غير تامة التآين في الماء .	القواعد تامة التآين في الماء .
١ هيدروكسيد أمونيوم NH_4OH	١ هيدروكسيد بوتاسيوم KOH
	٢ هيدروكسيد صوديوم $NaOH$
	٣ هيدروكسيد باريوم $Ba(OH)_2$


الشكل التخطيطي للقاعدة القوية (مثل : هيدروكسيد الصوديوم) :



تأين تام



الشكل التخطيطي للقاعدة الضعيفة (مثل : هيدروكسيد الأمونيوم) :-



2 تصنيف القواعد حسب تركيبها الجزيئي

تفاعل بعض المواد مع الأحماض مكونة ملح و ماء لذا تعتبر هذه المواد قواعد .

1 أكاسيد الفلزات :

أكسيد حديد II أكسيد رصاص II أكسيد كالسيوم أكسيد ماغنسيوم أكسيد صوديوم أكسيد بوتاسيوم


تفاعل أكسيد حديد II مع حمض الهيدروكلوريك ينتج عنه كلوريد حديد II و ماء



2 هيدروكسيدات الفلزات :

هيدروكسيد باريوم هيدروكسيد كالسيوم هيدروكسيد ماغنسيوم هيدروكسيد صوديوم هيدروكسيد بوتاسيوم

تفاعل هيدروكسيد كالسيوم مع حمض الكبريتيك ينتج عنه كبريتات كالسيوم و ماء



3 كربونات أو بيكربونات الفلزات :

بيكربونات صوديوم بيكربونات بوتاسيوم كربونات صوديوم كربونات بوتاسيوم

تفاعل كربونات بوتاسيوم مع حمض الهيدروكلوريك ينتج عنه كلوريد بوتاسيوم و ماء و ثاني أكسيد الكربون .



تفاعل بيكربونات البوتاسيوم مع حمض الهيدروكلوريك ينتج عنه كلوريد بوتاسيوم و ماء و ثاني أكسيد الكربون .



تفاعل الحمض مع أملاح الكربونات

تفاعل الحمض مع أملاح الكربونات أو أملاح البيكربونات وينتج ملح و ماء مع تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يُعكّر ماء الجير الرائق (Ca(OH)₂) عند إمراره فيه لفترة قصيرة .

3 تصنيف القواعد من حيث الذوبان في الماء

و تنقسم إلى : ⁺ قواعد تذوب (قلويات) . ^٢ قواعد لا تذوب .

القلويات قواعد تذوب في الماء وتعطي أيون الهيدروكسيد OH⁻ .

و هذا يعني أن :

١ القلويات جزء من القواعد

٢ فكل القلويات قواعد و ليس كل القواعد قلويات

و تعتبر أكاسيد الحديد قواعد ولا تعتبر قلويات ،

١ تعتبر قواعد حيث ينتج عن تفاعلها مع الأحماض ملح و ماء

٢ لا تعتبر قلويات لأنها لا تذوب في الماء

القواعد

[FeO , MgO , PbO]

القلويات

[NaOH , KOH , Ba(OH)₂]

أسئلة هامة

١ تعتبر القاعدة القوية من الإلكتروليتات القوية ؟

ج لأن جميع جزيئاتها تتفك في الماء إلى أيونات مكونة محلول جيد التوصيل للكهرباء .

٢ يعتبر الحمض الضعيف من الإلكتروليتات الضعيفة ؟

ج لأن جميع جزء ضئيل من جزيئاته يتفك في الماء إلى أيونات مكونة محلول رديء التوصيل للكهرباء .

٣ تعتبر كربونات الصوديوم من القواعد ؟

ج لأنها تتفاعل مع الأحماض مكونة ملح و ماء .

٤ لا تعتبر كل القواعد قلويات ؟

ج لأن هناك قواعد لا تذوب في الماء

- توجد عدة طرق للتعرف على نوع المحلول ما إذا كان حمضياً او قلوياً او متعادلاً ومنها :

- ١) الأدلة (الكواشف) .
- ٢) الرقم الهيدروجيني PH .

١) الأدلة (الكواشف)

١) مواد كيميائية يتغير لونها بتغير نوع المحلول .

٢) أحماض أو قواعد ضعيفة يتغير لونها بتغير نوع المحلول.

والسبب في ذلك هو اختلاف لون الدليل المتأين عن لون الدليل غير المتأين

أهمية الأدلة :

١) التعرف على نوع المحلول .

٢) أثناء عملية المعايرة بين الحمض والقاعدة .

امثلة لبعض الأدلة

في الوسط الحمضي PH < 7	في الوسط القاعدي PH > 7	في الوسط المتعادل PH = 7
أحمر	أصفر	برتقالي
عديم اللون	أحمر وردي	عديم اللون
أحمر	أزرق	بنفسجي
أصفر	أزرق	أخضر

٣) لا يستخدم دليل الفينولفثالين في الكشف عن الأحماض

لأنه عديم اللون في الوسط الحامضي .

٤) لا يستخدم محلول قاعدي ك (NaOH) في التمييز بين عباد الشمس و أزرق برمو ثيمول

لأنه يعطي اللون الأزرق مع كلاهما .

٥) لا يستخدم محلول حامضي ك (HCl) في التمييز بين عباد الشمس و الميثيل برتقالي

لأنه يعطي اللون الأزرق مع كلاهما .

2 الرقم الهيدروجيني PH

الرقم الهيدروجيني PH :

1 قياس يحدد تركيز أيونات الهيدروجين H^+ في المحاليل ، لتحديد نوعها [حامضية أو قاعدية أو متعادلة] .


2 أسلوب للتعبير عن درجة الحموضة او القاعدية للمحاليل بأرقام من 0 إلى 14

3 قد يستخدم في قياس الرقم الهيدروجيني جهاز رقمي أو شريط ورقي




جميع المحاليل المائية تحتوي على أيوني الهيدروجين H^+ و الهيدروكسيل OH^- وتعتمد قيمة pH على تركيز كل منهما :


1 إذا كان تركيز $H^+ < OH^-$ يكون المحلول حمضي وتكون قيمة pH أقل من 7



2 إذا كان تركيز $H^+ > OH^-$ يكون المحلول قاعدي وتكون قيمة pH أكبر من 7



٣ إذا كان تركيز $\text{OH}^- = \text{H}^+$ يكون المحلول متعادل وتكون قيمة $\text{pH} = 7$.



شكل يوضح العلاقة بين تركيز أيون H^+ وقيمة pH للمحلول





العلاقة بين pH (الأس الهيدروجيني) و pOH (الأس الهيدروكسي) و H_3O^+ و OH^-


$$pH \propto [OH^-] \propto \frac{1}{pOH} \propto \frac{1}{[H_3O^+]}$$

كلما زاد تركيز H_3O^+ كلما زادت قيمة الأس الهيدروكسي pOH وقل تركيز OH^- وقلت قيمة الأس الهيدروجيني pH «زادت الحامضية وقلت القاعدية»

كلما زاد تركيز OH^- كلما زادت قيمة الأس الهيدروجيني pH وقل تركيز H_3O^+ وقلت قيمة الأس الهيدروكسي pOH «زادت القاعدية وقلت الحامضية»



العلاقة البيانية بين الـ pH و الـ pOH :



- العلاقة البيانية بين الـ $[H_3O^+]$ و الـ $[OH^-]$:


pH




بطارية حامضية
(حمض قوي جداً)




المعدة حمضية
(حمض قوي جداً)




الليمون
(حمض متوسط)



الحل
(حمض متوسط)



الطماطم
(حمض متوسط)



الموز
(حمض ضعيف)




اللب
(حمض ضعيف)




الماء النقي
(متعاد)



البيك
(قاعدة ضعيفة)



صودا الخبز
(قاعدة متوسطة)



لبن الماعسيا
(قاعدة متوسطة)



الأمونيا ومنتجات التنظيف
(قاعدة متوسطة)



فليس منزلي
(قاعدة قوية)



منظف أفران
(قاعدة قوية جداً)



منظف لمصارف المياه
(قاعدة قوية جداً)



ويعتبر الخل وعصير الليمون وعصير الطماطم من المواد الحمضية ($pH < 7$) بينما معجون الأسنان والمُنظفات الصناعية و بياض البيض «الزُّلال» وصودا الخبيز مواد قاعدية ($pH > 7$) ، والماء النقي مادة مُتعادلة ($pH = 7$)

التمرين (اختر الإجابة الصحيحة)

١. تزداد حامضية المحلول كلما (قلت- زادت) قيمة P_H
٢. تزداد حامضية المحلول كلما (قلت- زادت) قيمة P_{OH}
٣. تزداد قاعدية المحلول كلما (قلت- زادت) قيمة P_H
٤. تزداد قاعدية المحلول كلما (قلت- زادت) قيمة P_{OH}
٥. تقل حامضية المحلول كلما (قلت- زادت) قيمة P_H
٦. تقل حامضية المحلول كلما (قلت- زادت) قيمة P_{OH}
٧. تقل قاعدية المحلول كلما (قلت- زادت) قيمة P_H
٨. تقل قاعدية المحلول كلما (قلت- زادت) قيمة P_{OH}

الأملاح

◀ الأملاح من المواد الكيميائية التي تتواجد بكثرة في القشرة الأرضية أو توجد ذائبة في ماء البحر أو قد تكون



مُترسبة .

• طرق تحضير الأملاح

- ١) تفاعل الفلز مع الحمض المُخفف
- ٢) تفاعل أكسيد الفلز مع الحمض المُخفف « يُسمى بتفاعل التعادل »
- ٣) تفاعل هيدروكسيد الفلز مع الحمض المُخفف « تفاعل التعادل »
- ٤) تفاعل كربونات الفلز أو بيكربونات الفلز مع الحمض المُخفف « كشف الحمضية »

• أولاً : تفاعل الفلز مع الحمض المُخفف (نوع التفاعل : إحلل بسيط)

◀ الفلزات التي تسبق الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي تحل محله في محاليل الأحماض المخففة ويتصاعد الهيدروجين الذي يشتعل بفرقة عند تقريب شظية مشتعلة اليه ويتبقى الملح ذائباً في الماء « ويمكن فصل الملح الناتج بتسخين المحلول فيتبخر الماء و يتبقى الملح »

◀ **المعادلة العامة لفظياً :-** فلز نشط + حمض —————> ملح الحمض + غاز الهيدروجين .



◀ تفاعل قطعة من الخارصين مع حمض الكبريتيك المُخفف لتكوين محلول ملح كبريتات الخارصين وغاز الهيدروجين .



◀ ما ناتج تفاعل الألومنيوم مع حمض النيتريك المُخفف ؟



◀ هل النحاس يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك ؟

ثانياً

تفاعل أكسيد فلز مع الحمض المخفف (تفاعل التفاعل)

تستخدم هذه الطريقة في حالة صعوبة تفاعل الفلز مع الحمض مباشرة لخطورة التفاعل « كتفاعل الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك » أو لقلة نشاط الفلز عن الهيدروجين « كعدم تفاعل النحاس مع الأحماض نظراً لقلة نشاطه الكيميائي عن هيدروجين الحمض ؛ فيُفضل استخدام أكسيد النحاس مع الأحماض فيحدث تفاعل ويكون ملح النحاس وماء »


المعادلة العامة لفظياً :

أكسيد فلز + حمض $\xrightarrow{\text{مخفف}}$ ملح الحمض + ماء .

أكسيد النحاس II + حمض الكبريتيك $\xrightarrow{\text{مخفف}}$ محلول ملح كبريتات النحاس II + ماء .



أكسيد نحاس II أسود مذاب في حمض الكبريتيك المخفف



لاحظ عدم حدوث تفاعلات بين قطع النحاس والأحماض

66

ثالثاً

تفاعل هيدروكسيد فلز مع الحمض المخفف

تصلح هذه الطريقة مع هيدروكسيدات الفلزات القابلة للذوبان في الماء والتي تُعتبر (قلويات) .

المعادلة العامة لفظياً :


هيدروكسيد الفلز « يذوب في الماء » + حمض $\xrightarrow{\text{مخفف}}$ محلول ملح الحمض + ماء

مثال : تفاعل محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف مع محلول هيدروكسيد الصوديوم .



« عند تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع محلول هيدروكسيد الصوديوم يتكون محلول ملح

كلوريد الصوديوم وماء »



217

أهمية تفاعلات التعادل

◀ (تفاعل أكسيد الفلز أو هيدروكسيده مع الحمض المُخفف) :

◀ تُستخدم في التحليل الكيميائي أثناء عملية المعايرة لتقدير تركيز (حمض أو قلوي) مجهول التركيز باستخدام (قلوي أو حمض) معلوم التركيز في وجود (دليل) مناسب و يحدث التعادل عندما تكون كمية الحمض مكافئة تماماً لكمية القلوي « وتُسمى هذه النقطة بنقطة نهاية التفاعل »


رابعاً ◉ تفاعل كربونات أو بيكربونات الفلز مع الحمض

◀ وهي املاح حمض الكربونيك وهو غير ثابت (درجة غليانه منخفضة) لذا يمكن لأي حمض آخر أكثر ثباتاً منه أن يطرده من أملاحه ويحل محله « كحمض الهيدروكلوريك والكبريتيك والنيتريك والفوسفوريك » ويتكون ملح الحمض الجديد وماء يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون ويستخدم هذا التفاعل في اختبار الحامضية .

◀ المعادلة العامة لكربونات الفلز لمظياً :

كربونات الفلز + حمض $\xrightarrow{\text{مخفف}}$ محلول ملح الحمض + ماء + غاز ثاني أكسيد الكربون « الذي يُعكر ماء الجير الرائق $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ عند إمراره فيه »

◀ مثال : تفاعل كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك المُخفف :



◀ المعادلة العامة لبيكربونات الفلز لفظياً :

بيكربونات الفلز + حمض $\xrightarrow{\text{مخفف}}$ محلول ملح الحمض + ماء + غاز ثاني أكسيد الكربون « الذي يُعكر ماء الجير الرائق $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ عند إمراره فيه »

◀ مثال : تفاعل بيكربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك المُخفف :



◀ لماذا تُسمى تفاعلات البيكربونات أو الكربونات مع الأحماض بكشف الحامضية ؟

وذلك لأنه يُستخدم في الكشف عن هذه الأحماض نتيجة حدوث فوران لتصاعد غاز CO_2 حامضي يُعكر ماء الجير الرائق (هيدروكسيد الكالسيوم $\text{Ca}(\text{OH})_2$)

اسئلة تدريبيه

١ عند إضافة الخارصين إلى محلول مائي من كلوريد الذهب III

أ تزداد أيونات Zn^{2+}

ب تزداد أيونات Cl^-

ج تزداد أيونات Cu^{2+}

د تقل أيونات Cl^-

٢ عند وضع ملعقة مطلية بالفضة في محلول كلوريد الصوديوم فإنه

أ يتكون راسب أبيض من كلوريد الفضة .

ب يتكون محلول كلوريد الفضة .

ج تزداد كتلة الملعقة نتيجة ترسب الصوديوم عليها .

د لن يحدث أي تغير نتيجة عدم إحلال الفضة محل الصوديوم في محلول ملحه .

٣ كل الاختيارات الآتية تنطبق على الكربونات والبيكربونات عدا

أ كلاهما مشتقان من حمض واحد وهو حمض الكربونيك .

ب كلاهما يتفاعلان مع الأحماض الأقل درجة غليان من حمض الكربونيك ويحدث فوران .

ج يحدث فوران عند تفاعلها فيتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يُعكّر الجير المطفئ .

د الكربونات ثنائية التكافؤ بينما البيكربونات أحادية التكافؤ .

٤ لفصل سبيكة عنصر النحاس من سبيكة النحاس والخارصين يُستخدم محلول

أ كبريتات الخارصين .

ب كبريتات الصوديوم .

ج حمض الكبريتيك المُخفف .

د هيدروكسيد الصوديوم .

٥ وضح كيف تُميز بين سبيكة من النحاس خارصين وسبيكة من الحديد خارصين ؟

تسمية الأملاح

اسم أي ملح يتكون من مقطعين (MX) مثل $[Na_2SO_4]$

(المقطع الثاني) الشق الأيسر [موجب]

M^+

الشق القاعدي للملح [كationen]

قادم من قاعدة NaOH

(المقطع الأول) الشق الأيمن [سالب]

X^-

الشق الحمضي للملح [أنيون]

قادم من حمض H_2SO_4

وتتوقف الصيغة الكيميائية للملح الناتج على تكافؤ كل من الأنيونات و الكاتيونات ،



Na_2SO_4

كاتيون

(شق قاعدي)

"مصدره هيدروكسيد"

الصوديوم $NaOH$

أنيون

(شق حمضي)

"مصدره حمض الكبريتيك"

H_2SO_4


والجدول التالي يوضح أمثلة لبعض الأملاح وصيغتها والأحماض التي حضرت منها.

الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية
نترات الصوديوم	NaNO_3	كاتيون الصوديوم	Na^+
نترات الأمونيوم	NH_4NO_3	كاتيون الأمونيوم	NH_4^+
نترات الكالسيوم	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	كاتيون الكالسيوم	Ca^{2+}
نترات الألومنيوم	$\text{Al}(\text{NO}_3)_3$	كاتيون الألومنيوم	Al^{3+}
نترات الحديدوز (أو نترات الحديد II)	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$	كاتيون الحديد (وز) II	Fe^{2+}
نترات الحديدك (أو نترات الحديد III)	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$	كاتيون الحديد (يك) III	Fe^{3+}
كلوريد الصوديوم	NaCl	كاتيون الصوديوم	Na^+
كلوريد الأمونيوم	NH_4Cl	كاتيون الأمونيوم	NH_4^+
كلوريد الكالسيوم	CaCl_2	كاتيون الكالسيوم	Ca^{2+}
كلوريد الألومنيوم	AlCl_3	كاتيون الألومنيوم	Al^{3+}
كلوريد الحديدوز (أو كلوريد الحديد II)	FeCl_2	كاتيون الحديد (وز) II	Fe^{2+}
كلوريد الحديدك (أو كلوريد الحديد III)	FeCl_3	كاتيون الحديد (يك) III	Fe^{3+}

كبريتات الصوديوم Na_2SO_4	كاتيون الصوديوم Na^+
كبريتات الأمونيوم $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	كاتيون الأمونيوم NH_4^+
كبريتات الكالسيوم CaSO_4	كاتيون الكالسيوم Ca^{2+}
كبريتات الألومنيوم $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	كاتيون الألومنيوم Al^{3+}
كبريتات الحديدوز (أو كبريتات الحديد II) FeSO_4	كاتيون الحديد (وز) II Fe^{2+}
كبريتات الحديدك (أو كبريتات الحديد III) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	كاتيون الحديد (يك) III Fe^{3+}
كربونات الصوديوم Na_2CO_3	كاتيون الصوديوم Na^+
كربونات الأمونيوم $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$	كاتيون الأمونيوم NH_4^+
كربونات الكالسيوم CaCO_3	كاتيون الكالسيوم Ca^{2+}
كربونات الألومنيوم $\text{Al}_2(\text{CO}_3)_3$	كاتيون الألومنيوم Al^{3+}
كربونات الحديدوز (أو كربونات الحديد II) FeCO_3	كاتيون الحديد (وز) II Fe^{2+}
كربونات الحديدك (أو كربونات الحديد III) $\text{Fe}_2(\text{CO}_3)_3$	كاتيون الحديد (يك) III Fe^{3+}




فوسفات الصوديوم



فوسفات الأمونيوم



فوسفات الكالسيوم



فوسفات الألومنيوم



فوسفات الحديدوز (أو فوسفات

الحديد II)




فوسفات الحديدك (أو فوسفات

الحديد III)




أسيئات الصوديوم



أسيئات الأمونيوم



أسيئات الكالسيوم



أسيئات الألومنيوم



أسيئات الحديدوز (أو أسيئات

الحديد II)



أسيئات الحديدك (أو أسيئات


الحديد III)



كاتيون الصوديوم



كاتيون الأمونيوم



كاتيون الكالسيوم




كاتيون الألومنيوم



كاتيون الحديد (وز) II



كاتيون الحديد (يك) III



كاتيون الصوديوم




كاتيون الأمونيوم




كاتيون الكالسيوم



كاتيون الألومنيوم



كاتيون الحديد (وز) II



كاتيون الحديد (يك) III



ملاحظة هامة :

- ١ يُسمى $FeCl_3$ بكلوريد الحديد III ، بينما يُسمى $AlCl_3$ بكلوريد الألومنيوم فقط ؟
وذلك نظراً لتعدد تكافؤات الحديد عن الألومنيوم ؛ حيث أن الحديد يمتلك حالتين تكافؤ (Fe^{3+} , Fe^{2+}) ،
بينما الألومنيوم يمتلك حالة تكافؤ واحدة فقط (Al^{3+}) .
- ٢ تدل الأرقام II أو III : على تكافؤ الفلز المرتبط بالشق الحامضي وتكتب مع الفلزات التي لها أكثر من تكافؤ.
- ٣ في حالة أملاح الأحماض عضوية (ك أسيتات البوتاسيوم $CH_3COO^- K^+$) :
نعكس الشقوق أي يكتب الشق الحامضي في اليسار و القاعدي في اليمين .
- ٤ الملح الذي يحتوي علي هيدروجين في الشق الحامضي له :
إما أن يُسمى بإضافة (بي BI) أو بإضافة كلمة هيدروجينية مثل :
 HSO_4^- يسمى بيكبريتات أو كبريتات هيدروجينية
 HCO_3^- يُسمى بيكربونات أو كربونات هيدروجينية

عدد الأملاح الناتجة من الحمض :-

بعض الأحماض لها نوع واحد من الأملاح وهناك لها نوعان وهناك لها ثلاثة أنواع ؟ ويرجع ذلك لعدد ذرات الهيدروجين في جزيء الحمض

أ الأحماض أحادية الهيدروجين (أحادية القاعدية) تُعطي نوع واحد من الأملاح :-

- ١ حمض النيتريك HNO_3 يكون ملح نترات فقط .
- ٢ حمض الهيدروكلوريك HCl يكون ملح كلوريد فقط .
- ٣ حمض الهيدروبروميك HBr يكون ملح بروميد فقط .
- ٤ حمض الهيدروبيوديك HI يكون ملح يوديد فقط .
- ٥ حمض الهيدروسيانيك HCN يكون ملح سيانيد فقط .
- ٦ حمض الخليك CH_3COOH يكون ملح خلات فقط .

ب الأحماض ثنائية الهيدروجين (ثنائية القاعدية) :-

- ١ حمض الكبريتيك H_2SO_4 يكون نوعين من الأملاح (كبريتات SO_4^{2-} وبيكبريتات «أو كبريتات هيدروجينية» HSO_4^-)
- ٢ حمض الكربونيك H_2CO_3 يكون نوعين من الأملاح (كربونات CO_3^{2-} وبيكربونات «كربونات هيدروجينية» HCO_3^-)

عدد الأملاح الناتجة من الحمض :-

2 الأحماض ثلاثية الهيدروجين (ثلاثية القاعدية) :-

1 حمض الفوسفوريك H_3PO_4 يكون ثلاثة أنواع من الأملاح (فوسفات PO_4^{3-} وفوسفات هيدروجينية

HPO_4^{2-} وفوسفات ثنائية الهيدروجين $H_2PO_4^-$)

2 حمض البوريك H_3BO_3 يكون ثلاثة أنواع من الأملاح (بورات BO_3^{3-} وبورات هيدروجينية HBO_3^{2-} وبورات

ثنائية الهيدروجين $H_2BO_3^-$)

س ما عدد الأملاح التي يكونها كلاً من :

- 1 حمض النيتروز .
- 2 حمض الهيدروكبريتيك .
- 3 حمض الستريك .
- 4 حمض الثيوكبريتيك .
- 5 حمض الفورميك .
- 6 حمض الأوكساليك .
- 7 حمض البنزويك C_6H_5COOH .
- 8 حمض البيروكلوريك .
- 9 حمض البالمتيك $C_{15}H_{31}COOH$.
- 10 حمض الكبريتوز .

المحاليل المائية للأملاح

تختلف المحاليل المائية في خواصها ، فمنها ما يكون حمضياً و منها القاعدي ومنها المتعادل و يعتمد ذلك على مصدر كل من الكاتيون و الأنيون الذي يتكون منهما الملح

الحمض	القاعدة	مثال	نوع المحلول	قيمة PH
قوى	قوية	كلوريد الصوديوم $NaCl$	متعادل	$PH = 7$
ضعيف	ضعيفة	خلات الأمونيوم CH_3COONH_4	حامضي	$PH < 7$
قوى	ضعيفة	كلوريد الأمونيوم NH_4Cl	قاعدي	$PH > 7$
ضعيف	قوية	خلات الصوديوم CH_3COONa		

الإلكتروليت القوي هو ما يحدد نوع المحلول

تذكر الأحماض والقواعد القوية :-

الأحماض والقواعد القوية التي تتأين في الماء

حمض الهيدروكلوريك	HCl	$\text{HCl}_{(g)} \xrightarrow{\text{water}} \text{H}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$	أولاً : الأحماض القوية
حمض الهيدروبروميك	HBr	$\text{HBr}_{(g)} \xrightarrow{\text{water}} \text{H}^+_{(aq)} + \text{Br}^-_{(aq)}$	
حمض الهيدرويوديك	HI	$\text{HI}_{(g)} \xrightarrow{\text{water}} \text{H}^+_{(aq)} + \text{I}^-_{(aq)}$	
حمض النيتريك	HNO ₃	$\text{HNO}_{3(L)} \xrightarrow{\text{water}} \text{H}^+_{(aq)} + \text{NO}_3^-_{(aq)}$	ثانياً: القواعد القوية
حمض البيروكلوريك	HClO ₄	$\text{HClO}_{4(L)} \xrightarrow{\text{water}} \text{H}^+_{(aq)} + \text{ClO}_4^-_{(aq)}$	
حمض الكبريتيك	H ₂ SO ₄	$\text{H}_2\text{SO}_{4(L)} \xrightarrow{\text{water}} 2\text{H}^+_{(aq)} + \text{SO}_4^{2-}_{(aq)}$	
هيدروكسيد البوتاسيوم	KOH	$\text{KOH}_{(s)} \xrightarrow{\text{water}} \text{K}^+_{(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$	
هيدروكسيد الصوديوم	NaOH	$\text{NaOH}_{(s)} \xrightarrow{\text{water}} \text{Na}^+_{(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$	
هيدروكسيد الباريوم	Ba(OH) ₂	$\text{Ba(OH)}_{(s)} \xrightarrow{\text{water}} \text{Ba}^{2+}_{(aq)} + 2\text{OH}^-_{(aq)}$	



أسئلة هامة :-

- ١) يحمر محلول كلوريد الأمونيوم ورقة عباد الشمس ؟
 لأنه حمضي التأثير حيث يتكون من حمض قوي وهو حمض الهيدروكلوريك (HCl) و قاعدة ضعيفة وهب هيدروكسيد الأمونيوم (NH₄OH)
- ٢) الأس الهيدروجيني pH لمحلول ملح كبريتات النحاس II أقل من 7 ؟
 لأنه محلول حمضي التأثير حيث ينتج من تفاعل حمض قوي H₂SO₄ مع قاعدة ضعيفة Cu(OH)₂
- ٣) الأس الهيدروجيني pH لمحلول فوسفات الحديد III يساوي 7 ؟
 لأنه محلول متعادل التأثير حيث ينتج من تفاعل حمض ضعيف H₃PO₄ مع قاعدة ضعيفة Fe(OH)₃
- ٤) يتركب محلول كربونات الصوديوم ورقة عباد الشمس ؟
 لأنه محلول قاعدي التأثير .
- ٥) لا يمكن استخدام دليل الفينولفثالين في التمييز بين محلولي خلات الأمونيوم وبروميد البوتاسيوم ؟
 لأن كلاهما متعادل التأثير ؛ حيث أن محلول خلات الأمونيوم مشتق من حمض ضعيف CH₃COOH وقاعدة ضعيفة NH₄OH بينما بروميد البوتاسيوم مشتق من حمض قوي HBr وقاعدة ضعيفة KOH






أسئلة تدريبية :-

٦ إذا كانت الصيغة الكيميائية لكبريتات الفلز X هي XSO_4 ، فإن الصيغة الكيميائية لفوسفات الفلز X ؟






٧ إذا كانت الصيغة الكيميائية لمركب يروانتيمونات البوتاسيوم $K_2H_2Sb_2O_7$ ، فإن الصيغة الكيميائية لمركب

يروانتيمونات الكالسيوم هي



٨ أياً من المواد الآتية تذوب في الماء مكونة محلول مُتعادل ؟



٩ ملح كربونات البوتاسيوم يُعتبر ملح لحمض

☐ ب أحادي القاعدية وحمضي التأثير.

☐ ا أحادي القاعدية وقاعدي التأثير.

☐ د ثنائي القاعدية وحمضي التأثير.

☐ ج ثنائي القاعدية وقاعدي التأثير.

١٠ ما اللون المتكون عند إضافة قطرات من :

☐ ا دليل أزرق بروموثيمول إلى محلول فلوريد الألومنيوم.

☐ ب دليل الميثيل البرتقالي إلى محلول أسيتات الذهب III